



h

86
LV
40

12

21

8
8

32



INSTRUMENTA
CURATIONIS MORBORUM
DE PROMPTA
EX



PHARMACIA, CHYRURGIA,
ET DIÆTA.

DE INSTRUMENTIS
*Pharmaceuticis ex Galenicis
& Chymicis.*



In qua multa traduntur praxim
ineuntibus utilissima, eosque
velut manu ducentia.


Authore H. TENCKE, *Profess.*
Reg. Monspel.

Bellic. Schol. Pantab. Piarum.

LUGDUNI,
Apud CÆSAREM CHAPPUIS.



M. DC. LXXXI.
Cum Permissu.



جانب



BIBLIOPOLA MEDICINÆ STUDIOSIS.



CCE opta-
tis vestris res-
pondeo, phi-
liatricandidi?
& quod tan-
diu enixè rogastis, ut opus
hoc typis mandandum
curarem, vobis jam of-
fero. Seriùs quidem quàm
oportuit ut assiduos in
studiis labores, & vestrum
in scribendo tædium de-

mulcerem. Eo tamen lubentius id præstiti, quò rem publicæ salutis utilissimam à vobis ipsis intelligo, qui theorico lacte aliquando imbuti ad praxim non nisi alienis ducimini experimentis. Interpretor non aliud fuisse intentum Professoris Illustrissimi, qui hæc in suis prælectionibus vobis contulit, quam ut selectiora remedia pro quocumque affectu velut in synopsis contraheret, modumque utendi, fyrtesque in curatione fugiendas innueret, quò aditus praxeos aut faciles aut minus af-

peros redderet , & re-
moram , quæ tyrones
præcticos non parum re-
tardat , abigendo , tem-
pus inexpertis longum
ad sublimius studium di-
rigeret. Observationum
& inventorum multitu-
do , quibus se huc us-
que extulit studiorum fe-
licitas , Medicinæ æra-
rium fecit penè immen-
sum. Dum alter alterius
labores prævenit , tem-
pus occupat , & ad ma-
jora meditantem extol-
lit. Vitæ brevitatis dis-
pendium compensat tam
officiosa sollicitudo , &
sic utili Doctorum com-

mercio artis longitudo
quodammodo adæqua-
tur. His igitur & vos
fruimini , quæ ut vobis
in uberes fructus crescant
medullitùs exopto.





D E

I

I N S T R U M E N T I S
P H A R M A C E U T I C I S
G A L E N I C I S E T C H Y M I C I S .

Proœmium.



T nihil est tanti momenti in praxi medicâ quam recta remedium administratio , sic nihil Medico circa ægros versanti difficilius occurrit, nec quidquam est quod ipsius animum magis anxie suspendat. Opus est summo judicio, ne dicam immenso , quod omnia penetret , expendat , metiatur & ritè inventa subjecto applicet ; ad quod vix ipse sufficiat Hippocrates , qui bonorum omnium in Medicina inventor est simul & omnium fidissimus director.

7. *Meth.* Sapienter Galenus ex ipsius mente scripsit, facile esse cognita causâ remedium invenire, eumque sufficere ad curandum qui sufficit ad cognoscendum. Quæ cognitio non includit solum exactam eorum notitiam, quæ secundum & præter naturam sunt, sed etiam rerum omnium quæ ad perfectam faciunt medelam; sic enim curatio facilis est, cui omnia ad illam requisita aperta sunt. Sed quænam est illa ingenii felicitas & *εὐσυχία*, quæ partium affectarum, morborum, causarumque naturam, & complexus, auxilii quoque vim sic assequitur, ut singula in quolibet ægrotante ad justum modum opportunè præscribat, nec sit remedium disparis virtutis, superfluum vel insufficiens, aut minus naturæ conveniens. Rectè Galenus ad duo collimat, unum est methodo remedium specificum invenire; alterum subjecto inventum prudenter administrare. Utrumque hic, quantum ob brevitatem expedit, designabimus, præmissis sequentibus necessario præsciendis.

Remedium est quodcunque corporis affectum præter naturam depellere po-

test : emanat à triplici fonte Diætâ, Chirurgiâ & Pharmaciâ , unde alia remedia sunt Diætetica , quæ sex rerum non naturalium administratione comprehenduntur : Chirurgica , quæ ex Chirurgiæ promptuario depromuntur : Pharmaceutica , quæ ex Pharmaciæ horreo desumuntur , seu externa sint , seu interna , simplicia vel composita ; ex mineralium & metallorum fodinis deprompta , vel ex vegetantium aut animalium familia ; sive ut inquit Gal. ad faciendâ , admovendâ , assumenda , & educenda revocentur.

Modi per quos remedia inveniuntur quatuor sunt , ratio , experientia , analogismus , & indicatio. Varietas dogmatum , corporum , causarum , & signorum analogia rationem reddunt valde ambiguum ; experientia & analogismus sæpius imponunt , quia à particularibus & incognitis ad particularia procedunt. Tutior est indicatio , quæ ex solo indicante percepto , protinùs quasi ab insito quodam principio auxilii naturam insinuat.

Indicantia sunt morbus , causa ipsius , ægtotantis natura & vires , ac-

cedit urgens symptoma; proinde tot sunt à quibus desumitur indicatio.

In desumendis indicationibus à morbo & causa, progrediendum à genericis per subalternas usque ad specificas; non enim immorandum in sola generica, quia nullius remedii naturam insinuat: posito enim quod sit morbus aut causa, non ideo patet quod sit alterandum vel vena secanda, quia potest fieri ut non sit intemperies, nec plethora. Neque in subalterna; licet enim notum sit quod morbus sit intemperies, adhuc tamen non patet, utrum sit calida vel frigida. Tandiu igitur dividendum morbos & causas, donec à genericis in subalternas, & à subalternis ad specificas perventum sit: differentias, à quibus tantum indicatio utilis desumitur, cui respondet materia quæ primò & per se affectum & causam tollere potest. Licet autem indicatio specifica proximè sufficiat ad remedii inventionem, oportet tamen totis viribus eniti ut assequamur indicationem determinatam, quod licet difficillimum sit, ex eo quod individualia non habent proprietates per quas cognosci.

possint, propiùs tamen ad eam accedere tentandum; si enim quem gradum calor febrilis in aliquo laborante obtineat, nesciamus, remedium æqualis virtutis, nisi casu non adhibebimus.

In indicationibus persolvendis urgentia primum locum obtinent, frustra enim suadetur remedium à morbo & causa, si vires ad ferendum non sufficiant.

Sequuntur causæ, inter quas *primò* externæ sunt submovendæ, deinde antecedens, postea conjuncta, & si potest fieri uno & eodem remedio utraque simul oppugnanda; demum fovens omnis causa radicitus tollenda. Rarò diuturni affectus sine illa sunt, quæ manente obstinatè perdurant aut recurrunt: sedem habet in contentis, vel in partibus solidis intemperies, obstructione aut alio vitio affectis, vel in utrisque, vel in abusu sex rerum non naturalium, vel demum in remediis perperam administratis aut diutius exhibitis.

Impedimenta, si quæ sint, auferenda sunt; ut in vulneribus & ulceribus si corpus insit extraneum, fluxio,

humor viscidus impactus deterfione indigens, prava partis temperies, callosa labiorum durities, & sic in cæteris affectibus.

Morbus deinde oppugnandus, qui sublata causa & impedimentis, non difficile, si sit curabilis, evanescit.

Partibus denique roborandis studendum est, quod non nisi demptis causis, morboque sublato tentari debet; quia cum roborantia sint adstringentia, materiam superstitem impingerent, & resolutioni magis difficilem redderent. In morbis chronicis, roborantia alterantibus & evacuantibus immiscenda, postquam major humorum portio evacuantibus fuerit sublata.

Rectum remedia administrandi modum designat Hippocr. & Galenus: Comm. 2. in 6. de morbis vulg. text. 33. sequentibus medico curationem auspicanti animadvertendis.

Primum est, quid sit faciendum. Quidquid agimus in morborum curatione id reduci potest ad evacuantia, alterantia, roborantia, & reficientia. Utrum igitur sit evacuandum, alterandum, roborandum, aut reficien-

dum , id ex morboſo pendet apparatu ; ſi enim plethora vel cacochymia ſit, evacuandum ; ſi intemperies alterandum ; ſi vires ſint fractæ , roborantibus utendum , in emaciatione verò reſciendum.

Secundum eſt ; quali remedio opus ſit. Qualitas remedii non ab alio quam à morbi , cauſæque ipſius qualitate indicatur , quam ut depellere poſſit, oportet ut ſit ipſi contraria. Itaque ſi ſit intemperies calida auxilium frigidum competit, ſi frigida calidum , &c. ſic & tenuitas humoris incrassantia, crassities attenuantia , viſciditas detergentia , lentor incidentia , malignitas alexipharmaca poſtulat. In morbis à bile utendum eſt cholagogis , à pituita phlegmagogis , à melancholia , melanagogis , à ſero hydragogis ut fuſius infra.

Tertium eſt ; quantum & quouſque remedio utendum ſit. Ut juſta ſit remedii quantitas , reſpiciendum eſt ad morbi magnitudinem & ad vires ægro- tantis : illam aſſequi non poſſumus niſi conſtet quantus ſit factus reſceſſus à naturali ſtatu ; eò enim major eſt morbus:

3 Meth.
& alibi.

quò magis ab habitu pristino salubritotum corpus vel partem trahit in extrema. Morbi magnitudo præsumitur ex vi symptomatum, recessus verò à naturali statu ab ægrotantis naturâ: quantum igitur morbus superat naturalem habitum, tantum & sibi æqualem alterationem aut evacuationem requirit. Juxta hunc sensum Galen. non semel docet sicciora remedia exigere carnem ulcere tentatam, quam os, tendinem, membranam, & alias partes carne temperamento sicciores.

Similiter quò pars densior fuerit minusque porosa, validiora postulat, quò rarior, leviora.

Altior in corpore situs partis affectæ, fortiore indiget, quia longitudine itineris multum de viribus medicamenti deperditur.

Pars princeps vehementia renuit, ignobilis non recusat.

Exquisito sensu prædita ab acribus læditur, obtusiore verò iisdem juvatur. Aquilonia tempestas validiora, austri-na verò mitiora expetit.

Copia materiæ morbum patientis proportionato indiget evacuante, ut.

radicitus auferatur. Sed quia partium conditio, robur ægrotantis & materiæ contumacia plerumque sustinere nequeunt plenam & subitam evacuationem, ideo partitis vicibus agendum, ut ex pluribus parvis unica fiat evacuatio copię humoris respondens, quod non tantum de purgatione, sed & de sanguinis missione intelligi oportet. Id vero maximè in usu est in chronicis affectibus, in quibus materiæ copia & contumacia impedit quin tota possit semel valido etiam purgante expelli, nullumque est in mora periculum. In acutis verò dispar ratio, materia enim tenuis est, quam natura tentat subito per crisin solvere: in his tamen non est ita citò procedendum, ut nulla virium aut impedimenti ratio habenda sit; si enim turgente materia, viscerum inflammatio insignis validam purgationem respuat, abstinebimus mochlicis, quia admodum calefaciunt & perturbant, utemur verò blandis purgantibus, prout necessarium videbitur repetendis. At si non reclamant vires, nullumque obstat prohibens, vehemens morbus subito delendus, ne citò

vires opprimat ; tum quia melius est aliquo virium dispendio morbum depellere , quam sinere causâ morbificâ vires obrui. Quod accidit in morbis extremis quia præcipites sunt , quales sunt apoplexia , inflammatio insignis partium , & omnis ille affectus in quo materia est turgens.

Quosque tandem agendum sit , indicatur à fine ad quem tendit actio remedii indicati , qui alius non est quam status salubris : ad illud enim punctum redire intentio est , à quo morbus sumpsit exordium ; nempe ad statum salubrem , tanquam ad terminum curationis.

Quantum est de occasione & tempore opportuno remedium exhibendi. Hoc autem insinuat præsentia indicantis , & absentia prohibentis. Occasio remedii est inquit Galen. quando præsens est indicans & vires non prohibent , hæc autem præceptum est , ex Hipp. præsertim in acutis : unde alia est temporanea , quæ sequitur universale morborum tempus , alia momentanea quæ particulare , estque dies , hora , vel momentum exhibendi remedii. Occa-

*l. de opt.
señs.*

*Aph. 1.
f. 1.*

sio universalis habet certam latitudinem ; particularis vero intra angustos limites coërcetur.

Consideratio universalium morborum temporum utilis est tum ad instituentiam victus rationem , tum & ad peculiare remedium administrandum ; talis enim est curationis ratio , qualis morborum per sua tempora mutatio. Cum morbi inchoant inquit Hipp. si *Aph. 29;* quid videtur movendum move. In acutis raro & in principiis medicamentis *f. 2. 24.* purgantibus utendum, &c. Ita in morbis chronicis affectus qui longius protrahitur , vix nisi mutatis remediis sanatur : quod intellige non de remedii mutatione secundum qualitatem ac speciem , quando certi sumus de causæ qualitate ; tunc enim non secundum speciem , sed secundum formam & vim agendi immutandum est remedium. Sic si morbus sit calidus qui frigidis non mitescat , non est calidis utendum ; omnia enim secundum rationem facienti , si secundum rationem non cedant , non transeundum ad aliud, docente Hipp. sed ita agendum , ut si *Aph. 52.* prius mitioribus usi fuerimus , deinde *f. 2.*

validioribus utamur , & è contra ; simplex enim affectus qui levioribus præfidiis tempestivè non cessit , fortioribus aliquando profligatur.

Quolibet morbi tempore vel effrænate vel languidè , vel sufficienter movet natura ; si effrænate , coërcenda est ; si languidè , juvanda ; si sufficienter , sinenda est.

Ultimò observandum de loco in quo & per quem remedia sunt administranda. Quod indicatur à loco in quo est indicans. At quod oportet ut Medicus anatomes peritus externas , vel internas vias eligat aptiores , per quas devehì possit alterantis aut roborantis facultas. Evacuantiavèrò per loca conferentia educere debent , ad quod non solum sequi debemus nativam humorum propensionem , sed & vias per quas natura solet cum ægri levamine sese expedire à noxiis humoribus : quòd natura vergit , inquit Hipp. per loca conferentia , eò ducendum. Sic evacuatio commodè fit per ductus , in quos natura solet dirigere ; quam ut imitetur Medicus , oportet ut teneat solennes vias, ad quas ipsa sua deponit

*Aph. 21.
s. 1.*

excrementa , quæ sunt os , intestina , vesica , uterus , nares , ipsaque totius emunctorium , cutis. Sciât quoque particulares ductus , per quos facilius vitiosi humores excluduntur. Ita cerebrum expurgatur per futuras , os , nares , aures : pectus per expectoratum : ventriculi pars superior *ἀνω* , inferior *κατώ* potius sublevatur : intestina per alvum , huc jecur & lien : tum & diureticis , quibus & renes & vesica : uterus per suam ipsius cervicem. Per has vias tam in naturali quam præternaturali statu , sponte ducit natura , si evacuationem dirigat. Quæcunque enim aliter fit , nec naturæ motu , nec arte , sed humoris orgasmo provocatur.

Omnia remedia , quæ exhibet Pharmacia , reducuntur ad tria genera , primum est alterantium , secundum evacuantium , tertium roborantium , accedit quartum genus eorum quæ paregorica dicuntur. Alterantia indicantur ratione qualitatis : evacuantia ratione quantitatis : roborantia ordinantur ad partes : paregorica respiciunt urgentia symptomata.

Cum autem remedia non præscri-

bantur nisi sub certa quadam & determinata formâ, formula in quâ exhibentur nihil aliud est quam modus varius, sub quo administrantur, qui diversus est, prout varia est pars affecta, morbi natura, causæque qualitas.

Totum hoc opus in quatuor partes dividitur : in prima agitur de alterantibus : in secunda de evacuantibus : in tertia de roborantibus : in quarta de lenientibus & paregoricis.





PARS PRIMA.

De Alterantibus.

EXCREMENTA quæ peccant
 quantitate protinùs evacuanda
 sunt, nimis enim retenta in causas
 morborum facessunt. Sed quia non
 rarò purgationi obstant primis, secun-
 dis qualitatibus, corruptione, aut pu-
 tredine; ideo prius (modo absit orgas-
 mi suspicio) alterantibus, digerenti-
 bus, coquentibus præparanda, & ad
 statum naturali similem reducenda sunt,
 ut sit fausta & sine δυσφορία, purgatio.
 Si enim qualia purgentur, συμφορῇ τε,
 καὶ εὐφορίας φέρουσιν docente Hipp. quia ^{Aph. 23.}
 verò etiam sæpè partium intemperies ^{f. 1.}
 & debilitas virium purgationem pro-
 hibent vel retardant, iis quoque con-
 venientibus auxiliis providendum. U-
 troque igitur nomine purgationi præ-
 mittenda alteratio, quæ est commuta-
 tio ab alterante facta, ut amissa con-

16 Pars I. *De Alterantibus.*

tentorum partiumque qualitas restituitur. Qualitas hic dicitur quodcunque sit, seu tertiæ speciei, seu modus substantiæ in motu, quiete, tenuitate, crassitie, &c.

Neque obstat quod res contrariæ virtutis, idem remedium alterans componant; omnia enim simul sese ad commodam crasim deducunt. Dum plura diversæ naturæ concurrunt in unam alterantis formam, constat illud substantiis dissimilibus, quas separat vis dissolvens ventriculi, & quæ huc illuc in vaporis formâ, vel sanguinis ferique beneficio devehuntur, aguntque secundum propriam vim, vel remissam ob pugnam & complexum, vel quantula pollent, dum à se invicem penitus abeunt, aut alterum alteri prædominatur, prout disposuit intentio præscribentis.

Iuxta hunc sensum alterantia sunt, quæ corrigunt vitiosam qualitatem partium, vel humorum.

Dividuntur in simpliciter alterantia, & in alterantia mixta: quæ vel sunt composita ex alterantibus & roborantibus, vel ex alterantibus & purgantibus.

Pars I. *De Alterantibus.* 17

Primò , Simpliciter alterantia excessum qualitatis attemperant ; quæ vel est immaterialis , & exigit alterans contrarium ; vel est cum materia biliosa , pituitosa , melancholica , quæ præter vitium primarum qualitatum , peccat , vel tenuitate & incrassandum , vel crassitie & attenuandum , vel lentore & incidendum , vel visciditate & detergendum , vel ex eo quod materia sit impacta cum obstructionibus & aperiendum , vel occultâ peccat qualitate & alexipharmacis agendum. Præterea peccat ejusmodi materia , vel motu , vel quiete , vel in parte divisa.

Secundò , Alterantia mixta ex alterantibus & roborantibus respiciunt partes vel ex se , vel ab humoribus intemperatas , debilesque ; & dicuntur parti cuilibet & humori specifica , quia simul alterant & roborant. Hæc vel uni parti specifica sunt , sic cerebro cephalica , cordi cardiaca , mammis mastoica , ventriculo stomachica , hepati hepatica , lieni splenica , intestinis enterica , renibus nephritica , vesicæ cystica , testibus specifica , utero hysterica , articulis arthritica : vel simul

18 Pars I. *De Alterantibus.*

miscentur quæ pluribus partibus affectis competunt , & dicuntur specifica mixta.

Vitium materiæ in motu indicat ratione fluentis humoris incrassantia, ratione partis recipientis repellentia, ratione viarum intercipientia & adstringentia.

Vitium materiæ in quiete, nempe dum materia est impacta aut immota, vel insensibiliter dissipatur per resolutiva, absumentia : vel sensibiliter per vesicantia, suppurantia, tumorem aperiencia.

Vitium materiæ in parte divisâ, si simplex sit solutio petit agglutinantia ; vulneraria si cum deperditione substantiæ , sarcotica , epulotica.

Ex hoc alterantium catalogo juxta prædictas indicationes , sequentia designantur remedia.

Primò, Alterans simplex refrigerans humectans , bilem tenuem incrassans, crassam attenuans, præparans pituitam, melancholiam , atram bilem.

Obstructiones aperiens.

Malignam qualitatem emendans.

Secundò, Alterans specificum, ophthalmicum,

Pars I. De Alterantibus. 19

micum, bechicum, cardiacum, mam-
mis dicatum, stomachicum, hepati-
cum, splenicum, intestinis approp-
riatum, nephriticum, cysticum, te-
stibus specificum, hystericum, arthri-
ticum.

Pluribus partibus una remedii for-
mula appropriatum.

Tertiò, Alterans & purgans bilem,
pituitam, & melancholiam.

Quartò, Incrassans materiam fluen-
tem, repellens à parte recipiente, in-
tercipiens & adstringens in via, adstrin-
gens in meatu latiori.

Quintò, Resolvens & absuens
materiam impactam, emolliens duram,
dissolvens grumos, desiccans, suppu-
rans, tumores aperiens, pyroticum.


Sextò, Agglutinans, vulnerarium,
sarcoticum, epuloticum.

Materia remediorum ad has inten-
tiones adimplendas idonea pro diversâ
partis, morbi, causæque naturâ, &
idiosyncrasiâ ægrotantis præscribitur
sub variis formis, quales sunt, pro
alterantibus internis, julepus, apoze-
ma, jusculum, emulsio, hordeatum, lac
& serum lactis, hydromel, ptisana,

diata, syrupus, bolus, opiata, pulvis, tabellæ, pillulæ : pro alterantibus vcrò externis fomentum, epithema, balneum, embrocatio, stupha, linimentum, ceratum, cataplasma, emplastrum, dropax, vesicatorium.

De quolibet tria observanda sunt. *Primò*, Compositio. *Secundò*, Usus. *Tertiò*, Formula. Compositio includit materiam ingredientium, quantitatem, qualitatem : usus diversos fines ad quos præscribuntur : Formula modum præscribendi.

In usu alterantium non est tanta ipsis fides habenda, ut ab ipsis solis qualitatis vitium corrigi posse credatur; frustra enim decoctis, pulveribus, opiatis, tabellis & similibus morbum tentaveris, si evacuatio sit necessaria; plus enim tunc proderit venæ sectio atque purgatio humores ventilando, & naturam oppressam sublevando, quam longa ex alterantium serie potio deprompta.



SECTIO PRIMA.

De simpliciter alterantibus.

CAPUT I.

De Ulepo.

Ulepus est medicamentum fluidum ex liquore idoneo & syrupo vel saccharo sine coctione paratum.

Compositio ipsius simplex est, & per hoc differt ab apozemate, à syrupo verò quia liquidus est. Præscribuntur liquor & syrupus in eâ proportionem, ut pro $\frac{3}{4}$. j. syrupi sint. $\frac{3}{4}$. v j. vel viij. liquoris. Determinatur quantitas utriusque sub hac proportionem, pro ratione ætatis, consuetudinis, roboris ventriculi, & usus necessitatis; minor enim dosis in pueris, inassuetis, stomacho debilibus, & calore minùs intenso, major è contrà.

Componi solet ex aquis stillatitiis, vel ex herbarum decocto: tunc maxi-

B ij



22 Pars I. De Alterantibus.

mè utimur aquis, quando vel decocta fastidit ægrotans, vel ob ventriculi laborem non sustinet, vel quando res urget, & deficit tempus decocta parandi, vel quando adest herbarum penuria, ut in hyemè.

Tempus sumendi est hora quælibet, sed potissimum sexta matutina, & nona vespertina, duabus aut tribus horis post & ante iusculum.

Ufus plurimi sunt, vix tamen ad alios scopos usurpatur, quam

Primò, Ad refrigerandum. Pro quo utiles sunt aquæ cichorii, endiviæ, portul. papav. rhead. nymph. buglos. borrag. syrupus limonum, de-cichor. simplex, violatus, capill. veneris, & similes.

Forma julepi hæc est.

℥. aquar. cichor. lact. an. ℥. iiij. syrupi limonum ℥. j. fiat Julep. capiat manè & vesperè.

Ex chymicis possunt dissolvi vel addi.

Sal prunellæ à ℥. β. ad ℥. j.

Spiritus vitrioli, vel sulphuris à gutt. iv. ad gutt. vi. vel ad gratam aciditatem.

Cap. I. De Julepo. 23

Spir. salis dulcis à ʒ. j. ad ʒ. ʒ.

℞. Decocti cichor. lact. q. s. syrupi violati, vel limon. ʒ. j. vel de nymph. ʒ. ʒ. salis prunel. ʒ. ʒ. fiat Julep.

Vel ex decocto magis composito pro 3. dosibus.

℞. Folior. cichor. totius, capill. ven. acetosæ, lact. borrag. an. M. j. quatuor semin. frigidor. mai. an. ʒ. j. hordei integri & flor. cordial. anap. j. fiat decoctio pro 3. dosibus; adde cuique syr. capill. ven. ʒ. j. spirit. sul. phr. ad gratam aciditatem; capiat vesperè & manè.

Nota abstinendum esse à spiritibus acidis in constitutione valde sicca, quando humores sunt adusti melancholici, major enim ab his fit exsiccatio & humorum fermentatio.

Secundo. Ad sitim extinguendam, & bilis ardorem temperandum.

℞. Aquæ hord. ʒ. viij. succi limon. recenter expres. ad gratam aciditatem, sacch. albi, vel syrupi capillorum verneris ʒ. j. agitentur simul & sæpè transfundantur à vase in vas. Fiat julep. capiat uno haustu.

Vel.

B 3

24 Pars I. De Alterantibus.

℞. Aquar. papav. rhœad. portul. an.
℥. iij. salis prunel. ʒ. β. syrupi violati
℥. j. misce f. julep.

Tertiò, Ad diaphoresim promoven-
dam in febribus malignis & pestilenti-
bus, variolis, &c.

℞. Aquar. cardui bened. papav.
rhœad. scorson. an. ℥. ij. confect. hya-
cinthor. & salis prunel. an. ʒ. β. pulveris
viperini ʒ. β. syrupi limon. ℥. j. fiat
Julep.

Vel

℞. Aquar. scab. papau. rhœad. an.
q. f. salis cardui bened. vel. scab. ʒ. β.
lapidis bezoardici veri gr. iv. syrupi
capill. vener. ʒ. vj. fiat julep.

Potest etiam dissolvi ex chymicis
in aquis hujusmodi

Bezoardicum minerale ad ʒ. β.

Bezoardicum joviale ad gr. viij.

Spiritus salis dulcis ad ʒ. j.

Ad plures usus solet etiam præ-
scribi julep, de quibus tradetur exem-
plum suo loco.

Quando iterari debet julepus, sic
præscribitur.

Reiteretur julep. sumendus vespere
& manè, horâ, &c.

C A P U T II.

De Apozemate.

Apozema sic dictum à verbo Græco *δορζέω*, quod idem significat ac decoquo, fervefacio, est decoctum alterans, quod humores & partes vario modo immutat.

Fit ex simplicium decocto, *primò*, radices præscribuntur, ligna, cortices, mox herbæ, tum fructus, & semina, mox flores. Coctio fit in aquâ fontis vel fluviali: non præscribitur quantitas aquæ, sed arbitrio pharmacopœi relinquitur. Communiter præscribitur pro 3. aut 4. dosibus. Dissolvitur in qualibet dosi saccharum vel syrupus intentioni idoneus ad \mathfrak{z} . j.

Tempus sumendi est manè & vespere, ut diximus de julepo.

Singula dosis excedere non debet \mathfrak{z} . vj. sunt tamen qui ad \mathfrak{z} . viij. exoptent, & alij bis, alij semel in die patiuntur: Pueri vix ultra \mathfrak{z} . iiij.

26 Pars I. De Alterantibus.

aut v. admittunt: adulti verò plures, nisi sint nauseabundi.

Ufus est.

Primò, Ad alterandos, & purgationi præparandos humores, nec non ad obstructions referandas.

Quando bilis calidior; siccior, tenuior, & acrior est, in febribus acutis molestum parit orgasmum, ideoque refrigerantibus, humectantibus, incrassantibus, & demulcentibus acrimoniam est temperanda, quod fit sequenti decocto.

℞. Radic. cichor. acet. buglos. an. ʒ. j. folior. cichor. lact. portul. oxalid. buglos. an. M. j. 4. semin. frig. mai. an. ʒ. j. passular. purgat. ʒ. j. hord. integ. & florum violar. nymph. an. p. i. f. decoctio ad ℥. j. ℥. pro 3. dosibus: adde cuique, syrupi violati vel granatorum ʒ. j. vel de nymph. ʒ. ℥. salis prunel. ʒ. j. capiat bis in die.

Vel

In forma julepi sanguinem, bilemque refrigerantis & incrassantis.

℞. Aquar. lact. papau. rhœad. portul. an. q. ʒ. syrupi granator. ʒ. j. salis prunel. ʒ. ℥. fiat julep.

Cap. II. De Apozemate. 27

Bilis quandoque exhaustis tenuibus partibus, crassior evadit, & partibus impacta. Quod ferè accidit in omnibus febribus, quæ ab ipsius putredine oriuntur; in quo casu refrigeranda, humectanda & attenuanda. Hoc præstat sequens decoctum.

℞. Radic. gramin. aspar. brusci ana ℥. j. folior. cichor. cum toto, endiu. scariolæ, capill. ven. pimpin. agrim. ana M. j. 4. semin. frig. mai. ana ℥. j. hord. integri, flor. cichor. & trium cordialium, an. p. j. fiat decoctio pro 3. dosibus. Adde cuique, syrupi capill. vener. vel de cichor. simpl. ℥. j. spiritus vitrioli, vel sulph. gutt. vi. capiat vespere & manè hora, &c.

Pituita excrementitia peccat frigidityte, humiditate, crassitie, lentore, & visciditate; quæ vitia corrigi debent alterantibus, quæ calefaciunt, exsiccant, attenuant, incidunt, & detergunt; pro quo intento sequens decoctum utile est in affectibus frigidis à pituita, ut in asthmate, paralyfi, apoplexiâ, epilepsiâ, & similibus; tum & in febribus pituitosis.

28 Pars I. *De Alterantibus.*

℥. Radic. apii, petrosel. fœnic.
ana 3. vj. radic. enulæ campanæ, &
falsæ paril. ana 3. β. folior. agrim. be-
ton. capill. ven. hyslopī, chamæpit.
an. M. j. semin. fœnic. petros. an. 3. ij.
flor. stœchad, calend. an. p. i. f. deco-
ctio in aqua fontis pro 3. dosibus non
claris, sed sæpius colatis. Adde cui-
que, syrupi de 5. radic. 3. j.

Rarò hæc pituita colligitur in cor-
poribus præsertim istius regionis, quæ
ferè omnia calore potius quam frigi-
ditate. à mediocritate recedunt. At si
aliquando ob alimenta ad illam pro-
ducendam apta, vel propter aëris hy-
berni inclementiam redundet, viden-
dum est num calor viscerum & san-
guinis prohibeat usum remediorum,
quæ intensius calefaciunt, exsiccant, &
attenuant, in quo casu mixtis secun-
dum diversas indicationes alterantibus
utendum.

Aliquando humor pituitosus crassus,
viscidus, mucosus & sibi multum co-
harens, pituitam frigidam mentitur,
cum tamen effectus sit caloris sensim
humidum resolvendo incrassantis, &

Cap. II. *De Apozemate.* 29

multos sales adustos terrenamque fæculentiam contineat, à quibus coagulatur. Huic calefacientia & exsiccantia non competunt, sed potius leviter detergentia, attenuantia, & demulcentia; qualia atræ bili, & melancholiæ adustæ conveniunt.

Pituita quandóque tenuis est & falsa, caloris aliquantò particeps, qualis est quæ movet catarrhum ferinum cum tussi, tunc utendum non calidis, sed temperatis, admixtis quoque frigidis incrassantibus, ut

℞. Radic. cichor. \mathfrak{z} . j. β . folior. endiv. buglos. capill. vener. pimpin. & lactucæ, an. M. j. semin. melon. cucurb. lact. alth. an. 3. j. passul. purg. jujub. an. \mathfrak{z} . j. hordei integri & flor. cordialium, ana p. j. f. decoctio pro 3. dosibus: adde cuique, syrupi capill. vener. \mathfrak{z} . j. salis prunellæ 3. β .

Humor melancholicus frigidus est siccus, crassus, tartareus, & fæculentus, præparatur iis quæ vim habent calefaciendi, multum humectandi, attenuandi, & incidendi.

Sequens decoctum prodest in febribus longis, quartanis, vertigine, me-

30 Pars I. *De Alterantibus.*

lancholia, obstructionibus à crassis & terrestribus humoribus. Et quia difficile attenuatur & humectatur humor melancholicus, & valde alterantibus resistit, ideo frequenter iterari debet.

℞. Rad. apii, fœnic. enul. camp. ana ℥. j. corticum radic. capparis, mediani fraxini, & tamarisci, an. ℥. β. fol. bugl. utriusque, fumarizæ, lupuli, agrim. melissæ, capillarium omnium, ana M. j. seminum apii, cuscutzæ, ana ℥. ij. florum genistæ, tamarisc. & trium cordial. an. p. j. f. decoct. pro 4. dosibus non clavis; adde cuique, syrupi de pomis, vel capill. ven. vel de s. rad. ℥. j.

Ex chymicis dissolvitur utiliter in qualibet dosi.

Tartarum vitriolatum ad ℥. β. vel Spiritus tartari ad ℥. j.

Ex bile adusta fit atra bilis, quæ calida sicca & crassa est, ideoque refrigerantia, multum humectantia, simul & attenuantia expostulat.

Huic igitur, & bili cuicunque adustione incrassatæ, convenit sequens formula.

℞. Radic. cichor. brusci, fragariæ, ana ℥. j. corticis mediani fraxini ℥. vi.

Cap. II. *De Apozemate.* 31

folior. cich. agrim. buglos. utriusque cum radicibus, fumar. ceterach, politici, ana M. j. summitatum lupuli, asparagi, ana M. β . 4. seminum frigid. maj. an. 3. j. pomi redol. frusta aliquot, flor. cordial. calendulæ, an. p. j. f. decoct. pro 4. dosibus. Adde cuique syrupi de pomis simplicis, vel capil. vener. vel. violati $\frac{3}{4}$. j. capiat manè & vesperè.

Ad majorem & faciliorem præparationem addi potest.

Tartarum vitriolatum ad \mathfrak{D} . j. vel Spiritus tartari, vel nitri, ad gutt. vi. vel

Sal prunel. ad 3. β .

Si plures diversæ naturæ succi concurrant, & viscera, venasque angustiores obstruant, utendum est aperientibus, quæ nitrosa vi pollent & subamara sunt; ideòque attenuant, incidunt, penetrant, & abstergunt; ubi causa calide prævalet, prædominari debent refrigerantia.

Decoctum aperiens in affectibus chronicis hepatis: lienis, mesenterii, uteri cum obstructionibus, suppressis menstruis, pallidis coloribus.

32 Pars I. *De Alcerantibus.*

℞. Radic. brusci, aspar. apii ana \mathfrak{z} . j. cort. mediani fraxini & tamarisci, ana \mathfrak{z} . ss. folior. cichor. cum toto, agrim. ceterach, capill. ven. cæref. an. M. j. folior chamædryos & hyss. an. p. j. semin. melon. cucurb. petrosf. an. \mathfrak{z} . j. flor. cordial. tamarisf. an. p. j. f. decoct. ad lb. i. ss. pro 3. dosibus sæpius colatis. Adde cuique, syrupi de 2. aut 5. radic. vel capillorum ven. \mathfrak{z} . j. capiat manè horâ antè admotionem fomenti, si hoc utatur ægrotans.

Ex chymicis addi potest cuique dosi,

Sal. tamarisci vel fraxini ad \mathfrak{d} . j.

Spiritus nitri aut tartari ad \mathfrak{d} . ss.

Continuari debet usus prædictorum apozematum quandiu permittet ægri patientia & morbus exigit. Quia verò fastidiunt plerùmque ægrotantes decoctorum usum, ideò per 4. aut 5. dies post & antè purgationem assumuntur, & deindè forma remedii aperientis mutatur in jusculum, bolum, vel opiatam : & si necessarium sit ob affectus contumaciam, rursus renovandus est usus apozematum cum fomentis; purgatio verò per intervalla repetenda.

Cap. III. *De jusculis alt.* 33

Apozema in febribus malignis, pestilentibus ; variolis , & similibus. vide in capite de cardiacis.

C A P U T I I I.

De jusculis alterantibus.

COgimur ad usum jusculorum alterantium cum decocta fastidiunt ægrotantes , aut ventriculus ea , propter debilitatem pati non potest : vel etiam ut in morbis longis mutetur forma remedii , ne uni familiariter assuescens natura vim illius tandem eludat.

Juscula vel sunt alterantia , vel restaurantia , vel purgantia.

Alterantia fiunt ex radicibus & herbis convenientibus cum pullo galinaceo , vel frustulo colli carnis vervecinæ , vitulinæ , aut caprillæ.

Ad multos usus præscribuntur.

Primò , ad refrigerandum in calore & siccitate attemperandis , ut in febribus biliosis , calida hepatis intemperie , constitutione corporis gracili.

℞. Radic. cichor buglos. an. ʒ. j.

34 Pars I. *De Alterantibus.*

folior. cichor. buglossi utriusque, lactucæ, agrim. an. M. ß. hord. integri p. j. f. decoct. cum pullo gallinaceo, aut frustulo colli carnis caprillæ, vel vitulinæ, fiat jusculum pro unâ dosi capiat manè, & continuet per 12. aut 15. dies.

Secundò, Ad viscerum obstructions referandas & intemperiem calidam corrigendam, ut in febribus lentis, intermittentibus longis, obstructionibus viscerum & mesenterii, chlorosi, suppressis menstruis & similibus.

℥. Radic. asparagi graminis, brusc. ci, an. ʒ. ß. fol. cichor. cum toto, agrim. pimpin, ceterach, politrici, ana m. ß. coquantur cum pullo gallinaceo aut frustulo carnis colli vervecini: fiat jusculum, quod capiat manè per 10. aut 15. dies.

Addi debet in quolibet jusculo aliquod ex subscriptis aperientibus chymicis, ut

Tartarum vitriolatum ad ʒ. j.

Tartarum chalybeatum ad ʒ. ß.

CrySTALL. tartari ad ʒ. ß.

Spiritus tartari ad ʒ. j.

Spiritus volatilis salis armoniaci à ʒ. ß. ad ʒ. j.

Cap. III. *De jusculis alt.* 35

Spiritus vitrioli martis à ʒ. β ad ʒ. j.

Crocus martis aperiens ad ʒ. β.

Tinctura martis ad ʒ. j.

Tinctura tartari à gutt. iv. ad gutt.
v i j.

Magisterium tartari Schroderi ad
ʒ. β.

Liquor tartari spleniticus ad cochl. β.

Spiritus gummi ammoniaci ad ʒ. β.
in contumaci, crassa, viscosa, mucila-
gine pulmonum, mesenterii resolvendâ,
tum & in obstructionibus diuturnis lie-
nis, hepatis, uteri, mira præstat.

Quorum omnium compositio tradi-
tur à plerisque chymicis, & præcipuè à
clarissimis viris Schrodero, Zuvelser,
Sennerto, Glasero & aliis.

In pallidis virginum coloribus ca-
chexia, ictero, & similibus.

℞. Radic. brusci, apii, rubiæ tin-
ctorum, ana ʒ. β. fol. cichor. totius,
capillarium omnium, ana M. β. flor.
calendulæ p. i. fiat decoctio cum frustulo
colli carnis vervecinæ aut vitulinæ pro
jusculo, in quo dissolve aliquod ex
prædictis aperientibus, inter quæ,
sequentia sunt magis appropriata.

Tartarum chalybeatum.

36 Pars I. *De Alterantibus.*

Tinctura martis.

Spiritus volatilis salis armoniaci,
ad prædictam dosim.

Liquor tartari spleneticis.

Tartarus nitratus ad \mathfrak{z} . j.

Crocus martis cachecticus Zvvel-
fer. ad \mathfrak{z} . β .

Diaphoreticum antimonii Schroderi
à \mathfrak{z} . β . ad \mathfrak{z} . j.

Aliquando etiam cum obstructions
sunt contumaces, nec reluctatur ven-
triculus, in decocto præscribitur post
radices, chalybis præparati in modulo
inclusi \mathfrak{z} . j. vel si ad \mathfrak{z} . β . pro 4. aut 5.
vicibus inservit.

Perseverandum est in usu istorum
jusculeorum ad minus per decem aut
quindecim dies, & in quarto, vel
quinto quoque jusculo incoqui debet
fenna ad \mathfrak{z} . ij. aut \mathfrak{z} . iij. cum aniso, &
sale tartari ad \mathfrak{z} . β . imò & vicibus al-
ternis etiam dissolvi debet manna ad
 \mathfrak{z} . j. aut \mathfrak{z} . j. β . vel in iis qui infarctus
maiores patiuntur ab humoribus cras-
sis, etiam diacarthamum ad \mathfrak{z} . iij. vel
aliquod ex panchymagogis infra di-
cendis.

Tertio, sumitur jusculum ad fluxio-

Cap. III. *De jusculis alt.* 37

nis tenuis in pectus fluentis acrimo-
niam demulcendam, in affectibus
catharrofis pectoris, tussi diuturna,
&c.

℞. Radic. bugl. fragariæ, an. ʒ. ʒ. ʒ.
radic. schinæ minutim sectæ ʒ. ʒ. ʒ.
folior. cichor. borrag. agrim. capill.
veneris, pimpin. an. M. ʒ. hordei in-
tegrī & flor. rosar. rubr. an. p. i. fiat
decoctio cum frustulo colli carnis vitu-
linæ pro jusculo, quo utatur per 10.
aut 12. dies.

Addi potest in quolibet.

Saccharum rosar. ad ʒ. ij.

Lactis seu butyri aut magisterii sul-
phuris cochlear. ʒ.

Rotularum pectoralium Zyvelser.
ʒ. j.

Antimonium diaphoreticum ad ʒ. j.
recenter parari debet, nam diutius ser-
vatum malignam suam qualitatem re-
cuperat, nempe quia suum sulphur ob
detonationem cum nitro ex parte fi-
xum redditur, dum ex alia parte eva-
porat: fixum autem quod superest red-
ditur volatile, aut temporis diuturni-
tate, aut quia aëri exponitur; & sic ex
diaphoretico fit emericum & cordi in-
fensum.

38 Pars I. *De Alterantibus.*

Vide, num cum fluxione humoris tenuis & acris circa pectus deerrantis, aut tussim excitantis, socientur partium inferiorum intemperies, obstructio, & infarctus: in quo casu non est simpliciter refrigerantibus, incrassantibus & detergentibus utendum, sed etiam leviter aperientibus, & per vices purgantibus, indicatione sumpta à causa producente vitiosos humores, qui fluxionem conservant, dum propter obstructions viarum, nec segregantur, nec per destinata loca expurgantur, sed cum sanguine confusi, in pectus, aliasve partes dilabuntur.

4. Ad tenuem sanguinem incrassandum in hæmoptysi, & ad constringenda vasa, tum quoque ad intemperiem calidam pulmonum corrigendam, ut & in menstruorum & hæmorrhoidum fluxu, &c.

℞. Radic. bugl. symphyti maj. an. ʒ. ʒ. ʒ. fol. lact. portul. plant. pulmon. & millef. an. m. ʒ. rosar. rubr. p. i. f. decoctio cum frustulo carnis vitulinæ pro jusculo per 12. dies sumendo.

Dissolvi potest unum ex his.

Saccharum rosarum tabulatum ad ʒ. iij,

Cap. III. *De juscuis alt.* 39

Magisterium boli armeni.

Terræ sigillatæ.

Corallorum rubror.

Cornu cervi ad 3. β.

Crocus martis adstringens à gr. x.
ad gr. xv.

Cavendum est, ne dum sanguinem incrassare volumus, viscerum obstructions (si quæ sint) augeamus. Tunc enim, ut dictum est, miscenda sunt remedia quæ leviter aperiunt & detergant cum his quæ vasa constringunt, & sanguinis acrimoniam temperant, ut alterantibus & per vices purgantibus admixtis, causa acrimonix & tenuitatis sanguinis, in partibus & humoribus constituta auferatur.

2. Restaurantia juscula præscribuntur ad vires reparandas aut conservandas; quorum formula peculiaris non præscribitur, quia parari solet ab agro ministrantibus. Docere debet solum Medicus hujusmodi jusculum confici ex pingui capone exenterato, & in frustra conciso, detracta pelle & pinguedine, quod deinde ponendum in ollâ vitreata ritè clausa & lutatâ sine ullo liquore, nisi parum aquæ

40 Pars I. *De Alterantibus.*

rosar. & florum aurantiorum addere volueris; deindè coquitur in B. M. ad putrilaginem, seu ferè ad siccitatem. Exprimitur succus, à quo pinguedo separari debet, & servari in vase argenteo, aut vitreo in loco frigido. Ex hoc succo duæ aut tres uncix pro singulis jusculi libris adduntur: aut in alternis jusculis refrigerantibus duo cochlearia miscenda sunt.

3. Purgantia juscula, de quibus infrà, dum de purgantibus & alterantibus.

C A P U T I V.

De Emulsione.

EMulsio est remedium formâ liquidum, ex medullâ fructuum & seminum quorundam contusâ, affuso liquore idoneo instar lactis emulctum.

Componitur ex fructibus qui sunt vel amygdalæ, vel pinei, ex seminibus, nempe quatuor frigidis majoribus, lactucæ, papaveris albi, & cæteris pro rationem morbi, humoris, & intentio-

Cap. I V. *De Emulsione.* 41

nis curativæ. Pro liquore sumuntur aquæ stillatitiæ, vel aqua hordei, vel decoctum ex refrigerantibus, &c.

Uſus plurimi ſunt.

1. Ad ſitim exſtinguendam, & æſtum temperandum, in febribus, cæteriſque calidis affectibus pulmo- num, capitis, &c.

2. Amygdal. dulc. infuſar. in aqua roſar. paria vi. quatuor ſeminum frigid. mai. mundat. an. 3. j. ſemin. lactucæ, & papau. alb. an. 3. j. con- tunde mortario marm. ſenſim affun- dendo decocti hord. vel aquar. portul. & papav. rhœad q. ſ. fiat emulſ. pro 2. doſibus. Adde cuique ſalis pru- nel. vel ſalis polychreſti 3. ſ. ſyrupi violati 3. j. vel de nymphæa 3. ſ. capiat veſperè & manè.

Nota non eſſe præſcribendam emul- ſionem pro multis doſibus, præſertim æſtate, quia vel corrumpitur, vel aceſ- cit, vel vim alterandi remiſſiorem ha- bet; ideoque ſolum pro una doſi, vel pro duabus præſcribenda eſt. Quan- titas fructuum & ſeminum juxta di- ctam formulam augeatur, vel minua- tur, prout unam aut plures doſes vo-

42 Pars I. *De Alterantibus.*

lueris : quantitas liquoris modo major, modo minor est , prout crassior vel dilutior emulsio expetitur : relinquitur arbitrio pharmacopœi dum dicitur q. s.

Cave , ne acida commisceas, quippe substantiam lactescentem facile præcipitant ; ideòque spiritus acidi vitrioli, sulphuris , succus limonum & similes non sunt addendi.

2. In pectoris affectibus calidis pleuritide, peripneumonia, tussi, siccitate pulmonum, febre hectica, &c.

℞. Amygdalar. dulcium præpar. paria vi. 4. semin. frigid. mai. an. 3. i. ℞. semin. lact. & papaveris albi, ana 3. ℞. contunde in mortario marmoreo, sensim affundendo aquar. papau. rhœad. q.s. f. emuls. pro duabus dosibus. Adde cuique syr. viol. vel capill. ven. ʒ. j. salis prunellæ 3. ℞.

3. Ad humoris & urinæ acrimoniam demulcendam, in renum ardoribus, dysuria, gonorrhœa.

℞. Amygd. dulc. præpar. in aqua rosac. infusar. ʒ. ij. 4. semin. frigid. maj. plantag. & portul. an. 3. j. semin. alth. & papav. albi ana ʒ. j. contunde ut artis est, & affunde decocti hordei liquiri

Cap. I V. *De Emulsione.* 43

liquiritiæ q. s. f. emuls. pro duab. dos.
adde cuique, syrupi violati vel de
nymph. ʒ. j. sal. prunel. ʒ. β.

4. In febribus malignis, variolis,
& in quibus diaphoresis iuvanda, æ-
stus caloris temperandus, acrimonia
humorum demulcenda, & vires robo-
randæ.

℥. Amygd. dulc. excortic. ʒ. j.
femin. melon. cucurb. napi, card. be-
ned. an. ʒ. j. contunde in mortario
marmor. sensim affundendo aquar.
scab. papav. rhœad. q. s. f. emuls. pro
duabus dosib. adde cuique, syrupi
limon. ʒ. β. salis prunellæ ʒ. β. con-
fect. hyacinth. ʒ. j. capiat vespere &
mane.

5. In vigiliis immodicis ad spiri-
tum siccitatem corrigendam somnum-
que conciliandum.

℥. Amygd. dulc. excort. infusar.
in aqua rosac. n. vi. 4. seminum frigid.
maj. ʒ. iij. femin. lact. & papav. alb.
an. ʒ. j. contunde ut artis est, & sen-
sim affunde aquæ papav. rhœad. vel
nymph. ʒ. viij. f. emuls. pro una dos.
Adde syrupi de papav. ʒ. iij. vel
nymph. ʒ. β. salis prunellæ ʒ. β.

44 Pars I. *De Alterantibus.*

In debilibus adde confect. hyacinth.
℥. j. vel ʒ. ʒ. ad frangendam vim
narcoticorum cordi inimicam.

In prædictis emulsionibus addi po-
test aquæ rosar. ʒ. ʒ. & si adsit alvi
fluxus ad ʒ. ij.

C A P U T V.

De lacte & sero lactis.

DE lacte nota differentias, usum,
modum præscribendi, & cau-
tiones.

Differentiæ lactis multæ sunt, aliud
enim humanum, temperatius cæteris,
ided naturæ humanæ magis analogum.

Caprillum aliud, mediccris consi-
stentiæ, sed siccioris, seu minùs hu-
midum quam humanum.

Ovillum crassius & minùs serosum.

Asininum maximè serosum & pro-
indè magis laxat, emollit, refrigerat,
& tergit, sed minus nutrit.

Vaccinum crassum & pingue.

Usus plurimi sunt.

I. Ad Nutriendum, pro quo hic

Cap. V. *De lacte, &c.* 45

ordo bonitatis inter lactis genera constituitur, ut primas teneat humanum, deinde caprillum, postea ovillum, mox asininum, ultimò vaccinum.

2. Ad alterandum, & secundum varios scopos, aliud alteri præfertur.

In dysenteria, diarrhæa, mensium & hæmorrhoidum fluxu, tenuitate sanguinis calidioris, vaccinum eligitur; quod si ferre non valeat debilis ventriculus ob crassas quibus constat partes, ovillo, vel caprillo, vel asinino ustulatis utendum.

3. Ad alterandum & nutriendum, ut in phthisicis & febre hæctica consumptis, cæterisque morbis qui refrigerante, detergente & reficiente alimento indigent.

Asininum cæteris præstat, accedat humanum, postea caprillum.

Modus utendi varius est pro diversæ lactis natura. Humanum ab ubere legitur, quodvis ex cæteris recens enucleatum & tepidum sumi debet, jejunus ventriculo & optimè ab excrementis repurgato, nam ob partium tenuitatem facile corrumpitur: quiescendum eo sumpto: non dormiendum capitis

46 Pars I. *De Alterantibus.*

doloribus tentatis aut obnoxiiis, & visceribus æstuantibus; nec comedendum nisi ex ventriculo exciderit. Saccharum aut mel additur, ne corrumpatur & acescat. Nonnullis etiam placet, ut loco sacchari, salis modicum addatur.

Aliquando præscribitur lac humanum, vel vacinum pro omni alimento, maximè in phthisicis, & podagra, cæterisque affectibus, in quibus vel timeamus, ne lac cum alimentis corrumpatur; vel in quibus vis coctrix debilis est ad digerendum solidiora alimenta; aut in quibus non sufficit, ut una vice in die lac exhibeatur: tunc verò quartâ quaque horâ in ea dosi quam ferre potest ventriculus, propinatur, & tempore prandii, tum & cœnæ exhibetur panatella.

Modus præscribendi hic est.

Utatur lacte asinino statim ab ubere extracto per mensem integrum, sumendo *prima* die ℥. iv. sacchari ℥. β. augendo singulis diebus lactis dosim donec pervenerit ad ℥. x. aut ℥. j. & sacchari ad ℥. ij. plus minùs pro ætate, & ventriculi tolerantia, & perseveret in eadem

Cap. V. *De lacte, &c.* 47

copiâ, quam quotidie manè sumat quatuor horis antè cibum, quo tempore neque dormiat neque vehementiùs sese commoveat: in finè sensim minuatur lactis quantitas, donec redeat ad primam dosim.

Eligatur animal sanum, non nimis pingue, ætatis mediæ.

Lac optimum est colore candidum, mediocri consistentia, & sapore dulci præditum.

Pascatur gramine & hordeo, ducatur ad liberum pastum matutinis & vespertinis horis, nec nimis exerceatur ne incaleseat, mundaetur strigilibus, & in loco non fœtido stabuletur.

Cautiones plurimas docet Galenus Comment. in Aphor. 64. sect. 5. Hipp. in quo quibus noceat, & quibus conveniat lac, ostendit. Sed præ omnibus hoc advertendum, ne præscribatur dum adest febris intensior, dum obstructa sunt viscera, impura, vel calidiora, nisi probè repurgata, reserata, & balneis temperata fuerint. Cavendum quoque ne ventriculus sit valdè debilis & frigidus; nam ut in æstuante nidorem contrahit, sic & in frigido acescit.

48 Pars I. *De Alterantibus.*

Nota quod in dysenteria, mensium fluxu, & similibus si præscribatur lac, chalybe sit ustulandum, maximè asininum, minùs vaccinum, & addendum aliquid ex trochiseis incrassantibus, aut adstringentibus. Cave tamen ab ob^ostructionibus, si quæ sint.

2. Lactis asinini, vel vaccini chalybeati, &c. Adde trochisci de terra sigillata, vel de bolo armen. ℞. j. vel 3. ℞. capiat manè & vespere, quatuor horis post & antè cibum.

Partes lactis sunt tres, 1. serosa, quæ tergit: 2. butyrosa, quæ laxat, & emolli: 3. caseosa, quæ sistit & obstruit.

Serum lactis non est alimentum, sed remedium alterans, & non nihil evacuans.

Separatur à reliquis lactis partibus duplici modo. 1. per se, 2. per admixtionem rei separationem juvantis.

Per se secernitur serosa substantia à caseosâ, si lac non nimis recenter emulctum calori exponatur.

Iuvat separationem coagulum vituli, agni, juvat quoque & citò separat liquor acidus, ut acetum, succus limonum, spiritus vitrioli, herba acetosa incocta.

Cap. V. *De lacte, &c.* 49

Modus separandi hic est, fumatur lactis certa quantitas, ponatur in olla vitreata, ut primum bullire incipiet, injice aceti optimi vel alterius prædicti liquoris acidi parum quidem, ne nimium acescat serum: permitte ut bulliant per breve temporis spatium; extrahe ab igne, refrigerato lacte, separatum serum videbis limpidum, si benè præparatum fuerit. Vel quod minus noxium est, utere coagulo, & si non fuerit perventum ad integram separationem, secretum serum pone in patinâ, aut ollâ vitreatâ, & cum modico succo limonum bulliat, refrigera & cola.

Præscribitur verno tempore per xv. dies aut mensem integrum, corpore ab obstructionibus, & ab excrementis libero, post alterantia & purgantia repetita quantum necessitas exiger.

Dosis est ab ℥. viij. ad ℔. j. aut ℔. j. β. manè jejunò ventriculo, addito saccharo rosato in proportionem ad sericopiam, juxta illud quod dictum est de lacte.

Ufus est.

1. Ad refrigerandum, in non valdè

50 Pars I. *De Alterantibus.*

emaciatis, quibus melius competeret lac, vel in iis qui obstructionibus facile implicantur, citius enim penetrat serum quàm lac, in iis quoque, quibus æstuant viscera, præmissis tamen universalibus. Sic præscribitur.

Utatur sero lactis caprilli per mensem integrum, sumendo singula vice, &c. ut suprà diximus de lacte & de saccharo.

2. Ad refrigerandum peculiariter in morbo melancholico, lepra, scabie, renum & hepatis ardore: & maximè si herbæ refrigerantes, ut fumaria, cichorium, acetosa, & in melancholicis epithymum, per aliquot horas macerentur, vel leviter ipsi recenter parato incoquantur.

Sic autem præscribitur.

℞. Seri lactis optimè depurati q. s. infunde per noctem, vel leviter incoque folior. cichor. m. j. ℞. coletur manè ad ℥b. ℞. vel ℥b. j. addendo sacchari rosati ℥. j. capiat manè quatuor horis ante pastum per mensem integrum, augendo dosim singulo die, donec ad ℥b. j. ℞. seri lactis, & ℥. ij. sacchari pervenerit: deinde minuendo,

Cap. V. *De lacte, &c.* 51

donec ad parem primæ dosim revertatur.

Utiliter sic præscribitur in prædictis morbis melancholicis.

℥. Seri lactis optimè depurati q. s. macerentur per noctem, vel statim atque manè paratum fuerit, incoquantur folior. fumarix m. j. epithymi p. j. colaturæ ad ℥. ss. vel ℥. j. adde sacchari rosati, & succi pomorum redolentium ana ℥. j. vel ℥. j. ss. capiat manè, &c.

Quandiu continuabitur usus lactis, aut seri lactis, oportet sextam, vel octavam quamque dosim reddere purgantem, ne lac aut serum lactis contactu excrementorum, quæ ab ipso aut ab alimentis sobolescent, corrumpantur. Hoc autem exequimur dissolvendo in lactis aut seri dosi syrupi magistralis purgantis morbo appropriati ℥. ij. vel incoquendo sero lactis sennæ cum aniso 3. iij. vel etiam in his qui uberiori indigent purgatione, dissolvendo in hujusmodi tinctura sennæ, mannae ℥. j. vel ℥. j. ss.

Quibus inest frigidus ventriculus, somnus suadet statim ab assumpto lacte; quibus verò calidus prohibetur.

52 Pars I. De Alterantibus.

imò in gracilioribus & calidioribus visceribus per usum lactis, aut feri lactis, balneo, aut semibalneo uti prodest, sumendo lactis aut feri dosim statim in ingressu balnei aut post horæ quadrantem.

C A P U T. VI.

De Hordeato.

VEteres idem dicebant ptisanam, quod nos hodiè hordeatum vocamus. Conficiebant ex hordeo mundato in aqua perfectè cocto, ex quo cremor hordèi eliciebatur, qui febricitantibus erat pro cibo. Nos verò mutato nomine hordeatum dicimus illud quod antiqui ptisanam.

Hordeum duplex est, 1. integrum : quod refrigerat & exsiccet in 1. gradu, & ratione corticis detergit, docente Galeno. 2. Excorticatum, illud nempè quod hordeum mundatum dicitur, quod refrigerat & humectat : proindè succum præstat laudabilem & aptum omnibus morbis acutis, febri-

Cap. VI. *De Hordeato.* 53

bus hecticis, iisque quibus tussim, & thoracem leniendo juvat *ἡυαλισμὸν*.

Uſus multiplex eſt.

1. Ad temperandam humorum acrimoniam in macilentis.

℞. Hordei mundati ℥. ij. decoque in aquâ fontis, ſed primùm fervēfacta abjiciatur, nova addatur, & coquatur igne lento ad crepaturam, trajice deinde per colum, & ad ℥. viij. liquoris adde ſacchari ℥. ij. capiat manè jejuno ventriculo, & veſperè dum it cubitum. Addi poteſt aqua roſar. vel ſuccus pomor. redolent. ad ℥. j.

2. Ad tabidos, hecticosque humectandos, nutriendos; & in empyicis, aut phthiſicis ad expectoratum promovendum.

℞. Hordei mundati optimè loti lb. β. plus minus prout neceſſitas exiger, fiat decoctio in aquâ fontis puriſſimâ lento igne uſque ad perfectam crepaturam, aquam colo ſepara, & extrahe pulſam ab hordeo per ſeta- ceum, quæ ſerveatur in vaſe argenteo, aut terreo vitreato optimè cooperto, in loco frigido non multùm humido, quia citò liqueſceret. De qua pulpa,

54 Pars I. *De Alterantibus.*

duo aut tria cochlearia dissolve in jusculo, & coquantur per semihoram ad modum liquidæ panatellæ, addendo sacchari rosati ℥. β. capiat bis aut ter in die.

Non est magna quantitas paranda; potissimum æstare, ne acescat; recens enim paratum magis humectat & nutrit.

Ad eundem scopum paratur hordeatum tenue sub jusculi forma, ut

℥. Hordei mundati vel integri optimè loti ℥. ij. coque cum frustulo colli carnis vitulinæ, vel cum pullo gallinaceo, colatura sumatur instar liquidioris panatellæ, cum vel sine saccharo.

Nota 1. quòd hordeum integrum magis convenit, cùm intentio est potius abstergere, quam incrassare, & metus est obstructionum.

2. Videndum, num viscera in imo ventre obstructiones patiantur, aut infarctus sit in mesenterio; tunc enim noceret usus hordeati, augendo obstructiones, in quo casu, si macies, tussis, & aliæ indicationes usum hordei infirmant, sic paranda juscula.

℥. Hordei integri M. β. radic.

Cap. VII. *De Hydromelite.* 55
gram. brusci an. ℥.j. β. coque cum
frustulo colli carnis vervecinæ, vel
cum pullo, addendo sub finem cichor.
totius, pimpin. agrim. politrici, ana
M. β. colaturam capiat manè.

3. Ad leniendam tussim in rheu-
mate, & aliis calidis affectibus, ut &
in convalescentibus ad somnum con-
ciliandum.

℥. Hord. integr. M. j. coque in
aquæ fontis lb. iij. donec fiat con-
sumptio ad lb. j. cola sine expressione;
aquæ sic paratæ parum incoque saccha-
ri ℥. ij. pone in phiala vitrea, capiat
℥. vj. vel viij. addendo aquæ rosarum
℥. β. in qualibet dosi. Debet sumi ter
in die, manè, de meridie hora quarta,
& in lecti ingressu.

C A P U T V I I .

De Hydromelite.

QUod à veteribus dicebatur meli-
cratum, aut mulsæ, à nobis hy-
dromel vocatur.

Duplex est simplex, vel compo-
situm.

36 Pars I. De Alterantibus.

Simplex etiam duplex est, aquosum seu dilutius, quod à Mesve paratur ex mellis una parte, & octo aquæ. Hodie verò constat ex aquæ decem aut duodecim partibus, & una mellis. Aliud vinosum dicitur, quod meracius est, vini saporem & colorem redolet, fitque ex quatuor aquæ partibus & una mellis.

Nos in his regionibus calidis aquoso tantum utimur pro ptisana in morbis frigidis capitis, nervorum, senum tussi, aut quando abscessus internus ruptus est in ventre infimo, aliave parte, cum detergendi, roborandi, & à putredine præservandi adest indicatio.

℞. Mellis opt, ℥b. β. aquæ fontis ℥b. v. coque & detrahe spumam, & cum non amplius spumaverit cola, & pone in phiala vitrea, utatur pro potu ordinario.

C A P U T VIII.

De Ptisana.

QUOD ab antiquis vocabatur ptisana erat cibus ex hordeo perfectè cocto : apud recentiores ptisana dicitur illud , quo in morbis utimur pro potu ordinario.

Componitur ex variis secundum intentionem medici , vulgo non præscribitur pharmacopœis , sed aegro ministrantibus.

Ufus multi sunt.

1. Ad refrigerandum , & humectandum in febrientibus biliosis , sanguineis , tussiculosis.

℞. Hordei integ. M. ℥. aquæ fontis ℔. vi. aqua fervescata abjiciatur, nova addatur , & fiat decoctio ad tertiæ partis consumptionem , utatur pro potu ordinario.

Vel

Utatur hydrosaccharo pro potu ordinario.

Componitur ex duodecim aquæ

58 Pars I. De Alterantibus.

Partibus & duabus sacchari, ut si sit lb. j. aquæ, debent esse sacchari ℥. ij. plus minus pro ægri voluntate, & morbi exigentia, læpe à vase in vas debet transfundi. Prodest in febribus ardentibus, tertianis, synöchis, cholera morbo, cæterisque putredine comitatis, in quibus æstus admodum urget, si succus limonum recenter expressus immisceatur ad gratam aciditatem, & sic fiet potus, qui vulgo dicitur limonade; bilis coërcet motum, & temperat æstum.

2. Ad refrigerandum & aperiendum in calidis affectibus, in quibus adsunt obstructions.

℥. Hord. integ. M. β. parum coque & aquam projice, deinde adde radic. graminis præparati & contusi ℥. j. β. aquæ fontis lb. viij. fiat decoctio ad tertiæ partis consumptionem, colatura utatur pro potu.

Addi potest in singula dosi, æstu & siti urgente, sal prunellæ ad 3. β. vel 3. j. & ubi adest putredo aut malignitas, possunt etiam cum sale prunellæ immisceri iv. aut v. guttæ spiritus sulphuris, & ad majus refri-

Cap. VIII. De Ptisana. 59

gerium addi, syrupus aliquis intentioni aptus, ut syrupus limon. capill. ven. violatus, maxime si adsit æstus pulmonum, tussis, in quo casu prædicta acida minus competunt, quia noxia sunt in morbis pulmonum calidis.

In febribus verminosis puerorum cæterisque acutis, aut malignis.

℥. hord. integ. p. ij. rad. acetosæ & gram. an. ℥. j. aquæ fontis lb. viij. fiat decoctio, colatura ponatur in phiala vitrea, in qua aliquot frusta acidi limonum misceantur.

Æstivo tempore, & autumnali convenienter nive aut glacie ptisana refrigeratur in omnibus affeibus calidis, etiamsi adsit alvi fluxus à bile. Cave tamen ne obstructions & infarctus insignes adsint, aut aliqua inflammatio interna hepatis, lienis, mesenterii, pleuræ, pulmonum, uteri; tunc enim potus glacie refrigeratus est toxico peior, quia magis inpingit materiam, & resolutioni ineptam reddit, unde *νένεσις*.

In quartanâ & cæteris morbis melancholicis.

℥. Radic. brusci ℥. j. folior. cete-

60 Pars I. *De Alterantibus.*

rach. M. ſ. fiat decoctio cum aquæ lb. vi. colatura utatur per ſe vel cum vino tenui, ſi non repugnet febris.

In affectibus calidis pectoris, paratur ex hordeo integro, liquit. paſſul. mund. jujubis, & aliquot fruſtis pomi redol.

3. Ad exſiccandum in morbis frigidis & humidis cerebri, nervorum, & ſimilibus.

℥. Radic. chinæ in taleolas ſectæ, vel falſæ parillæ minutim ſectæ ℥. j. aquæ fontis lb. vi. infunde tepidè per duodecim horas, deinde f. decoctio ad tertiæ partis conſumptionem, addendo ſub finem cinnamomi vel coriandri præparat. in nodulo incluſi 3. ſ. colatura utatur pro potu ordinario.

4. Ad adſtringendum in dyſſentia vel alvi fluxu à cauſa calida.

℥. Raſuræ eboris & cornu cervi an 3. ſ. aquæ fontis lb. vi. f. decoct.

Vel

℥. Roſar. rubr. ſicc. ℥. j. aquæ tepidæ lb. iiij. ſpiritus vitrioli 3. j. infunde tepidè per ſex horas, colatura per ſe utatur, vel addendo ſacchari albi ℥.

Cap. VIII. De Ptisana. 61

iv. hoc modo parata ptisana dicitur tintura rosarum.

Dissolvi potest in qualibet dose exhibenda, aliqua quantitas syrupi cydonior. vel granatorum, vel parum conservæ rosar. Genuensium, vel sequentis julepi Alexandrini.

℥. aquæ rosar. ℥. x. sacchari albi ℥. ij. coquantur parum, & utatur per se ex cochleari, vel cum aqua pro potu ordinario.

Vel.

℥. Aquæ rosar. succi cydonior & granat. an. ℥. iv. sacchari albi ℥. iiij. coquantur parum ad eundem usum.

Quando adest febris, putredo, & alvi fluxus, ad leniendam tussim, nauseam, bilis fervorem.

℥. Aquæ rosar. succi granat. & lim. recenter expressi, an. ℥. iv. sacchari albi ℥. iiij. coque parum & eodem modo utere.

Valent prædicta in mensium, & hæmorrhoidum fluxu, hæmoptysi, &c. sequens etiam pro iisdem affectibus decoctum utile est.

℥. Rad. consolidæ maj. ℥. j. β. aquæ font. ℔. iiij. fiat decoctio, colatura utatur pro potu ordinario.

62 Pars I. De Alterantibus.


. Vel

℞. Rasuræ eboris 3. j. aquæ fontis
℥b. iij. coquantur paucò tempore; co-
latura utatur per se, vel cum succis
prædictis, aut cum julepo Alexan-
drino.

Paretur ptisana ex sola infusione
millefolii & pimpin. æstate frigide,
hyeme tepide, per 4. horas.

§. Ad refrigerandum, aperiendum,
& aliquatenus nutriendum, cum deli-
nienda est humorum acrimonia, ob-
structiones referandæ, ulterior ma-
cies impedienda, ut in febribus
biliosis, lentisque, tabe, graci-
libus quoque, & abhorrentibus jus-
cula.

℥. Hordei integ. M. j. rad. gram.
3. ij. f. decoctio cum pullo gallin.
in ℥b. vj. aquæ fontis ad medias, de-
colatur. copiat cyathum bis terque diu
noctuque.



S E C T I O II.

De Alterantibus Specificis.

IN curatione morborum, non quælibet remedia, sed parti laboranti propria & specifica, sunt eligenda; sic in cerebri morbis utimur cephalicis, &c.

Specifica igitur sunt, quæ non tantum præparant humores, sed & certa quadam substantiæ proprietate partes roborant, tonum ipsarum conservando, aut restituendo, dum earum intemperiem corrigunt.

Nota quod, nusquam morbi sunt simplices, nec unâ solum nisi rarissimè pars affecta: unde in omnibus morbis sociandæ sunt indicationes, habitâ semper consideratione majori urgentioris morbi, aut partis.

CAPUT I.

De Cephalicis.

Cerebrum, ob propriam temperiem frigidam & humidam, figuram quoque, & situm, sæpius frigidis & humidis tentatur affectibus; aliquando etiam ob sanguinis & bilis æstum calidis siccisque morbis detinetur; nonnunquam etiam mixtis ex utrisque, ut in comate vigili, lethargo, typhomania & similibus.

Propter hoc, remedia cephalica vel sunt calefacientia & exsiccantia in morbis frigidis & humidis, vel frigefacientia & incrassantia in calidis & siccis; vel mixta ex utrisque.

In causa frigida, apoplexia, epilepsia, paralyfi, tremore, dolore, intemperie.

℞. Radic. enulæ camp. valerianæ, & pæon. maris decresciente luna collectæ, ana ℥. j. polypodii & visci quercini, an. ℥. ss. folior. betonicæ, chamæpit. primulæ veris, melissæ, cichor.

Cap. I. De Cephalicis. 65

totius , agrim. an. M. j. semin. pæoniæ
maris, feseleos massil. coriandri præpar.
an. ʒ. ij. flor. anthos , tiliæ , lili con-
vallium , an. p. i. f. decoct. ad lb. i. ʒ.
pro 4. dos. non claris , sed sapius co-
latis , adde cuique syrupi de stœchade,
vel ozymelitis simplicis ʒ. ʒ. capiat
manè 3. horis ante iusculum.

Potest addi in qualibet dosi , vel
cum alio remedio propinari.

Spiritus meliss. vel angel. zedoariæ
ad gutt. x. vel alicujus ex his extractum
ad ʒ. j.

Sal angelicæ vel meliss. ad ʒ. j.

Extractum ambræ gris. ad gr. ij.

Spiritus antapoplecticus Schroderi à
gutt. vi. ad x.

Nota quod , in dicto apozemate
semper miscenda sint quædam refrige-
rantia , eaque quæ hepati & lieni prof-
piciunt , ne dum calefacimus cere-
brum , sanguinis & viscerum calorem
intendamus.

In causa calida , ut dolore , delirio,
mania , intemperie calida & sicca spi-
rituum , &c.

℞. Hordei mund. ʒ ʒ. rad. acetosæ,
bugl. & cichor. an. ʒ. j. folior. utriusque

66 Pars I. *De Alterantibus.*

buglos. lact. cich. portul. an. M. j. seminum 4. frigid. maj. lact. & papav. albi, ana 3. j. florum cordial, nymph. ana p. j. fiat decoct. ad lb. j. ss. pro 3. dof. adde cuique, syr. viol. vel de nymph. 3. j. salis prunellæ 3. ss.

In forma julepi & emulsionis, formulæ traditæ sunt in proprio capite.

C A P U T II.

De ophthalmicis & collyrio.

Ophthalmica dicuntur, quæ destinantur ad affectus oculorum sanandos, visumque roborandum.

Forma remedii in qua præscribuntur dicitur collyrium, quod est topicum ophthalmicum oculorum affectibus conveniens. Sic dicitur græco vocabulo à sistenda fluxione.

Pluribus modis componi solet, nempe vel in forma liquoris, vel pulveris, vel linimenti, vel cataplasmatibus; unde aliud est liquidum, aliud siccum, usus obtinuit, ut liquidum verè & propriè vocetur collyrium.

Usus

Cap. II. *De ophthalm. &c.* 67

Vfus est.

1. Ad repellendam in principio fluxionis, aut inflammationis à causa calida.

Nota quòd, frigida repellentia non vehementer sed mediocriter debent esse adstringentia, maxime in principio, & nondum præmissis universalibus, ne humores reprimantur; & prohibeatur eorum effluxus.

℞. Aquar. rosar. plantag. ana ℥. ij. liquoris albumin. ovi agitati spumâ detractâ ℥. j. trochis. albi Rhasis sine opio ℥. ss. misce fiat collyr. de quo sæpè aliquot guttæ instillantur in oculum, & lintea in eo imbuta superponantur.

Vel

℞. Albumen ovi, agita, dilue aqua rosar. & oculum ablue.

℞. Mucilaginis seminis psyllii & cydon. extractæ cum aqua rosar. ℥. ij. aquæ agitationis album. ovi & plantag. an. ℥. j. camph. gr. ij. fiat collyr.

Vel

℞. Aluminis frustum, agita cum ovi albumine, donec unguenti consistentiam acquirat, de quo extende su-

D

68 Pars I. *De Alterantibus.*

pra linteum, & oculis tepidè applica,
remove cum fuerit exsiccatum.

Vel

℥. Salis Saturni ℥. j. β. aquæ ro-
sar. ℥. ij. misce, & oculos fove.

2. Ad dolorem leniendum, qui ob
exquisitum oculorum sensum sæpius
acutissimus est.

℥. Macilag. semin. cydon. & psyll.
extract. in aquæ rosar. ℥. j. β. lactis
mulieb. & aquæ album ovi detracta
spuma, ana ℥j. trochiscor. albi Rhasis
cum opio ℥. β. f. Collyrium.

Vel

Vtere solo lacte muliebri ab ubere
sanæ mulieris infuso in oculum, vel
laminâ carnis vervecinæ, hædinæ, vi-
tulinæ, frequenter admovenda.

Vel in forma cataplasmatjs.

℥. Pulpæ pomi dulcis sub cineri-
bus cocti ℥j. mucilag. semin. alth.
extract. in aqua rosar. ℥j. β. liquoris
albuminis ovi cum aqua rosar. agitati
℥. β. fiat cataplasma.

Vel

℥. Pulpæ pomi cocti ℥j. micæ pa-
nis albi ℥. β. cum lacte muliebris fiat
cataplasma,

Cap. II. De ophthalm. &c. 69

Nota, quòd in ingenti dolore addi possit in dicto cataplasmate granum unum opii & croci.

3. Ad repellendum, & dolorem leniendum, quando fluxio simul est cum dolore.

℞. Aquæ plantag. ʒ. j. β. mucilag. sem. psyllij, alth. extract. cum aqua rosar. ʒ. j. trochisc. albi Rhasis cum opio ʒ. β. fiat collyrium.

4. Ad repellendum, & aliquatenus resolvendum, ut in augmento ophthalmiæ cæterisque casibus, in quibus repellenda materia fluens, fluxa digerenda, & dolor leniendus.

℞. Aquar. rosar. euphras. an. ʒ. j. lactis muliebris recentis ʒ. β. tuth. præp. ʒ. j. β. fiat collyrium.

Vel

℞. Aquæ rosar. & liquoris albuminis ovi an. ʒ. j. β. tuthiæ præp. & trochisc. albi Rhas. sine opio an. ʒ. i. f. collyr.

5. Ad resolvendum in statu ophthalmiæ, & cæteris casibus in quibus digerenda materia, & parum repellenda.

℞. Sarcocollæ lacte nutritæ ʒ. i. tuthiæ præp. ʒ. β. mucilag. sem. cydon.

70 Pars I. *De Alterantibus.*

extract. cum aqua rosar. & fœnic. \mathfrak{z} .ij.
f. collyr.

Vel

\mathcal{R} . Tuth. præp. \mathfrak{z} . i. β . vitrioli albi
gr. x. aloës lotæ \mathfrak{z} i. sacchari candi \mathfrak{z} ij.
contere & infunde in aquæ fœniculi
& Euphrasæ, ana \mathfrak{z} . i. β . colentur &
f. collyr.

Vel

\mathcal{R} . Salis Saturni gr. xv. salis armon-
niaci gr. iii. aquæ rosar. \mathfrak{z} . iii. misce
utere pro collyrio.

Vel

\mathcal{R} . Vitrioli albi \mathfrak{z} . i. aquæ planta-
ginis \mathfrak{z} . i. v. infunde cola, & utatur
pro collyrio.

6. Ad exsicccandum & digerendum.

\mathcal{R} . Tuthiæ lotæ in aqua Euphra-
siæ \mathfrak{z} . i. β . aloës hepaticæ similiter lotæ
 \mathfrak{z} . β . mellis optimi, & pomatæ recen-
tis, ana \mathfrak{z} . β . f. collyrium, quo oculor-
canthi, & palpebræ illiniantur.

Vel

\mathcal{R} . Aquæ Reginæ Ungariæ \mathfrak{z} ii.
aqua rosar. \mathfrak{z} . ii. misce & utere pro
collyrio.

7. Ad detersionem; & consumptio-
nem albi ginum, macularum reliquias

Cap. III. *De Bechicis.* 71

digerendas, & cicatricem tollendam.

℞. Sacchari candi ℥ii. vitrioli albi, gr. viii. ossis sepia, stercoris lacerti, & myrrhae, an. ʒ. ss. fiat omnium pulvis tenuissimus excipiendus melle maiali & pomata recenti.

8. Ad scabiem & pruriginosam palpebrarum.

℞. Vini albi, aquæ rosar. ag. ʒ. i. aloës hepaticæ subtiliter pulverisatæ ʒ. i. misce, & utatur pro ablutione palpebrarum tepidè.

In usu prædictorum collyriorum.

Nota 1. non esse adhibenda nisi præmissa fuerint universalia, aut simul in usum veniant.

2. Pulveribus solis rarò esse utendum, quia insufflati fluxionem movent.

C A P U T III.

De Bechicis,

Bechica remedia dicuntur, quæ spiritum movent, thoracica etiam vocantur à parte evacuanda.

Sunt enim bechica medicamenta,

72 Pars I. De Alterantibus.

quæ pulmoni & cæteris thoracis partibus familiaria existunt, & contentos humores in pectore aptos reddunt, ut tussi faciliè excerni possint.

Ut humores in pectore contenti faciliè excludantur, non debent esse nimis crassi, quia cludunt vim moventem; neque nimis tenues, quia impulsu diffiliunt in partes; sed mediocris consistentiæ: ob id duo genera remediorum conveniunt.

Primum, est eorum, quæ pituitam calefaciunt, attenuant, detergant, & incidunt.

Secundum. Est eorum, quæ bilem refrigerant, humectant, incrassant, ejusque demulcent acrimoniam.

Forma remedii sub qua utraque adimpletur intentio, est apozema, julep, emulsio, jusculum, looch.

Apozema præparans pituitam in omnibus frigidis pectoris affectibus, asthmate, pulmonum infarctu, catarrho pituitoso, & similibus.

℞. Radic. brusci, apii, enulæ campanæ, ana $\frac{3}{4}$. j. fol. tussilag. hyss. scab. hed. terrestris, capill. ven. cichor. totius, an. M. j. liquir. rasæ & contusæ

Cap. III. *De Bechicis.* 73

ʒ. ss. passul. purgat. ʒ. j. semin. alth.
melonum, ana ʒ. ij. florum cordial.
chamom. an. p. j. f. decoct. ad lb. j. ss.
pro 4. dosib. addē cuique, syrupi de
tussilag. vel oxymel. simpl. ʒ. j.

Vel in forma julepi.

℞. Aquar. scab. tussil. ana ʒ. ij.
aquæ cinam. ʒ. ij. oxymelitis simpl. vel
syr. capill. ven. ʒ. j. fiat julepus.

Cum remedii forma erit mutanda,
parari potest jusculum ex aliquot radi-
cibus, & herbis præcedentis decocti.

In qualibet dosi dissolvi potest ali-
quod ex chymicis sequentibus.

Oleum anisi arte chymicâ extractum,
ad gutt. iv.

Tinctura sulphuris, ad gutt. vi.

Lac aut magisterium sulphuris, ad
gr. x.

Flores benioini, ad gr. iv.

Tinctura ex vitriolo antimonii, ad
gutt. vi.

Possunt eadem sumi cum remedio in
alia forma præscripto, nempe cum
opiata, tabellis, &c. præmissis tamen
suffICIENTER universalibus.

℞. Flor. benjoin. gr. iij. magist. sulph.
gr. vi. misce & sumat singulo manè

74 Pars I. *De Alterantibus.*

per 15. dies cum ovi vitello, vel cum opiata appropriata.

Nota 1. quòd si adsit febris, vel calida viscerum intemperies, componenda sint decocta ex bechicis refrigerantibus, quæ sint tenuium partium.

Nota 2. miscenda semper esse calidioribus ea quæ leniunt, humectant, & modicè refrigerant, ne pituita ab intensiori calore exsiccata contumaciùs adhærescat: ob id addenda sunt cichor. liquiritia, passulæ, semina melon. alth. & similia.

Nota 3. dum respicimus pituitam præparandam in pectore, semper habendam esse rationem viscerum, & capitis, & omni judicio assequendum est num dyscrasiâ calida, obstructione, aut imbecillitate laborent, aut reliquæ abdominis partes infarctu; tunc enim pariter iis prospiciendum, quia frustra studemus pectori succurrere, si causis antecedentibus, aut complicatis affectibus non opitulamur.

Bechicum bilem & tenues humores incrassans, leniens, humectans, & refrigerans, sputum quoque

Cap. III. De Bechicis. 75

tenue ad mediocrem consistentiam deducens in phthificis, peripneumoniacis, & similibus.

℞. Fol. cich. totius, capillor. [ven. pūpin. pulmon. utriusque buglossi, an. M. i. semin. 4. frig. mai. lact. & papav. albi, an. 3. ij. liquir. & passul. purgatar. an. 3. ss. jujub. paria iv. hord. integ. & flor. cord. an. p. i. f. decoct. pro 4. dof. vespere & manè sumendis: adde cuique, syrupi jujub. violati, vel capill. ven. 3. i.

In Empyemate ad coctionem, maturationem materiæ, & expectoratum, sic præscribitur.

℞. Radic. consol. maj. & alth. an. 3. i. fol. agrim. cichor. cum toto, capill. ven. scab. tussilag. an. M. i. 4. semin. frig. mai. an. 3. ij. liquir. rasæ & contus. passul. mund. an. 3. i. hord. integ. & flor. cord. an. p. i. f. decoct. pro 4. dof. adde cuique, syr. de tussil. vel capill. ven. 3. i.

Contra sputum sanguinis, & dysenteriam singulare est sequens decoctum.

℞. Rad. pentaph. tormentil. symphyti mai. ana 3. i. fol. cich. sylve-

76 Pars I. De Alterantibus.

stris cum toto , portulac. plantag. tenellæ , hederæ terrest. equiseti , milles. an. M. j. semin. lact. portul. papav. albi , an. ʒ. ii. flor. rosar. rubr. papav. rhœad. an. p.i. f. decoct. colaturæ ad ℥. j. β. adhuc ferventi iniice conserv. rosar. rubr. & papav. rhœad. an. ʒ. j. spiritus vitrioli ʒ. β. infundantur vase cooperto supra calidos cineres per tres horas , deinde fiat colatura pro 4. dos. adde cuique , syr. de ros. sicc. vel de corallis ʒ. vi. capiat manè & vespere.

C A P U T IV.

De Looch.

ITA vocantur ab Arabibus , & à Græcis *ἐλεγμα* , à Latinis Lin-
aus.

Est medicamentum consistentiâ medium inter syrupum & opiatam , utpote syrupo crassius , opiatâ dilutius , quod ore sumptum roris ad modum stillat in asperam arteriam ; in affectibus pectoris conveniens.

Cap. I V. *De Looch.* 77

Aliud officinale, quod non est amplius in usu, aliud magistrale, quod ex tempore pro morbi exigentia præscribitur.

Componitur, vel ex pulveribus, bechicis, & syrupis; vel ex pulpa fructuum, pulveribusque & syrupis; vel ex decocto pectorali.

Communiter tamen fit ex pulveribus & syrupis, aliquando etiam ex conservis.

Tempus sumendi est, cum adest necessitas sputum educendi, & juvandi,

Ufus plurimi sunt.

1. Ad sputum juvandum, quando materia frigida & crassa est, ut in asthma, tussi à pituita bronchiis impacta, & similibus.

℞. Pulver. diaireos simplicis & sacchari candi, ana ʒ. ii. conserv. tussil. & capill. ven. an. ʒ. β. oxymel. scillit. q. s. f. looch. utatur cum baculo liquir. sensim lambendo.

Vel

℞. Squillæ præpar. ʒ. ij. pulver. diaireos, hyss. an. ʒ. ss. myrrh. ʒ. j. croci gr. ij. mellis maialis q. s. f. looch.

78. Pars I. *De Alterantibus.*

℞. Mellis opt. & butyri recent. an.
℥. i. sacchari candi ℥. ij. terebinthina
venetæ lotæ in aqua scab. ℥. β. f.
looch.

Vel

℞. Syr. de tussil. & capill. ven.
ana. ℥. j. ss. oxymelitis simpl. ℥. j.
misce, utatur ex cochleari sensim
lambendo.

2. Ad sputum juvandum, quando
materia tenuis est & calida, in pleuri-
tide, peripneumonia, &c.

℞. Penidior. sacchari candi, an.
℥. ij. pulver. diatragacanthi frig. ℥. ss.
syrupi violati & jujubini, q. s. fiat
looch. utatur cum baculo liquir.

Quando materia est mixta ex tenui
& crassa, miscenda sunt quædam atte-
nuantia, ut.

℞. Penidior. & pulveris diaireos
simplicis, ana ℥. i. β. sacchari ros. ℥. j.
syr. de tussil. q. s. f. looch.

Looch. incrassans, leviter detergens
in empyemate.

℞. Pulpæ radic. alth. vel passul.
℥. i. ss. sacchari candi ℥. ss. succi li-
quir. ℥. β. cum syr. de tussil. f.
looch.

Cap. V. *De Looch.* 79

3. Ad sanguinis sputum compescendum.

℥. Conservæ rosar. ℥. i. pulver. diatragacanthi frigidi ℥. ii. syrupi de rosis siccis q. s. f. looch.

Vel

℥. Succī portul. ℥. iij. gummi arabici ℥. i. β. sacchari rosati, q. s. f. looch.

Vel

℥. Albumen ovi, agita cum aqua rosacea, spumam separa, & adde semin. papav. albi & plant. an. ℥. β. amyli ℥. j. sacch. ros. q. s. f. looch.

Vel

℥. Syr. viol. de ros. sic. & de papav. an. ℥. ij. fiat mixtura, de qua sumat unum, aut alterum cochlear sensim deglutiendo, ter diu noctuque.

Cave : ne nimis adstringentibus extravasatum sanguinem in pulmonibus detineas.

4. Ad exsiccanda & glutinanda pulmonum ulcera in phthisi.

℥. Conservæ rosar. & consol. maj. an. ℥. j. gummi tragacanthi & arabici leviter torrefacti ana ℥. ij.

80 Pars I. *De Alterantibus.*
plantag. & papau. alb. ana ʒ. ʒ. cum
lyr. de ros. sic. fiat looch.

Vel

Quod prodest diurnæ tussi, pul-
monis, fauciumque ulceribus gluti-
nandis, asperitatibus arteriæ leniendis,
in tussi, sputo sanguinis è faucibus
eperumentis catarrho, raucedine.

℞. Pulpæ rad. alth. vel liquir.
ʒ. iij. mucilag. gummi arab. tragagant.
extractæ cum aqua rosar. ʒ. i. ʒs. sacch.
ros. q. s. f. looch.

ʒ. Ad tenuem fluxionem in pectus
ruentem in hæmoptoicis cum tussi,
vōcis raucedine, cum vel sine febre.

℞. Aquæ ros. ʒ. vi. semin. cydon.
mundat. ʒ. i. ʒs. sacchari candi vel
albiss. ʒ. ij. pone omnia simul in phiala
vitrea per 4. horas, fiat liquor muc-
ilaginosus, quo utere sæpè diu noctu-
que ex cochleari.

Potest etiam parari ex æquis partibus
aquæ florum. papau. rhœad & rosar.

C A P U T V.

De Cardiacis.

Cardiacæ sunt, quæ cor roborant, spiritus reficiunt, & malignam qualitatem expellunt. Debile fit cor ob intemperiem frigidam vel calidam, à causa frigida vel calida, cum vel sine malignitate ob id remedia quæ conveniunt, alia sunt calida, alia frigida, alia alexipharmaca.

In causa frigida, ut in affectibus à veneno frigido sumpto, vel intus genito, morfu à cane rabido, peste, & similibus, modò non adsit febris, aut non sit valde intensa.

℞. Radic. tormentillæ, zedoar. gentianæ an. ʒ. ss. fol. melis. scab. card. bened. scordii ana M. i. corticem citri sicci ʒ. iij. semin. card. bened. citri, an. ʒ. ij. rasuræ eboris ʒ. i. ss. flor. bugl. utriusque, & anthos. an. p. j. f. decoctio ad lb. j. ss. pro ʒ. dosibus; adde cuique, syr. byzant. vel de cor-

82 Pars I. De Alterantibus.

tice citri ꝓ. vi. capiat vespere & mane.
Vel in forma julepi.

℞. Aquar. meliss. card. bened. an.
ꝓ. ij. ꝓ. naphæ ꝓ. ꝓ. aquæ cinnam. co-
chlear. ꝓ. syr. de kermes. ꝓ. ꝓ. fiat
julepus.

Potest dissolvi in prædicto apoze-
mate, julepo, vel aqua scabiosæ aut
vino unum aut alterum ex sequentibus
Galenicis & chymicis.

Confectio alkerm. à ꝓ. ꝓ. ad ꝓ. i.
Theriaca à ꝓ. ꝓ. ad ꝓ. j.

Aqua theriacalis Bauderoni ad co-
chlear. i.

Aqua theriacalis camphorata ad ꝓ. ꝓ.

Sal volatilis viperinus, à gr. x. ad xv.

Elixir proprietatis Paracelsi, à gutt.
viii. ad xii.

Extractum bezoardicum Quercetani
à ꝓ. ꝓ. ad ꝓ. j.

Magisterium ambre griseæ à gr. ij.
ad iiij.

Essentiæ ambre griseæ, à gutt. vi.
ad viij.

In casu præcipiti viribus evanes-
centibus, quando tempus non datur
parandi aliud remedium.

Cap. V. *De Cardiacis.* 83

℞. Confect. alkerm. vel theriacæ
vet. ʒ. β. vel ʒ. j. cum aquæ cinnam.
vel vini optimi cochlear. misce & pro-
pina.

Sapè etiam prædictæ essentiæ ex-
hibentur simpliciter cum aqua appro-
priata vel vino, ut:

℞. Salis volatilis viperarum gr. x.
aquæ scorzonæræ, vel cardui benedi-
cti ʒ. j. β. misce, capiat longè post,
& ante iusculum.

Vel

℞. Magisterii ambæræ gris. gr. ij;
aquæ theriacalis camphoratæ ʒ. β. mis-
ce & capiat.

Cave, ne iis utaris dum calida sunt
viscera, aut febris est intensa, proin-
de non debent esse in usu, nisi in causa
frigida: aut quando tanta est maligni-
tas cum virium imbecillitate, ut febris
non sit, vel saltem exigua.

In causa calida, ut febribus mali-
gnis purpuratis, variolis, & cæteris
pestilentibus affectibus cum febre, in
quibus æstus temperandus, obstru-
ctiones reserandæ, putredo & maligna
qualitas coercenda, & diaphoresis
promovenda.

86 Pars I. *De Alterantibus.*

adeſt inflammatio interna, aut febris admodum intenſa.

Quandoque etiam exhibentur cardiaca ſub forma pulveris cum aqua cordiali, vel cum juſculo, ut

℞. Bezoardici animalis, ſalis prunellæ, magiſterii perlarum, ana ʒ. ʒ. miſce, capiat ℥. i. cum alterno juſculo, vel cum aqua ſcorzoneræ, aut ſcab. bis au ter in die.

Vel

℞. Bezoardici mineralis ʒ. ij. Iovialis ʒ. ʒ. ſalis prunel. ʒ. j. ſs. miſce f. pulvis, doſis eſt ad ℥. j.

C A P U T VI.

De Stomachicis.

Stomachica ſunt, quæ peculiariter ventriculum, & humores in eo contentos alterant, ſimulque appetentiam, coctionem, retentionem, cæterasque ejus functiones adjuvant & confirmant.

Horum alia ſunt calida, alia frigida, prout ventriculus afficitur morbis

Cap. VI. *De Stomachicis.* 87

& humoribus frigidis , aut calidis.

Nota , quod non debent esse nimis aperientia & diuretica, sed aliquatenus adstringentia , & idiosyncrasia ventriculi similia , ut ipsius tonum conservent.

Vfus 1. in causa frigida, ut inappetentia , singultu , nausea , malacia , pica , inflatione & dissolutione stomachi , lienteria , &c.

℞. Rad. calami aromatici , & galangæ ana \mathfrak{z} . \mathfrak{ss} . cortic. citri sicci \mathfrak{z} . iij. folior. menthæ betonicæ, & absynthii an. M. j. semin. fœnic. citri , coriand. præpar. an. \mathfrak{z} . j. flor. salviæ p.i. f. decoct. pro \mathfrak{z} . dos. adde cuique, syr. cydon. \mathfrak{z} . \mathfrak{ss} . capiat vespere & manè.

Ex chymicis laudantur.

Oleum anisi arte chymica extractum à gutt. vj. ad xij.

Confectio alkerm. ad \mathfrak{z} . \mathfrak{ss} .

Opiata salomonis ad \mathfrak{z} . \mathfrak{ss} .

Aqua theriacalis ad gutt. x.

Trochisci de rhabarbaro ad \mathfrak{z} . j.

Essentia ambræ griseæ à gutt. iij. ad v.

86 Pars I. *De Alterantibus.*

adeft inflammatio interna, aut febris admodum intensa.

Quandoque etiam exhibentur cardiaca sub forma pulveris cum aqua cordiali, vel cum jusculo, ut

℞. Bezoardici animalis, salis prunellæ, magisterii perlarum, ana ʒ. β. misce, capiat ʒ. i. cum alterno jusculo, vel cum aqua scorzonæræ, aut scab. bis au ter in die.

Vel

℞. Bezoardici mineralis ʒ. ij. Iovialis ʒ. β. salis prunel. ʒ. j. ss. misce f. pulvis, dosis est ad ʒ. j.

C A P U T VI.

De Stomachicis.

Stomachica sunt, quæ peculiariter ventriculæ, & humores in eo contentos alterant, simulque appetentiam, coctionem, retentionem, cæterasque ejus functiones adjuvant & confirmant.

Horum alia sunt calida, alia frigida, prout ventriculus afficitur morbis

Cap. VI. *De Stomachicis.* 87

& humoribus frigidis , aut calidis.

Nota , quod non debent esse nimis aperientia & diuretica, sed aliquatenus adstringentia , & idiosyncrasia ventriculi similia , ut ipsius tonum conservent.

Vsus 1. in causa frigida, ut inappetentia , singultu , nausea , malacia , pica , inflatione & dissolutione stomachi , lienteria , &c.

℞. Rad. calami aromatici , & galangæ ana ʒ. ss. cortic. citri sicci ʒ. iij. folior. menthæ betonicæ, & absynthii an. M. j. semin. fœnic. citri , coriand. præpar. an. ʒ. j. flor. salviæ p.i. f. decoct. pro ʒ. dos. adde cuique, syr. cydon. ʒ. ss. capiat vespere & manè.

Ex chymicis laudantur.

Oleum anisi arte chymica extractum à gutt. vj. ad xij.

Confectio alkerm. ad ʒ. ss.

Opiata salomonis ad ʒ. ʒ.

Aqua theriacalis ad gutt. x.

Trochisci de rhabbaro ad ʒ. j.

Essentia ambraë griseæ à gutt. iij. ad v.

86 Pars I. *De Alterantibus.*

adeſt inflammatio interna, aut febris admodum intenſa.

Quandoque etiam exhibentur cardia-
ca ſub forma pulveris cum aqua cor-
diali, vel cum juſculo, ut

℞. Bezoardici animalis, ſalis pru-
nellæ, magiſterii perlarum, ana ʒ. ʒ.
miſce, capiāt ʒ. i. cum alterno juſcu-
lo, vel cum aqua ſcorzonæræ, aut ſcab.
bis au ter in die.

Vel

℞. Bezoardici mineralis ʒ. ij. Iovia-
lis ʒ. ʒ. ſalis prunel. ʒ. j. ſs. miſce f.
pulvis, doſis eſt ad ʒ. j.

C A P U T VI.

De Stomachicis.

Stomachica ſunt, quæ peculiariter
ventriculum, & humores in eo
contentos alterant, ſimulque appeten-
tiam; coctionem, retentionem, cæ-
terasque ejus functiones adjuvant &
confirmant.

Horum alia ſunt calida, alia frigi-
da, prout ventriculus afficitur morbis

Cap. VI. *De Stomachicis.* 87

& humoribus frigidis , aut calidis.

Nota , quod non debent esse nimis aperientia & diuretica, sed aliquatenus adstringentia , & idiosyncrasia ventriculi similia , ut ipsius tonum conservent.

Uſus 1. in causa frigida, ut inappetentia , singultu , nausea , malacia , pica , inflatione & dissolutione stomachi , lienteria , &c.

℞. Rad. calami aromatici , & galangæ ana ʒ. ss. cortic. citri sicci ʒ. iij. folior. menthæ betonicae , & absynthii an. M. j. semin. fœnic. citri , coriand. præpar. an. ʒ. j. flor. salviæ p.i. f. decoct. pro ʒ. dos. adde cuique, syr. cydon. ʒ. ss. capiat vespere & manè.

Ex chymicis laudantur.

Oleum anisi arte chymica extractum à gutt. vj. ad xij.

Confectio alkerm. ad ʒ. ss.

Opiata salomonis ad ʒ. ʒ.

Aqua theriacalis ad gutt. x.

Trochisci de rhabbaro ad ʒ. j.

Essentia ambrae griseæ à gutt. iij. ad v.

86 Pars I. *De Alterantibus.*

adest inflammatio interna, aut febris admodum intensa.

Quandoque etiam exhibentur cardiaca sub forma pulveris cum aqua cordiali, vel cum jusculo, ut

℞. Bezoardici animalis, salis prunellæ, magisterii perlarum, ana ʒ. ʒ. misce, capiat ʒ. i. cum alterno jusculo, vel cum aqua scorzonæræ, aut scab. bis au ter in die.

Vel

℞. Bezoardici mineralis ʒ. ij. Iovialis ʒ. ʒ. salis prunel. ʒ. j. fs. misce f. pulvis, dosis est ad ʒ. j.

C A P U T VI.

De Stomachicis.

Stomachica sunt, quæ peculiariter ventriculum, & humores in eo contentos alterant, simulque appetentiam, coctionem, retentionem, cæterasque ejus functiones adjuvant & confirmant.

Horum alia sunt calida, alia frigida, prout ventriculus afficitur morbis

Cap. VI. *De Stomachicis.* 87

& humoribus frigidis , aut calidis.

Nota , quod non debent esse nimis aperientia & diuretica, sed aliquatenus adstringentia , & idiosyncrasia ventriculi similia , ut ipsius tonum conferrent.

Vfus 1. in causa frigida, ut inappetentia , singultu , nausea , malacia , pica , inflatione & dissolutione stomachi , lenteria , &c.

℞. Rad. calami aromatici , & galangæ ana ʒ. ss. cortic. citri sicci ʒ. iij. folior. menthæ betonicæ, & absynthii an. M. j. semin. fœnic. citri , coriand. præpar. an. ʒ. j. flor. salviæ p.i. f. decoct. pro ʒ. dos. adde cuique, syr. cydon. ʒ. ss. capiat vespere & manè.

Ex chymicis laudantur.

Oleum anisi arte chymica extractum à gutt. vj. ad xij.

Confectio alkerm. ad ʒ. ss.

Opiata salomonis ad ʒ. ss.

Aqua theriacalis ad gutt. x.

Trochisci de rhabbaro ad ʒ. j.

Essentia ambraë griseæ à gutt. iij. ad v.

82 Pars I. *De Alterantibus.*

tice citri ꝓ. vi. capiat vespere & mane.
Vel in forma julepi.

℞. Aquar. meliss. card. bened. an.
ꝓ. ij. ꝓ. naphæ ꝓ. ꝓ. aquæ cinnam. co-
chlear. ꝓ. syr. de kermes. ꝓ. ꝓ. fiat
julepus.

Potest dissolvi in prædicto apoze-
mate, julepo, vel aqua scabiosæ aut
vino unum aut alterum ex sequentibus
Galenicis & chymicis.

Confectio alkerm. à ꝓ. ss. ad ꝓ. i.
Theriaca à ꝓ. ss. ad ꝓ. j.

Aqua theriacalis Bauderoni ad co-
chlear. i.

Aqua theriacalis camphorata ad ꝓ. ss.

Sal volatilis viperinus, à gr. x. ad xv.

Elixir proprietatis Paracelsi, à gutt.
viii. ad xii.

Extractum bezoardicum Quercetani
à ꝓ. ss. ad ꝓ. j.

Magisterium ambre griseæ à gr. ij.
ad iiij.

Essentiæ ambre griseæ, à gutt. vi.
ad viij.

In casu præcipiti viribus evanes-
centibus, quando tempus non datur
parandi aliud remedium.

Cap. V. *De Cardiacis.* 83

℞ Confect. alkerm. vel theriacæ
vet. ʒ. β. vel ʒ. j. cum aquæ cinnam.
vel vini optimi cochlear. misce & pro-
pina.

Sapè etiam prædictæ essentia ex-
hibentur simpliciter cum aqua appro-
priata vel vino, ut:

℞. Salis volatilis viperarum gr. x.
aquæ scorzonerae, vel cardui benedi-
cti ʒ. j. β. misce, capiat longè post,
& ante iusculum.

Vel.

℞. Magisterii ambrae gris. gr. ij.
aquæ theriacalis camphorata ʒ. β. mis-
ce & capiat.

Cave, ne iis utaris dum calida sunt
viscera, aut febris est intensa, proin-
de non debent esse in usu, nisi in causa
frigida; aut quando tanta est maligni-
tas cum virium imbecillitate, ut febris
non sit, vel saltem exigua.

In causa calida, ut febribus mali-
gnis purpuratis, variolis, & cæteris
pestilentibus affectibus cum febre, in
quibus æstus temperandus, obstru-
ctiones reseranda, putredo & maligna
qualitas coercenda, & diaphoresis
promovenda.

84 Pars I. *De Alterantibus.*

℞. Rad. cich. brusci, torment. an.
℥. i. fol. cich. scabiosæ, capill. ven.
pimpin. acetosæ, an. M. i. semin. me-
lon. cucurb. citri, rasuræ eboris an.
℥. i. summit. scordei, & florum cor-
daliū, ana p. i. f decoct. pro 3. dof.
adde cuique, sal, prunel. 3. β. spiritus
sulphuris aut vitrioli, gutt. iv. syr.
limon. 3. *ss.* capiat vespere & mane.

Potest addi ex Galenicis & chy-
micis.

Confectio hyacinthorum à 3. *ss.* ad
3i.

In mulieribus obnoxiiis suffocatio-
ni hystericae pulvis confectionis hya-
cinth. sine moscho & ambra, ad ʒ. i.
vel 3. *ss.*

Pulvis cordis & hepatis viperini ad
ʒ. ss.

Sal cardui bened. vel scab. ad 3. *ss.*
vel ad ʒ. i.

Pezoardicum Joviale, vel minerale
ad ʒ. *ss.*

Antimonium diaphoreticum à ʒ. *ss.*
ad ʒ. i.

Spiritus nitri ad gutt. x.

Spiritus vel crystalli salis communis
dulces, ad ʒ. j.

Cap. V. *De Cardiacis.* 85

Lapis bezoardicus verus ad gr. iv.
vel vi.

Aqua theriacalis refrigerans ad cochlear. j.

Aqua theriacalis camphorata ad cochlear semis vel unum.

Sal volatilis viperarum ad gr. x.

Mixtura spiritalis ad \mathfrak{z} ss. vel \mathfrak{z} . j.
paratur ex aquæ theriacalis camphorata
 \mathfrak{z} . i. spiritu tartari, & vitrioli, ana
 \mathfrak{z} . i.

Possunt hæc alexipharmaca, & diaphoretica dissolvi in aqua cordiali refrigerante, vel in julepo, &c.

Nota, quod si adsint vermes, aut materia verminosa, addi debeat pulvis contra vermes ad \mathfrak{d} . j. in qualibet dosi: & si motus convulsivi quoque adsint, pulvis contra spasmus pariter ad \mathfrak{d} . j.

Ut in forma julepi.

\mathcal{R} . Aquar. scab. portul. scorzon.
an. q. s. syr. limon. \mathfrak{z} . j. confect. hyacinth. \mathfrak{d} . j. pulver. viperini, & contra vermes an. \mathfrak{d} . β . salis prunel. \mathfrak{z} . β . f. julepus.

Cave à theriacalibus, sale viperino, cæterisque exsiccantibus quando

86 Pars I. *De Alterantibus.*

adeft inflammatio interna, aut febris admodum intensa.

Quandoque etiam exhibentur cardia-
ca sub forma pulveris cum aqua cor-
diali, vel cum jusculo, ut

℞. Bezoardici animalis, salis pru-
nellæ, magisterii perlarum, ana ʒ. ʒ.
misce, capiât ʒ. i. cum alterno juscu-
lo, vel cum aqua scorzonæræ, aut scab.
bis au ter in die.

Vel

℞. Bezoardici mineralis ʒ. ij. Iovia-
lis ʒ. ʒ. salis prunel. ʒ. j. fs. misce f.
pulvis, dosis est ad ʒ. j.

C A P U T VI.

De Stomachicis.

Stomachica sunt, quæ peculiariter
ventriculum, & humores in eo
contentos alterant, simulque appeten-
tiam, coctionem, retentionem, cæ-
terasque ejus functiones adjuvant &
confirmant.

Horum alia sunt calida, alia frigi-
da, prout ventriculus afficitur morbis

Cap. VI. *De Stomachicis.* 87

& humoribus frigidis, aut calidis.

Nota, quod non debent esse nimis aperientia & diuretica, sed aliquatenus adstringentia, & idiosyncrasia ventriculi similia, ut ipsius tonum conferrent.

Vsus 1. in causa frigida, ut inappetentia, singultu, nausea, malacia, pica, inflatione & dissolutione stomachi, lienteria, &c.

℞. Rad. calami aromatici, & galangæ ana \mathfrak{z} . ss. cortic. citri sicci \mathfrak{z} . iij. folior. menthæ betonicæ, & absynthii an. M. j. semin. fœnic. citri, coriand. præpar. an. \mathfrak{z} . j. flor. salviæ p.i. f. decoct. pro \mathfrak{z} . dos. adde cuique, syr. cydon. \mathfrak{z} . ss. capiat vespere & manè.

Ex chymicis laudantur.

Oleum anisi arte chymica extractum à gutt. vj. ad xij.

Confectio alkerm. ad \mathfrak{z} . ss.

Opiata salomonis ad \mathfrak{z} . ss.

Aqua theriacalis ad gutt. x.

Trochisci de rhabarbaro ad \mathfrak{z} . j.

Essentia ambraë griseæ à gutt. iij. ad v.

88 Pars I. *De Alterantibus.*

Magisterium ambraë griseæ ad gr.
jv.

Elixir ambraë gris. ad ℥. ss.

Elixir stomachicum ad gr. x.

Elixir Quercetani ad cochlear. ss.

Elixir proprietatis à gutt. viiij
ad x.

Electuarium aromaticum rosatum
vel diambraë ad ℥. ss.

Ufus eorum est, ut per se sumantur
manè jejuno ventriculo, vel in apo-
zemate prædicto, vel vini cochleari,
aut liquore alio idoneo dissolvantur,
aut in pauca copia conservæ rosa-
rum misceantur, ut in forma boli.

℥. Conservæ rosar. 3. j. magisterii
ambraë griseæ gr. iiij. misce, capiat ma-
nè jejuno ventriculo, per unum aut
alterum diem, superbibendo parum
vini.

In forma opiataë ad eundem sco-
pum.

℞. Conservæ rosar 3. ss. conservæ
florum anth. 3. ij. confect. alkerm.
& opiataë salomonis, an. 3. j. elixir.
ambraë gris. vel pulveris diambraë 3. ss.
syrupi de absynth. q. s. f. opiata, de
qua capiat manè jejunos 3. j. superbi-

Cap. V. *De Cardiacis.* 89

bendo parum vini aquâ modicè diluti.

In forma pulveris.

℞. Specierum aromatici rosati ʒ. iiij. ambræ griseæ gr. vi. sacchari ʒ. iiij. fiat pulvis. dosis est ʒ. j. aut ʒ. ʒ.

In forma tabellarum.

℞. Confect. alkerm. ʒ. j. magist. vel pulveris diambæ ʒ. ʒ. cum saccharo fiant tabellæ, usus est per se, vel dissolvendo in iusculo.

Nota 1. in stomacho frigido roborando, melius esse iis uti, quæ solida & crassiori formâ parantur, quia faciliùs & diutiùs in ventriculo consistunt.

Nota 2. cavendum esse, ne dum intendimus calefacere ventriculum, viscerum calorem augeamus, sæpiùs enim ventriculi debilitatis causa sunt viscera impensè calida. Tunc autem debilitas ventriculi frigiditatem mentitur; ideoque dum intendimus robore ventriculum frigidum supra dictis calidis medicamentis, oportet ut sit frigidus per se, non verò ob gracilitatem & dissolutionem calidi ab intemperie calida hepatis, ut sæpe accidit

90 Pars I. *De Alterantibus.*

in his qui diuturnas patiuntur obstructiones cum intemperie calida, & in affectionibus hypochondriacis, in quibus ructus aut vomitus acidus non ventriculum frigidum denotat, sed insignem viscerum calorem, & humorem melancholicum fermentatum.

2. In causa calida dum vis ventriculi videtur dissoluta.

℞. Rad. cich. acetosæ ana ʒ. j. fol. acetosæ, plantag. cich. an. M. j. semin. plantag. cydon. an. ʒ. ij. rosarum rubrarum, & summitatum absynth. pont. an. p. j. fiat decoct. ad lb. j. ꝑ. pro ʒ. dos. vespere & manè sumentis: adde cuique, syrupi granatorum, vel corall. vel cydon. ʒ. vi. cap. vespere & manè.

Vel

In vomitione biliosa, cholera, lenteria à causa calida, cæterisque casibus, in quibus ventriculus resolvitur & calet, sequens decoctum stomachum & jecur roborat.

℞. Radic. cichor. tormentillæ ana ʒ. ss. santali citrini, & rubri an. ʒ. j. ss. tamarind. ʒ. j. semin. cydon. & plantag. ana ʒ. i. rosar. rubr. balaust. an. p. j. fiat

Cap. VI. *De Stomachicis.* 91

fiat decoctio. Colaturæ ad lb. i. ß. dissol-
ve confer. rosar. Genuens. ʒ. i. ß. spiri-
tus vitrioli gutt. xv. f. apozema pro 3.
clos. sæpius iterandis.

In forma julepi, dum æstuat ven-
tricus, & debilis est.

℞. Aquar. lact. rosar. an. q. s. syru-
pi de succo oxyacanth. vel de agre-
sta, vel cydon. ʒ. vi. salis prunel. ʒ. ss.
fiat julepus.

Ex Galenicis & chymicis laudantur.

Confect. hyacinth. ad ʒ. ss. vel ʒ. i.

Magister. corall. à gr. vi. ad x.

Sal corall. ad ʒ. ss.

Sal absynth. vel cichor. ad ʒ. i.

Viribus ventriculi admodum fra-
ctis addi potest aliquod ex prædictis
calescentibus, & roborantibus in
pauca copia, ut magisterium amb.
gris. elixir. stomachicum, &c.

Sequens opiata roborat & refrige-
rat ventriculum, & hepar in causa
calida.

℞. Confer. rosar. Genaens. &
cynorrhod. an. ʒ. vi. confect. hya-
cynth. ʒ. i. ss. magisterii tartari & co-
rallorum, an. ʒ. i. salis absynth. cichor.
an. ʒ. ss. salis prunellæ ʒ. i. ambraë grisæ,

E

92 Pars I. *De Alterantibus.*

vel magisterii ipsius ꝑ.ß. cum syrupo de corallis, vel granatorum fiat opiata, de qua sumendum est ad magnitudinem parvæ nucis, bis in die, manè & dum it cubitum.

C A P U T VII.

De Hepaticis.

Hepatica sunt medicamenta, quæ hepatis intemperiem corrigunt, obstructions expediunt, simulque substantiam leviter adstringendo, tonum ipsius roburque conservant, aut restitunt.

Quia verò hepar afficitur, modò intemperie frigidi, ut in cachexiâ, hydrope, cæterisque chronicis affectibus, sæpe etiam calidâ, ut in febribus continuis & intermittentibus tertianis, in æstu & fervore sanguinis: ideo remedia ipsi competunt, modò calefacientia, modo refrigerantia.

In casu frigido v. g. in obstructionibus à crassis & viscidis humoribus, cachexia, chlorosi & similibus.

Cap. VII. *De Hepaticis.* 93

℥. Radic. apii, petroselini, eryng.
an. ℥. j. fol. capillarium omnium,
agrim. an. m. j. chamæpit. m. ℞. sum-
mit. lupul. & asparag. ana m. ℞. semin.
apii, petrosel. an. ℥. ij. summit. ab-
synth. & flor. calend. an. p. i. f. de-
coct. ad ℥b. j. ℞. pro 3. dos. adde cui-
que, syr. byzant. vel de 5. radic. ℥ j.

Ex iisdem parari possunt juscula alte-
râtia, quibus addi potest in qualibet vice.

Tartarum chalybeat. ad 3. ℞. vel

Aliquod ex cæteris, quæ recensita
sunt ex aperientibus chymicis, cap. 3.
de juscul. sect. 1.

Quando roborare intendimus, si-
mul & aperire, addi potest.

Pulvis diambrae, vel diarrhod. ab-
batis à 3. ℞. ad 3. j.

Trochisc. de Rhabarb, 3. j.

Trochisc. de absynth. 3. j.

Extractum absynth. ad 3. j.

Elixir proprietatis, à gutt. vj. ad xij.

Elixir ambræ gris. ad 3. ℞.

Nota, quod in casu frigidi he-
patis; non est utendum iis quæ prædita
sunt vehementi calore, quia robur
ipsius magis infringerent, dissolven-
do; sed quæ incidunt, attenuant,

94 Pars I. *De Alterantibus.*

abstergunt , & aliquatenus adstringunt.

In causa calida , ut in prædictis affectibus productis à bile, pituita assata, melancholia adusta.

℞. Rad. gram. brusç. aspar. an. ʒ. j. fol. cich. cum toto , agrimon. capillor. ven. fumar. ceterach , an. m. j. semin. melon. cucurb. citri an. ʒ. ij. passul. purgat. ʒ. j. flor. cordial. cichor. an. p. j. fiat decoct. pro ʒ. dos. adde cuique , syr. capil. ven. vel de cich. simpl. ʒ. j.

Ex iisdem parantur juscula , & in unoquoque dissolvi potest aliquod ex prædictis aperientibus , sed potissimum tartarum vitriolatum, aut chalybeatum, sal absynth. &c.

C A P U T V I I I.

De Splenicis.

Splénica sunt lieni propria medicamenta, quæ terrenum illius humorem attenuant , & detergunt. Ex Gal. similia sunt hepaticis , sed paulò

Cap. VIII. *De Splenicis.* 95

valentiora, quæ minus adstringunt, ob crassiora illius extrementa.

Quædam calida sunt, melancholiæ naturali dicata, moderatè quidem, & tenuium partium: quædam verò mediocriter refrigerantia atræ bili collectæ idonea.

Eadem conveniunt decocta quæ suprà cap. de apozemate præparante melancholiam, & atram bilem, tradita sunt; quibus adde passim tradita, & tradenda remedia aperientia suo loco, sub forma opiatae, pilularum, pulveris, tabellæ, &c.

Sequens decoctum prodest in scorbuticis, vertiginosis, melancholicis, hypochondriacis, cæterisque similibus affectibus, in quibus hepar, lien obstruuntur, & intemperie cum debilitate afficiuntur.

℞. Rac. cich. brusci apii, an. \mathfrak{z} . j. fol. agrim. cich. pimpin. cochlear. cærefolii, nasturt. aquatici, fumar. an. m. j. tartari chalybeati, & sem. melon. cucurb. apii, an. \mathfrak{z} . ij. pomi redol. frusta aliquot, flor. cordial. genistæ, an. p. j. f. decoct. in q. s. aquæ, vel feri lactis caprilli pro

96 Pars I. *De Alterantibus.*

4. dof. vespere & manè sumendis ,
adde cuique , syrupi de cichor. simpl.
vel byzant. ʒ. ʒ.

Potest dissolvi in qualibet dosi.

Tinturamartis ad ʒ. ʒ.

Sal cancerorum fluviatilium ad
ʒ. ʒ.

Sal absynth. à gran. xv. ad ʒ. j.

Sul cochlear. vel chamæd. à ʒ. ʒ.
ad ʒ. j.

Spiritus salis armoniac. ad gutt. vj.
vel viij.

Et similia quæ tradita sunt , cap. de
jusculo , & decocto hepatico.

C A P U T IX.

De Intestinis Appropriatis.

INtestina præter varios affectus,
qui illis cum aliis partibus sunt
communes hoc habent ratione con-
formationis , officii , & temperiei , ut
præ cæteris partibus ipsis competat,
vermes & flatus continere , quibus,
hoc loco specifica remedia , in forma
qua conveniunt traduntur.

Cap. I X. *De Intestinis, &c.* 97

De enecantibus Vermes.

Vermes necantia sunt medicamenta, quæ qualitate manifesta, amara, acida, acri, oleosa vel adstringenti, aut occulta seu specifica, lumbricos enecare possunt.

Amara, acria, acida, tenuitate suâ penetrando vermium substantiam dissolvunt: adstringentia poros constipando, oleosa obturando transpirationem, quâ sola vivunt, impediunt; sicque eos suffocant.

Julepus vermes enecans in febre verminosa.

℞. Aq. portul. cich. ana ℥. ij. confect. hyacinth. & pul. contra vermes, an. ℥. j. corallin, præparatæ ℥. β. syr. limon. ℥. β. fiat. julep.

In forma decocti.

℞. Rad. gram. cich. acetos. au. ℥. j. fol. cich. portul. oxalidis, agrim. an. M. j. scordii M. β. hord. integ. p. j. rasur. eboris ℥. j. flor. cordial. cich. ana p. j. fiat. decoct. pro 4. dos. vespere & manè sumendis, adde cuique, syr. limon. ℥. ss. spirit. vitrioli

D. 4

98 Pars I. *De Alterantibus.*

ad levem aciditatem addi possunt.

Confect. hyacinth. & pulvis contra vermes ad \mathfrak{z} . j.

Spiritus nitri, aut sulphuris aut. falis, ad gutt. iv.

Trochisci de corallis, vel de cornu cervi ad \mathfrak{z} . j.

Lapis bezoardicus verus. ad gr. iv.

Pulvis lumbric. terrestrium in furno exsiccat. ad \mathfrak{z} . ss.

In pueris, quando vermes vomitum, vel inappetentiam, vel soporem excitant, cum vel sine febre.

\mathfrak{z} . Aquar. portul. \mathfrak{z} . iiij. confect. hyacinth. \mathfrak{z} . ss. Pulveris contra vermes, & corallinae præparat. ana \mathfrak{z} . i. Syrupi limon. \mathfrak{z} . ss. fiat potus.

Ex chymicis & Galenicis profunt ad prædictos usus.

Pulvis hieræ picræ ad \mathfrak{z} . ss.

Theriaca vetus ad \mathfrak{z} . ss.

Pulvis viperin. ad \mathfrak{z} . ss.

Mercurius præcipitatus ad gr. vi. vel x.

Prodest & hic pulvis.

\mathfrak{z} . Corallinae, & cornu cervi præparati, ana \mathfrak{z} . ss. semin. contra, pul. hieræ picræ an. \mathfrak{z} . j. fiat pulvis, de

Cap. I X. *De Intestinis, &c.* 99

quo detur ʒ. ʒs. singula sep timana,
manè jejuno ventriculo, cum cochlea-
ri panatellæ.

Vel

℞. Rhab. electi ʒ. j. semin. con-
tra, corallin. an. ʒ. j. mercur. dulcis
ʒ. ʒs. fiat pulvis, dosis est ad ʒ. ʒs.
purgat clementer pueros & vermes ne-
cat, aut præcaver.

In febre maligna, quando vermes
junguntur, sic parantur julepi.

℞. Aq. scorzon. scab. portul. an. q.
f. syr. limon. ʒ. vi. pulver. viper. se-
min. contra, an. ʒ. ʒs. salis prunel.
ʒ. ʒs. confect. hyacinth. ʒ. j. f. julep.

Aliquando cum sit commotio ob
putridos malignosque vapores; fe-
bris, vomitus, motus convulsivi ex-
citantur, in quo casu.

℞. Aquæ portul. ʒ. iv. aquæ the-
riacal. ʒ. iiij. confect. hyacinth. &
pulveris contra, an. ʒ. j. misce, fiat
potus, capiat uno haustu, vel in duas
vices, si parvulus sit ægrotans.

Defectu aquæ theriacalis, substi-
tus potest theriaca à ʒ. j. ad ʒ. ʒs.

E ʒ.

De flatu discutientibus.

Vocantur carminantia, ea quæ sunt similia diaphoreticis; calefaciunt & attenuant, vaporesque, & flatu à materia frigida productos, per diaphoresim resolvunt.

Ufus est in colicis, & hysteriis doloribus à flatu, & materia frigida.

℞. Aquæ card. bened. ℥. vi. aquæ reginæ Hungar. ℥. i. ꝑ. spirit. nitri gutt. x. misce, fiat haustus: detur tepide.

Vel

℞. Decoct. absynth. ℥. vi. spirit. tartari ℥. i. vel ℥. ii. misce, capiat tepide.

Utilia quoque sunt ea omnia, quæ suprà diximus pituitam digerere, necnon sequentia.

℞. Aquæ naphæ ℥. iij. theriacæ veter. ℥. i. aquæ cinamomi cochlear. i. vel olei anisi arte chym. extracti gutt. vi. fiat iulep.

Vel

℞. Olei anisi ℥. ss. sacchari aquæ cinamomi soluti ℥. i. ꝑ. fiant tabellæ.

Cave, ne in eorum usu error sit, sit potissimum cum in affectibus hy-

Cap. X. *De Nephriticis.* 101

pochondriacis, colica biliosa, visceribus calidis, & humorum maxima fermentatione, à calore acri flatus erumpunt; tunc enim, non calidis quæ dicta sunt, sed temperatè refrigerantibus & humectantibus, iis admixtis, quæ leviter discutunt, agendum est.

C A P U T X.

De Nephriticis.

NEphritica medicamenta dicuntur, quæ renum affectibus curandis sunt appropriata.

Præter multos affectus, quos renes habent communes cum cæteris partibus, peculiariter patiuntur ardorem, calculos, arenulas, viscidosque humores, & retentionem seri urinosi: propter quos diversos scopos, diversa quoque competunt remedia.

Quorum usus est.

1. Ad renum, & urinæ ardorem leniendum, in affectibus renum & vesicæ, dysuriâ, &c.

In forma julepi.

2. Aquar. lactuc. portul. nymph.

102 Pars I. *De Alterantibus.*

an. q. f. syr. viol. vel de nymph. \mathfrak{z} .
salis prunel. \mathfrak{z} . j. f. julepus.

In forma apozematis.

\mathfrak{z} . Rad. cich. \mathfrak{z} . j. β . rad. alth.
liquir. an. \mathfrak{z} . β . fol. acetosæ, lactucæ,
portul. fragar. an. M. j. summit. al-
theæ, m. β . semin. 4. frig. maj. pa-
pav. alb. an. \mathfrak{z} . j. β . passul. purgat. \mathfrak{z} .
j. flor. violar. malvar. nymph. an.
p. j. fiat decoct. ad lb . j. β . pro 3.
dos. adde cuique, syr. viol. vel li-
mon. vel de alth. Fernel. \mathfrak{z} . j. salis
prunel. \mathfrak{z} . j. capiat vespere & manè.

In forma emulsionis, vide c. 4. sect. 1.

Nota quòd non sit utendum diure-
ticis & detergentibus, quando adest
urinæ profluvium cum acrimonia &
renum ardore; quin potius tunc re-
frigerantibus & lenientibus immis-
cenda sunt, quæ incrassant & leviter
adstringunt, qualia sunt lactuca, por-
tula ca, fragaria, plantago, semen
cydon. psyllii, &c.

1. Ad calculos renum, & vesicæ
comminuendos, frangendosque; quod
præstant, 1. proprietate occultâ;
2. qualitate manifestâ, vi nempe
detergente & incidente, cum par-

Cap. X. *De Nephriticis.* 103

rium tenuitate, sine insigni calore, ex Gal. ne calculum magis excoquant & obducent. 3. partium, quapol-
lent, asperitate; hac enim summam
calculi superficiem abstergunt, & ab-
radendo comminuere creduntur.

Si chymicè loquimur, aliter sen-
tiendum de lithontripticis. Vult Ta-
chenius calculum componi ex simul
coëuntibus acido & alkali cum ter-
rena fæce concreſcentibus. probat sic;
lapidem, seu sit renum, seu vesicæ
partus, pone in retorta, vi ignis
medioeri extillat alkali, frustulis in
fundo superstitibus ad digiti tactum
friabilibus, quibus si affundas extra-
ctum alkali, rursus indurantur in la-
pidem: non posse dissolvi calculum
putat nisi à simili, nempe sapore
quodam medio inter acidum & alkali,
subtili quidem ut liberè pervadat.

Inventum quidem laudabile, si
quod vir clarissimus ratione assequi-
tur, idem in viventis corpore pro-
bet experimento. Similia similibus
solvi, axioma chymicum est; non
quod solvens & solubile similia sint
in substantia, quasi per id (ut ait) res sol-

4. 14.
Hip. chy.

104 Pars I. *De Alterantibus.*

vatur à quo componitur ; sed in amica quadam proportionē , quæ in utriusque textura intervenit ratione figuræ , meatuum & pororum , unde fit quod facile coëant & implicantur ; sic aceto solvitur plumbum , stannum , ferrum : oleosa salinis , salina sulphureis sunt pervia , licet substantiâ dissimili , a benignius menstruum solvit corpus compactioris molis , quod fortiori resistit : hinc spiritus volatilis salis marini ritè paratus , sapore acidulus , nullatenus acris dissolvit aurum , quod non potest aqua fortis : ille placidè & pacatè & poros subintrat , integris viribus per minima subit , absorbet vincula atque disjungit , hæc ad primos fervoris impetus in congressu frangitur , fitque cæteris partibus adeundis & dissolvendis , viribus impar. Eadem aqua solvit metalla , & lapides durissimos , non cetam , sulphur , & pingua : adeò quædam particulæ insunt mineralibus , metallis , aliisque concretis , quæ ita peculiaribus mensuris prædicto modo conveniunt , ut ad eorum occursum , quasi currant : è centro mixtionis ad amplexum ,

Cap. X. *De Nephriticis.* 105

reliquis , quas ligabant , particulis , in partes secedentibus.

Verum licet id evincat chymia suis experimentis, nondum tamen , de dissolvente calculum in vesica & renibus reperto , gloriatur. Quod licet Tachenius sibi vindicet , id tamen theoricè potius dictum putem , quamdiu multiplici non constabit exemplo. Solvunt quadam extra corpus lapides, quos intra non comminuunt sine maximo nocumento , exemplo sit , aqua fortis : si quod acidum innocentius ingeri possit , reperit priusquam perveniat ad renes , aut cum in vesicam infusum est , alkalia quibus conjungitur ; aut heterogenea , cum quibus fervendo colliditur suisque postmodum vel hebescit , vel exiit aculeis.

Quaecunque igitur haecenus lapidem atterere credita sunt , non aliâ ratione id præstant , quàm auferendo antecedentes causas per corpus dispersas , vel absumendo in renibus & vesica urinæ alkali , aut absorbendo acidum , vel dissolutione extrahendo è lapide compacto vinculum,

106 Pars I. *De Alterantibus.*

quo tanquam ferrumine partes ipsius strictè cohærent. Quod ultimum, licet difficile, non superat tamen vim artis, aut naturæ. Id verò maximè, cum menstrua quædam mitiora ferè insipida nec acria inventa sint, quæ mineralia, & metalla intimiùs penetrant, & promptiùs vires exerunt, quàm fortiora, quæ corroderendi vi pollent: sintque acidulæ minerales, quæ nondum firmiter compactos lapides in frusta dividant, & educant; sic & lapis noviter apud Hispanos notus, cæteraque dudum cognita lithontriptica, inter quæ sequentia sunt.

In forma decocti.

℞. Rad. petrosel. apii, ononid. an. ʒ. j. ligni nephrit. ʒ. β. fol. saxifrag. parietar. agrim. calcitrap. fœnicul. marin. an. m. j. sem. millii solis, petros. paliur. nasturt. aquat. an. ʒ. ij. passul. purgat. ʒ. j. granor. alkeken-gi ʒ. ij. florum tanaceti, virgæ aureæ, an. p. j. fiat decoct. pro ʒ. dof. adde cuique, oxymel. simpl. vel scillit. vel de raphano. Fernelii, ʒ. j.

Ex iisdem potest parari jusculum,

Cap. X. *De Nephriticis.* 107

& addi in qualibet dosi apozematis,
vel jusculi, aut in alio liquore appro-
priato ex Galenicis & chymicis.

Succus limonum recenter expres. ad
℥. ss. vel j.

Spiritus tercbinth. à gutt. vi.
ad x.

Spiritus nephriticus Schroderi, ad
gutt. vj. vel viij.

Spiritus tartari, ad ℥. ss. vel ℥. j.

Sal vitrioli nitrati Schroderi, ad
℥j.

Sal tartari volatilifati, ad gr. vj.

Lapis nephriticus ad ℥j.

Sal fabar. ad. ℥. j. vel ℥. ss.

Sal tartari, juniperi, ononidis,
ad ℥. ss.

Elixir nephriticum Schroderi, ad
cochlear. ss. vel j.

Aqua nephritica Schroderi, ad co-
chlear. j.

Pulvis millepedum ad ℥. j.

Spiritus salis, ad gutt. vi.

Cineres scorpionum, ad ℥. j. vel
℥. ss.

Sequens decoctum laudatur ad ex-
pellendum calculum, & sabulosam
materiam, in renibus & vesicâ con-
tentam.

108 Pars I. *De Alterantibus.*

℞. Ligni nephritici ℥. ss. radic. petrosel. cum toto ℥. iij. cicerum rubror. parum confract. granor. alkekengi, & cremoris tartari, ana ℥. ss. coque in vase terreo cum aquæ lb. iv. donec fiat consumptio ad lb. iij. adde sub finem cinamomi ℥. i. ss. sacchari candi ℥. iij. succum trium limon. recenter express. protinùs remove ab igne, & cùm refrigerit coletur sæpius, capiat ℥. vi. vespere & manè.

Vel

℞. Olei amydal. dulc. sine igne extracti ℥. ij. succi limon. recenter extracti, & syrupi de alrh. Fernel. an. ℥. i. fiat julep. Prodest in nephritide, juvat descensum calculi à renibus. Loco syrupi potest poni saccharum candum ad ℥. i. & in insigni dolore, loco sacchari vel syrupi, substitui potest syrupus de papav. ad ℥. ss.

Prodest & sequens julepus quando supprimitur utina, & in dolore nephritico.

℞. Succor. pariet. & fœnic. mar. an. ℥. i. ss. succi limon. & olei amygdal. dulc. recent. extract. an. ℥. i. misce, f. julep.

Cap. X. *De Nephriticis.* 109

In promptu sic paratur.

℞. Aquar. pariet. alth. vel cortic. fabar. ℥. vi. syr. viol. vel de alth. Fernel. ℥ i. spirit. tartari, vel terebinth. ℥. ss. vel in defectu ipsorum, succi lim. recent. expressi ℥. j. fiat julep.

3. Ad arenulas, & viscidos humores detergendos: cui scopo non alia conveniunt, quam quæ pro calculo frangendo adducta sunt.

4. Ad urinas movendas, cui scopo quæ satisfaciunt, dicuntur diuretica; ea nempe quæ substantiæ tenuitate urinas movent, de quibus dicitur in capite de diureticis.

5. Ad sanguinem sistendum in mictione cruenta.

℞. Rad. acetosæ, consol. maj. ana ℥. i. fol. plantag. lact. portul. millef. an. M. i. semin. papav. albi, portul. an. 3. ij. jujubar. liquir. an. ℥. ss. flor. nymph. rosar. rubr. an. p. j. fiat decoct. pro 4. dosibus serò & manè sumend. adde cuique, syr. de corallis, vel de ros. sicc. vel de portul. j. ℥. salis prunellæ 3. j.

In dolore ab urinæ acrimonia, cum cruore sæpe addi solet syrupus de papavere ad ℥ iir.

110 Pars I. *De Alterantibus.*

Possunt addi ex Galenicis & chymicis.

Trochisci Gordonii ad 3. β.

Trochisci alkekengi sine opio, ad 3. j. aut 3. β.

Trochisci de corallis, vel de terra sigill. ad 3. β.

Et quæ suprà, in jusculo de sputo sanguinis descripta sunt.

6. In diabete, & urinæ profluvio.

℞. Ligni lentiscini 3. iij. ligni nephritici 3. i. β. salis prunellæ 3. β. infunde in lb. viij. aquæ fontis tepidè per 24. horas, & levi factâ decoctione, colatura utatur pro potu ordinario, & sæpe diu, noctuque ad cyathum unum.

In forma opiata.

℞. Conser. cynorr. 3. i. β. conser. flor. cichor. nymph. an. 3. i. salis prunel 3. ij. magisterii corallor. 3. i. β. laudani opiat gr. xv. cum syr. capill. ven. fiat opiata, de qua capiat 3. iij. vel 3. β. singulo vespere cum it cubitam.

In forma linimenti.

℞. Unguenti ros. mesues 3. iv. lavacum oxycrato, & adde salis prunellæ

Cap. XI. *De Hystericiis.* 111

3. iii. sacchari saturni 3. i. β. cum
succo cichorii fiat linim. quo renum
regio illiniatur ter in die.

C A P U T XI.

De Hystericiis.

HYsterica medicamenta dicun-
tur quæ peculiariter utero pro
diversis ipsius affectibus, destinan-
tur.

Ufus ipsorum à vario fine desu-
mitur.

1. Ad uteri commotionem sedan-
dam in hysterica passione.

℞. Aquar. artem. naphæ, ana ʒ.
i. β. aquæ cinam. gutt. x. castorei gr.
ij. fiat haustus.

Quando symptomata maligna appa-
rent, ut motus convulsivi, epileptici,
modò febris absit, aut non sit valde
intensa.

℞. Aquar. melissæ, artem. an. ʒ. i.
β. theriacæ vet. 3. β. castorei gr. ij.
misce, capiat.

Profunt in hujusmodi haustibus vel

112 Pars I. *De Alterantibus.*

in aqua appropriata, ut artem. flor.
arant. melissæ, &c.

Ex chymicis.

Aqua reginæ Hungariæ, ad gutt. x.
vel xv.

Oleum succini ad gutt. vi.

Aqua theriacalis ad ℥. β.

Pilulæ hystericæ Horstii ad ℥. β.

Extractum hystericum Schroderi à
℥. β. ad ℥. β.

Antimonium diaphoreticum ad gr. x.
vel xv.

Sal Jovis ad gr. iv.

Sal antimonial. ad gr. iii. vel iv.

Spiritus salis armoniaci, ad gutt. x.
vel xii.

In torminibus violentis, & à causa
calida, laudanum opiatum ad gr. ii.
vel iii.

℥. Aquæ fumar. ℥. iv. spiritus salis
armoniaci gutt. xii, antimonii diaph.
℥. β. aquæ reginæ Hungar. gutt. x.
misce, capiat uno haustu, aut in duas
vices.

Vel

℥. Aquar. meliss. naphæ, an. ℥. i.
ss. aquæ theriacalis ℥. ss. laudani opia-
ti gr. ii. olei garyophill. gutt. iii. misce

Cap. XI. *De Hystericis.* 113

fiat haustus , capiat una vice in vehementi paroxysmo à causa calida , vel mixta.

In violenta omni causa , & calida , utilissime exhibetur laudanum , modò insignis virium jactura non adsit , aut soporosa affectio , imitando Hipp. qui in hujusmodi casibus , remedia cum succo papaveris concinnabat.

Nos sæpe motus hystericos gravissimos , & maximè periculosos compescuimus , simili modo. Referam duos casus. *Primus* in gracili & melancholica virgine adusta satis provectæ ætatis , quæ tertianâ duplici laborabat , cum motibus convulsivis , & contractione membrorum atrocissimos dolores inferente. Post præmissam sufficienter venæ sectionem in brachiis & pede , cæteraque remedia evacuantia & alterantia , præscripsimus ut duabus horis ante paroxysmum , sumeret ʒ. ii. sequentis opiatae ; ter sumpsit , & sedata est symptomatum immanitas. *Secundus.* Casus in virgine sanguinea & melancholica , quæ per singulas noctes ab utero deliramenta cum risu & cantu agebat , quæ pacata sunt , post uni-

114 Pars I. *De Alterantibus.*

versalia præmissa 'evacuantia & alterantia, usu ejusdem opiatæ.

R. Conservæ flor. cichor. \mathfrak{z} . i. *ss.* confect. hyacinthor. sine odoratis \mathfrak{z} . i. magisterii perlar. & salis prunellæ ana \mathfrak{z} . *ss.* laud. opiat. \mathfrak{d} . i. castor. gr. x. cum succo melissæ vel cich. fiat opiata de qua sumantur \mathfrak{z} . ii. cùm ibit cubitum, superbibendo aquæ cich. \mathfrak{z} . iii.

Secundus. Usus est in mensibus moventis pro quo.

Nota, menses moventia non solum sanguinem attenuare, sed etiam vasorum uteri obstructions, & oscula aperire; sunt enim calida & tenuium partium, nec tamen vehementer exsiccant, ne sanguinem validius exsiccando materiam menstruis auferant, & in hoc menses moventia distinguuntur à diureticis, quia hæc validius absumentes aut coagulando, sanguinem cogunt, & sic fit serosæ substantiæ secretio, quæ urinæ materiam facit.

Exhibentur in forma apozematis, jusculi, opiatæ, pulveris, tabellæ, de quibus in proprio cujusque capite existant formulæ.

Tertius. Usus est ad menses sistendos, ut in mensium profluvio. \mathcal{R} . Rad.

Cap. XI. De Hystericis. 115

℞. Rad. symph. torment. ana ℥. j.
folior. portul. plantag. equis. con-
sol. maj. & millef. an. M. i. semin.
acetosæ plantag. an. ℥. ij. flor. ros.
rubr. balauſt. an. p. j. fiat decoctio ad
lb. i. ꝑ. pro ℥. dosib. adde cuique,
syr. cydon. vel de ros. siccis ℥. i. capiat
vespere & manè.

In forma jusculi, opiatæ, tabellæ,
pulveris, vide in proprio cujusque
capite.

Nota, sæpè in mensium profluvio
complicari tumores, abscessus, infar-
ctus mesenterii, & obstructions vis-
cerum, quibus omnibus demendis
incumbendum, antequam simpliciter
adstringentibus & incrassantibus utamur:
tunc autem utendum leviter ape-
rientibus & detergentibus, immixtis
paucis incrassantibus & adstringenti-
bus, & per vices adhibitis clementer
purgantibus.

Quartus. Usus est ad expurgandum
uterum à prava colluvie, quâ scatet, ut
in fluore albo, omnique alio impuro.

℞. Radic. aspar. apii, brusci, an.
℥. i. radic. aristol. rotund. gentian. an.
℥. ss. folior. cich. cum toto, capillar.

116 Pars I. *De Alterantibus.*

omnium, agrim. melissæ, ana M. i. summit. artem. m. ss. semin. melon. cucurb. apii, an. ʒ. ij. flor. calend. p. i. f. decoct. ad lb. i. ss. pro 3. dof. adde cuique, syrupi de duabus radic. ʒ. i.

Continuari debent per aliquot dies intermixtis purgantibus. Est quoque observandum, sæpius affectiones viscerum, & infarctus conjungi, quibus omnibus propria debentur remedia.

Quintus. Ad juvandum conceptum, quod præstant ea medicamenta, quæ roborant uterum moderato calore, aromatica vi recreant, & adstrictione firmant.

Nota, quòd remedia ab omnibus ferè authoribus proposita contra sterilitatem sint admodum calfacientia; cum tamen sæpius ipsius causa sit juncta cum intemperie viscerum calida: ideoque studendum est causis sterilitatis antecedentibus, dyscrasiis, obstructionibus viscerum, & infarctibus circa uterum latentibus, auferendis. Ad quem scopum alterantia, purgantia contraria, aquæ minerales, thermæ, vitriolatae adhibentur; expurgato verò corpore, & omni dempto

Cap. XI. De Hystericis. 117

infarctu, partibusque officialibus reſe-
ratis, & temperatis, tum ad roboran-
dum uterum deveniendum eſt reſtituen-
do tonum ipſius conſtitutum in ſub-
ſtantiæ modo & debita temperie, quod
ſit opiatâ, tabellis, ſuffitu, &c.

In caſu frigido.

℞. Radic. eryngii, ſatyriſonis ſac-
charo conditar. an. 3. vi. conſect.
alkerm. 3. i. ſs. pulver. elect. diamof-
chi, & de gemmis, an. 3. ij. ambræ
grifeæ 3. ſs. cum ſyrupo conditura
corticum citri, fiat opiatâ, de qua
capiat 3. j. vel ij. manè & veſperè,
ſuperbibendo parum vini.

In caſu calido.

℥. Conſer. roſ. & cynorrh. an. 3.
i. conſect. hyacinth. 3. ij. magiſterii
corall. ruſur. eboris, an. 3. i. perlarum
præparat. granor. kerm. pulver. maſti-
ch. an. 3. ſs. cum ſyrupo granator. f.
opiatâ, de qua capiat magnitudinem
nucis juglandis, manè, & veſpere,
dum ibit cubitum, ſuperbibendo pa-
rum aquæ plantag.

Nota 1. benè olentia nocere his, quæ
hyſtericæ paſſioni ſunt obnoxia, aut
quæ naturaliter hæc averſantur; ideo-

118 Pars I. De Alterantibus.

naturaliter hæc averfantur ; ideóque tollenda sunt , quæ moschum & ambaram recipiunt.

Notandum 1. accedente menstruorum tempore , non esse utendum adstringentibus , sed potissimum post triduum ab eorum fluxu.

Cæteræ formulæ tradentur in capite cujusque.

Sexius. Usus est , ad parum juven-dum , secundinas , aut foetum mor-tuum educendum.

In partu difficili.

℞. Aq. naphæ . & artem. an. ʒ. i. ℥. aq. cinamomi ʒ. ij. confect. alkerm. & trochis. de myrrha, ana ʒ. ℥. croc. gr. vi. fiat julep. capiat uno haustu , vel in duas vices.

Sequens potio id potentiùs præstat, sed magis calefacit , ideoque frigidis & crassis parturientibus magis convenit.

℞. Dictamni Cretici , aristol. utriusque, & trochis. de myrrha, an. ʒ. ℥. croci & cinnam. an. gr. x. confect. alkerm. ʒ. ℥. aquæ naphæ & artemis. an. ʒ. j. ss. misce , fiat potio : capiat uno haustu.

Cap. XII. *De Arthriticis.* 119

Ex chymicis exhiberi possunt cum prædictis, vel cum jusculo, aut vino; vel alio quodam liquore idoneo, ut aqua naph. arthemif. &c.

Aqua imperialis ad 3. iij.

Aqua capitis cervi ad cochlear. j.

Oleum anisi arte chymica extractum ad gutt. vi. vel x.

Oleum cinam. ad gutt. v.

Oleum succini ad gutt. xij.

Prædicta valent etiam ad foetum mortuum, & secundinas expellendas.

Cave; ne nimis calefacientibus agas, si viscera sint calidiora, potissimum quando foetus moritur, & partus difficultas provenit à febris vehementia; tunc enim hæc & similia calidiora remedia inflammationem, & necrosim invehunt.

C A P U T X I I.

De Arthriticis.

ARthritica medicamenta sunt, quæ nervosis partibus & membranosis, ex quibus articuli constant,

110 Pars I. *De Alterantibus.*

roborandis, & affectibus ipsis contingentibus, præcipuè dicantur.

Eorum quædam iuteriùs sumuntur, quædam exteriùs adhibentur. De internis nulla fiet mentio, quia secundum varias viscerum affectiones, & humorum naturam, varia sunt, ipsisque ea debentur remedia, quæ supra pro ipsorum alteratione, & præparatione adduximus.

Externa seu topica diversa sunt, prout est diversus humor in articulos influens, aut iisdem impactus, & varia symptomata. Unde usus topicorum varius est.

Primus. In principio fluxionis; tunc enim si causa calida sit, ardor temperandus, & fluxio arcenda; iis tamen, quæ non altiùs impingant materiam articulos afficientem.

Communiter præscribitur oxycratum tepidè, quod temperat & repellit.

Vel

℥. Fol. hyoscyami, solani plantag. lect. an. M. i. fiat decoctio in oxycrato. Colatura foveatur pars affecta bis aut ter in die.

Vel.

Cap. XII. *De Arthriticis.* 121

℞. Aquar. plantag. ros. solani, ana
℥. iii. salis Saturni ℥. β. misce pro fotu
partis affectæ.

In causa minùs calida.

℞. Spiritus vini rectificati lb. ss. sa-
lis Saturni ℥ ss. f. fottus.

Nota, hujusmodi topica non esse
usurpanda, nisi eodem tempore præ-
mittantur universalialia; ne materia altius
impellatur, & dolor exasperetur.

Secundus. Ad dolorem sedandum.

℞. Lactis recenter emulcti lb. ss.
utere tepidè pro partis fomento.

Vel

℞. Fol. verbasci m. i. florum ca-
momil. rosar. rubr. ana p. i. fiat decoct.
in lacte, & utere pro fomento.

In forma cataplasmatìs.

℞. Micæ panis albi lb. ss. infund.
& coque cum lacte; adde vitell. ovor.
n. ii croci ʒ. i. fiat cataplasma.

Vel

℞. Stercoris vaccini lb. β. fol. hyo-
scyami, violar. an. lb. i. misce cum lacte
in formam cataplasmatìs.

Vel

℞. Medullæ cassiæ ℥. iii. micæ panis
albi in lacte decocti lb. β. vitrioli usti
℥. β. fiat cataplasma.

F. 4.

122 Pars I. De Alterantibus.

Tertius. Ad humorem impactum digerendum, dolore sedato.

℞. Aquæ calcis ℥b. i. urinæ pueri ℥b. β. spiritus vini rectificati ℥. iii. misce, & fove partem affectam. Singulare est remedium in roborandis articulis, & humoribus resolvendis.

℥. Aquæ vitæ & vini albi, an. ℥b. β. vitrioli & viridis, ana ℥. ii. misce & cum pannis tepidè applica addendo camphoræ ℥. β.

Vel

℞. Aquæ vitæ & urinæ, an. ℥b. β. spiritus tartari, vel terebinth. ℥. β. fiat fofus.

Vel

℞. Fol. artemisiæ, calament. salviæ, an. m. i. flor. chamomil. hyperici, ros. rubr. an. p. i. f. decoct. in aqua & vino rubro. colaturæ ad ℥b. i. β. adde salis communis, vel nitri ℥. ii. utere pro fomento.

Thermæ sulphuræ nitrosæ, bituminosæ, aluminosæ, harum omnium stillicidium, limusque ex his extractus pro linimento. Item ad præservationem, aquæ marinæ balneum plurimum valet ad resolvendum, & roborandum.

C A P U T XIII.

De Hydroticis.

Pluribus diversarum partium morbis convenit hydroticum, quod est medicamentum ad exsicccandum, poros aperiendum, & movendos sudores idoneum. Quia verò in ipsius usu exacta diætæ ratio observanda, ideò diætæ vocatur, decoctum nempe ex uno, aut pluribus sudorificis ad alterandum simpliciter, vel per insensilem transpirationem, aut sudorem evacuandum.

Componitur ex una aut pluribus radicibus, chinæ, falsæ paril. ligni, & corticis guaiaci sassaphras, buxi, lentiscini, & similibus. Guaiacum frigidis morbis & naturis convenit: china, falsa parilla calidis; china & falsa naturis gracilibus, & calidioribus, innoxia sunt.

Pro singulis unciiis sudorifici debent esse totidem libræ aquæ; priusquam fiat decoctio, debet fieri infusio

124 Pars I. *De Alterantibus.*

per 24. horas, minùs, quando minus exsiccare animus est. Vas sit cooperatum exactè: decoctum fieri debet lento igne ad mediæ partis consumptionem. Dosis ad 3. vi. vel. viij. pro ratione ætatis, exhibenda manè jejuno ventriculo, aliquandò vespere circa 4. horam. Si sudores exigat medicus, corpus stragulis tegendum, vel ponendum est in instrumento ligneo, aut sudario.

Continuari debet usus per 15. 20. vel 30. dies, pro exigentia affectus, ætate, & temperamento. Victus sit attenuans & exsiccans; minùs tamen in calidis, in quorum decoctis miscentur aliquando, quæ temperant calorem & siccitatem sudorifici.

Ante diætæ usum, corpus ritè præparandum alterantibus & purgantibus, ne sudorifici vi fusi humores in corporis habitum rapiantur. Et quia per illius usum tenuior succorum portio exhalat, crassior permanet: idèò sexto vel octavo quòque die purgatio instituenda est; reliquis diebus, prout opus videbitur, clyster injiciendus.

Cap. XIII. *De Hydroticis.* 125

Triplex est hydroticum seu diætā,
alterans, sudorifica, & purgans.

Uſus 1. in lue venerea, arthritide,
fluxionibus capitis inveteratis, mor-
bisque frigidis, chronicis præcipuè;
in corporibus frigidis & obefis.

℞. Raſuræ ligni ſancti ℥. iv. cortic.
ejuſdem ℥. ii. aquæ fontis lb. vi. infun-
de per 24. horas tepidè, deinde fiat
decoct. lento igne, ad mediæ partis
conſumptionem, de colatura capiat
manè ℥. vi. vel viii. corpus ſtragulis
regendo, ſi ſudor ſit eliciendus, vel
laconicum ingrediendo.

℞. Radic. chinæ vel ſalſæ parillæ
minutiùs ſectæ ℥. iii. aquæ fontis lb. iii.
infunde tepidè per 24. horas: deinde
f. decoct. ad medias &c.

Quibus timemus nimiam exſicca-
tionem, decoctio non debet fieri
pluſquam ad tertiæ partis conſum-
ptionem.

In calidis viſceribus, humoribus
ſaliſis & aduſtis, tuſſi, aliisque affe-
ctionibus calidis, addi poſſunt in fine
decocti radix liquiritiæ ad ℥. ſs. paſſulæ
ad ℥. ii. cichor. cum toto, agrimon.
pimpin. an. ad m. j.

126 Pars I. *De Alterantibus.*

Querſetanus pro calida renum intemperie & ulcere, in ſtranguria à falſis & mucilaginofis ſuccis, ſic præſcribit.

℞. Radic. chinæ in talleolas ſectæ
℥. i. aquæ fontis ℔. vi. ſucci limon.
℥. iii. infunde per x. horas, deinde coque ad tertiæ partis conſumptionem. Colatura utatur pro potu ordinario, & de ea capiat bis aut ter in die ℥. vi. vel viii.

Aliquando decoctio diætæ componitur ex pluribus dictis radicibus, ut

℞. Radic. guai. ℥. iii. rad. falſæ parillæ ℥. i. infunde in ℔. viij. aquæ fontis, &c. Vel ex guaiaco, falſa & china; vel ex falſa & china; vel ex falſa & ſaſſaphras; vel ex china & ligno leniſcino: eligendo quæ magis conveniunt humori peccanti, & ægrotantis naturæ.

Nota, quòd in lue venerea uſus ſudorificorum nocet calidis & ſiccis; conſidimus ſolùm bochetto ex china vel falſa, balneis, & inunctioni mercuriali.

Per uſum ſudorifici tenues humorum partes reſolvuntur, craſſioribus remanentibus, caleſcit & exſiccatur.

Cap. XIII. De Hydroticis. 127

corpus, fluidos autem succos & corpora humectata exigit hydrargyris, ideoque nocent sudorifica inungendis.

Sequens decoctio prodest frigidis & humidis capitis affectibus, tum & luveneræ, seu ad præservationem, seu ad palliationem; tum & in gonorrhœa inveterata, in constitutione corporis humida.

℥. Antimonii crudi crassiusculè triti nodo inclusi ℥. iv. falsæ parillæ minutim sectæ, & putaminis nucum pulveratarum, ana. ℥. iij. infunde per 24. horas in lb. viii. aquæ fontis, supra calidos cineres, coque ignè lento ad medias, colatura fervetur in vase vitreo, de qua ter in die, manè horâ 6. vespere horâ 4. & cùm it cubitum, hauriat ℥. vi. vel viii. per quindecim, vel viginti dies.

Cave, ne acida in decoctione immisceas, ut spiritum vitrioli, sulphuris, falem tartari & similia; nam antimonium aperiunt, partesque sulphureas exaltant, redduntque ut sic decoctum plurimum conturbans, emeticum & purgans; cùm aliter sit solum diaphoreticum & exsiccans.

C A P U T X I V.


De Bochetto.

QUamdiu perseverat diæta, præscribitur bochetum pro potu ordinario ex residentia præscripti decocti sudorifici.

℥. Residentiam præscripti decocti, aquæ fontis ℔. viij. repidè infunde per 12. horas, deinde coque ad tertiæ partis consumptionem, colaturâ utatur pro potu ordinario. Si fortius bochetum desideretur adde salsæ ℥. j.

Præscribitur aliquando bochetum sine diæta in morbis frigidis & humidis cerebri, nervorum, pectoris, gonorrhœa, &c.

℥. Rad. chin. in taleolas sectæ, vel salsæ parillæ minutim sectæ ℥. j. ℔. infundæ per 12. horas in ℔. x. aquæ fontis, coque ad tertiæ partis consumptionem, colaturâ utatur pro potu ordinario.



S E C T I O III.

De Alterantibus & purgantibus.

SEpè ob copiam , & pravam qualitatem humorum , cogimur ad usum alterantium immixtis purgantibus. Sic sub una forma remedii humores & partes temperamus , & simul evacuationem promovemus , quod fit sequentibus modis.

C A P U T I.

De Apozemate purgante.

APozema purgans est , quod humores non solum præparat, sed & evacuat , mixtis purgantibus remediis cum alterantibus.

Pro quadruplici humoris purgandi differentia , quadruplex esse dicitur, cholagogum quod bilem, phlegmagogum quod pituitam , melanagogum quod melancholiam , hydragogum

130 Pars I. *De Alterantibus.*

quod serosos humores expurgat, additur mixtum quod omnes simul, vel plures humores educit.

Componitur ex iisdem, quibus constat apozema alterans, adduntur purgantia simplicia cum correctivis, ut polypodium, senna, agaricus, turbith. radix mechoacan, hellebori, & alia hujusmodi.

Rhabarbarum non ponitur in decocto, sed infunditur, quia dum coquitur, vis purgans cum parte volatili dissipatur, crassior & terrestrior adstringens exprimitur in decocto. Non debet præscribi radix, jalap; quippe oleosa, & resinosa non solvuntur ab aqueis, nisi debilititer.

Ea debet esse proportio purgantium, ut si vehementia sint, in duplo majori copia ponantur in decocto, quam in infuso: si mediocria in triplo; si leviora in quadruplo. Sic si sit \mathfrak{z} . j β . polypodii & sennæ, erit turbith. hermodactylorum, agarici \mathfrak{z} . β . Rhei infusi \mathfrak{z} . iij. vel \mathfrak{z} . β . additur syrupus aliquis purgans in dissolutione, & quandoque in alternis dosibus pulvis, aut resina jalap, vel aliud extractum pur-

Cap. I. *De Apozemate.* 131

gans intentioni idoneum. Præscribitur vulgo pro tribus aut quatuor dosibus.

Nota, quòd dosis purgantium debeat esse major in decocto, quàm in infuso, 1. quia vis ignis major vim purgantium in spiritu volatili sitam dissipat. 2. Quia liquor alterantium per coctionem partibus expressis imprægnatus, minùs aptus est ad purgantium vim suscipiendam ob crassitiem & visciditatem, ideòque ex arte est, ne dum bulliunt purgantia, ignis sit violentus.

Antequam exhibeatur apozema purgans, oportet ut præcedat venæ sectio, quibus, & quoties competit; tum & purgatio minorans: quandoque etiam alterantia per decocta, juscula, fomenta, quando fervor humorum purgationi repugnat, exhibenda sunt.

De Apozemate cholagogo.

Vtile est in affectibus ab infarctibilis cum obstructionibus, in febribus tertianis nothiis, & reliquiis au-

132 Pars I. *De Alterantibus.*

ferendis , post intermittentem , aut continuam , &c.

℞. Rad. brusci , asparag. ana \mathfrak{z} . j. fol. cichor. cum toto , agrimon. pimpin. capill. ven. an. M. j. polypodii querc. contus. & fennæ mund. an. \mathfrak{z} . j. \mathfrak{ss} . tamarind. \mathfrak{z} . i. crySTALL. tartari \mathfrak{z} . \mathfrak{ss} . semina. coriand. & fœnic. an. \mathfrak{z} . \mathfrak{ss} . florum cordial. an. p. j. fiat decoct. ad \mathfrak{lb} . j. \mathfrak{ss} . pro 3. dosibus , dissolve in qualibet syr. ros. solut. compos. \mathfrak{z} . j. capiat singulo mane , tribus horis ante juleculum.

Loco prædicti syr. dissolvi potest.

Aqua 9. infusion. rosar. pallid. ad \mathfrak{z} . j.

Syrupus de cichor. cum rhabarbaro ad \mathfrak{z} . j.

Si primæ doses non sufficienter purgent , dissolvi etiam potest , inultima cum syrupo prædicto , mannæ ad \mathfrak{z} . j.

Si fervor humoris & tempestatis non repugnet , potest dissolvi diaprunum solutivum , vel electuarium de citro ad 3. iij. vel \mathfrak{z} . \mathfrak{ss} .

Cap. I. *De Apozem. &c.* 133

De Apozemate phlegmagogo.

Prodest in affectibus frigidis & humidis cerebri, nervorum, apoplexia, paralyfi, tremore, febribus puitosis, infarctu à pituita, in quolibet morbo.

℥. ʒ. Radic. aperient. an. ʒ. vi. radic. enulæ camp. & valerianæ, an. ʒ. ʒ. folior. cich. agrim. chamæd. & beton. an. M. j. polypodii quercin. contusi & fol. sennæ, an. ʒ. j. ʒ. agarici recenter trochiscati & hermodactylor. an. ʒ. ʒ. turbith gummosi & radicum mechoac. an. ʒ. iiii. semin. fœnic. & coriand. præpar. an. ʒ. i. flor. genistæ p. i. f. decoct. pro ʒ. dos. non claris, sed sæpius colatis, adde cuique, syrupi rosat. solutivi compositi ʒ. i.

In ultima dosi superadde, si non satis purgaverint præcedentes, elect. diacarth. vel diaphcen. ʒ. iiij. vel ʒ. ss.

De Apozemate melanagogo.

Usurpari potest in omnibus morbis

134 Pars I. *De Alterantibus.*

à melancholia productis, modò fervor humorum, aut empyreuma coloris non lateat, in quo casu priùs agendum alterantibus internis & externis, & levibus purgantibus per ptisanas, infusum cassiæ, &c.

℞. Radic. apii, fœniculi, petroselin. an. ʒ. i. radic. enulæ camp. mediani fraxini an. ʒ. β. folior. cich. fumar. ceter. melissæ, agrim. an. M. j. summit. a'paragi, lupul. an. m. ss. polypod. quercini contusi & sennæ mundat. ana ʒ. j. ss. radic. helleb. nigri præparati ʒ. ss. agarici recenter trochiscati & radicis mechoac. an. ʒ. iiij. tartari chalibati ʒ. ij. semin. fœniculi, petroselin. an. ʒ. j. epithymi, flor. calendul. & violar. an. p. i. fiat decoct. pro ʒ. dosibus. Adde cuique, syr. de pomis labor. ʒ. j. in ultima dosi, si casus exigat, supperadde confect. hamech ʒ. iiij. vel ʒ. ss.

De Apozemate hydragogo.

Convenit in omni serosa colluvie, in imo ventre & venis contenta, in hydrope, cachexiâ, &c.

Cap. I. *De Apozem. &c.* 135

℞. Radic. apii , brusci , fœnic.
an. ʒ. j. radic. eryngii & ireos nostratis ,
an. ʒ. vj. fol. agrim. polytrici,
brassicæ marinæ , an. M. j. polypod.
quercini , & sennæ mund. an. ʒ. j. ss.
turbith. & rad. mechoac. an. ʒ. iij.
femin. fœnic. & ebulli , an. ʒ. j. ss.
florum tamarisci , genistæ , an. p. j.
fiat decoctio pro ʒ. dosibus , adde cui-
que, aquæ 9. infusion. rosar. pallid. ʒ. j.
Vel

℞. Succu ireos nostratis depurati
& saccharo leviter cocti ʒ. j. vel

Syrupi rosati solutivi , aut florum
persicorum ʒ. j.

In prima & ultima dosi addi potest.

Resina jalap , ad gr. vi. vel viij.

Pulvis rad. jalap , ad gr. x. vel xij.

Pulvis diacarth. ad ʒ. ss. vel ʒ. j.

De Apozemate mixto.

Competit in chronicis viscerum
obstructionibus cum infarctu , ab om-
nibus humoribus simul confusis : tum
& in præparatione ad curandam luem
veneream , quando imus venter scatet
copiosis humoribus excrementitiis.

136 Pars I. *De Alterantibus.*

R. Radic. brusci, apii, an. \bar{z} . j. cortic. rad. capparis, medii fraxini, & tamarisci, an. \bar{z} . ss. fol. cichor. cum toto, omnium capillarium, an. M. j. hellebori nigri ex aceto præparati \bar{z} . iij. polypod. querc. confusi, & sennæ mund. ana \bar{z} . j. ss. agarici recent. trochisc. & hermodact. an. \bar{z} . ss. turb. electi & rad. mechoac. an. \bar{z} . iij. semin. fœnic apii, petros. an. \bar{z} . j. ss. epith. & flor. cordial. an. p. j. fiat decoctio. Adde rhabarb. cum fantalo in aqua cich. infusi & expressi \bar{z} . iij. fiat apozema pro 3. dosib. non claris, sed sæpè colatis: adde cuique, syr. rosar. solut. vel aquæ 9. infus. rosar. pallidar. \bar{z} . j. capiat singulo manè tribus horis ante iusculum.

C A P U T II.

De Iusculo alterante & purgante.

IUsculum purgans fit, quando iusculis supra præscriptis infunditur & leviter incoquitur senna: aliquando dissolvitur & manna, aut aliud electuarium, ad hanc formulam.

Cap. II. De jusculo, &c. 137

℞. Sennæ mund. ʒ. iiij. anisi & cremor. tartari an. ʒ. β. succi limon. recent. expressi ʒ. j. infunde manè per semihoram, & leviter incoque decocto jusculi refriger. express. capiat hora sextâ, vel septimâ matutina.

Nota quod in affectibus pectoris, tussi, sanguinis sputo, & similibus acida non sunt miscenda.

Præscribi etiam debet jusculum purgans, in quarta quaque dosi jusculi alterantis, juxta hanc formulam.

℞. Sennæ mund. ʒ. iiij. anisi & cremoris tartari an. ʒ. β. infunde & leviter coque in quarta quaque dosi jusculi alterantis, in octava autem dissolve mannæ ʒ. j. vel ʒ. i. β. aut si humor exigit & febris non repugnet, præsertim quando humores crassiores, pituitosi, melancholici sunt purgandi, dissol. electuarii de citro vel diacarth. ʒ. iii. vel ʒ. ss.

Formula jusculi purgantis ad curationem, vel præcautionem in debilibus, gracilibus, morbis calidis pectoris, tussi, sputo sanguinis, asthmate, phthifica dispositione.

℞. Rad. cich. bugl. an. ʒ. i. fol. cich.

138 Pars I. *De Alterantibus.*

pimpin. capill. ven. agrim. an. M. i.
fiat decoct. cum frustulo colli carnis,
vervecinæ, vel vitul. colatur. leviter
incoque sennæ mund. ʒ. iii. anisi &
cremor. tartari, ana. ʒ. ss. express.
dissol. manæ ʒ. i. vel ʒ. i. ss. colaturam
capiat manè &c.

C A P U T III.

De Syrupo magistrali.

Syrupus magistralis componitur vel
ex decoctis alterantibus & purgan-
tibus, vel ex succis herbarum, & saccha-
ro, coquendo usque ad consistentiam
syruipi.

Decoctis alterantium utimur in
chronicis affectibus hepatis, lienis
mesenterii, quando, non solum pur-
gare intendimus, sed & aperire.

Succi ex usu sunt in hypochondria-
cis morbis, cæterisque melancholicis
affectibus ab atrabile, cancro, phlo-
gosi hypochondriorum, scorbuto,
quando humectandi & refrigerandi
necessitas est major: & quidem uti-
liores

Cap. III. *De Syrupo mag.* 139

tiores sunt succi, quia plantarum salibus magis turgent, quàm decocta, in quibus ob dissipationem ab igne, paucus est sal volatilis.

Dosis purgantium debet esse triplo, aut quadruplo major, quàm in apoze-
mate.

Saccharum additur, vel aliqua mel-
lis portio cum saccharo in affectibus
frigidis pulmonum, tum ut diu serve-
tur liquor incorruptus, tum ut saporem
gratiorem concilient.

Proportio liquoris ad saccharum, aut
mel, est dupla, aut tripla, ut si sint
liquoris lb. iij. sit sacchari lb. i. ss. vel
secundum aliquos lb. i. prout crassior,
vel dilatior syrupus experitur, vel du-
rationi longiori, aut breviori destina-
tur, vel etiam prout remissiùs vel
fortiùs purgans exigitur, à sacchari
magna copia syrupus debilitatur &
calidior fit.

Dosis est ad ℥. i. ss. vel ℥. ij. pro
majori vel minori syrupi efficacia, hu-
moribus purgandis, & ætate.

Sumitur, vel cum jusculo alterante,
vel cum sero lactis, vel in aquis bu-
glossi, borrag. &c.

Ufus est.

1. In morbis chronicis hepatis, lienis, affectibus hypochondriacis, melancholicis, uterinis, cancris, scorbuticis, pulmonicis, in quibus, post universalia remedia alterantia & purgantia, jusculis, sero lactis, lacte asinino in mensem & ultra utimur, & clementer sexto vel octavo die est purgandum; vel etiam quia hujuscemodi affectus ultra perdurant, aut curati redeunt, semel aut bis in mense hujusmodi syrupo humores expurgamus.

Formula syrapi magistralis ex decocto, quoslibet humores præparans, & purgans.

℞. Rad. asparag. brusci, apii, an. \mathfrak{z} . i. β . cort. rad. capparis, & medii fraxini, an. \mathfrak{z} . i. fol. capillar. omnium, agrim. cichor. cum toto, an. M. i. summit. aspar. & lupuli, an. M. β . sem. apii, petros. an. \mathfrak{z} . β . florum cordial. an. p. ii. fiat decoct. colatur. ad lb. ii. β . infunde, & ut artis est, decoque polypod. quercini contus. & sennæ mund. an. \mathfrak{z} . iii. agarici recent. trochisc. hermodact. turb. gum-

Cap. II. De Syrupo mag. 141

mosi, an. \mathfrak{z} . i. radic. mechoac. \mathfrak{z} . β .
epithymi \mathfrak{z} . i. semin. fœnjc. cinamo-
mi, an. \mathfrak{z} . i. β . express. ad lb . i. β . dis-
sol. rhab. in aqua cichor. cum tanta-
lo infusi & expressi \mathfrak{z} . i. sacchari
albi lb . i. β . fiat syrupus perfectè co-
ctus.

In causa calida prævalente, sequens
magis convenit.

\mathfrak{z} . Radic. asparag. brusei, bugloss.
an. \mathfrak{z} . ii. fol. cichor. & capillomnium,
an. M. j. liquirit. & passul. purgat.
cremor. tartari an. \mathfrak{z} . i. flor. cordial.
cichor. an. p. ii. fiat decoctio : colatu-
ræ ad lb . ii. infunde, & leviter coque
polypod. & sennæ mundat. an. \mathfrak{z} . iii.
agarici recenter trochiscati, & her-
modact. an. \mathfrak{z} . i. tartari vitriol. \mathfrak{z} . i.
express. ad lb . i. β . dissolve rhab. ele-
cti cum santalo in aqua cichor. infusi
& expressi \mathfrak{z} . i. aquæ novem infus. ro-
sar. pallid. \mathfrak{z} . vi. sacchari albi lb . i. β .
coque in syrupum.

Exemplum syrupi magistralis ex
succis.

\mathfrak{z} . Succor. recenter expressor. &
depurat. cichor. utriusque buglossi,
lupulor. fumar. lb . ii. succi pomor.

142 Pars I. *De Alterantibus.*

redol. & novem infus. rosar. pallidar.
ana lb. i. sennæ mund. ℥. iv. polypod.
querc. contusi, semin. carth. epith.
an. ℥. ii. radic. hellebori nigri ex
aceto præparat. ℥. i. β. agarici recent.
trochiscati, turbit, & rad. mechoac.
an. ℥. ii. tartari vitriol. ℥. i. caryo-
phyl. zinzib. an. ℥. i. infundantur &
coquantur: colatur. ad lb. ii. dissolve
rhab. electi in lb. i. succor. infusi cum
santalo & expressi ℥. i. β. sacchari albi
℥. xx. fiat syrup. perfectè coctus.

Sequens syrupus confert in affe-
ctibus hypochondriacis, in infarctu
ab humoribus biliosis adustis, phthi-
si, hæmoptysi, cæterisque aliis ca-
sibus, quibus per intervalla pur-
gandum, & humorum commotio ri-
menda est, præsertim in constitutione
debili, corpore gracili, & visceribus
calidis.

℥. Sennæ mund. ℥. i. coriand.
præpar. ℥. i. rhab. ℥. β. santali citri-
ni ℥. i. aquæ cichor. ℥. xx. infunde
calidè supra cineres per sex horas.
Colaturæ expressæ dissolve pulpæ cas-
siæ recenter extractæ ℥. iv. infunde
per quatuor horas calidè, per vices

Cap. IV. *De Dieta alt.* 143

agitando cum cochleari, cola & exprime: colaturæ expressæ dissolve mannæ ℥. iii. sacchari albi ℥. iv. liquentur simul lento igne sine ebullitione saepe cum cochleari movendo, fiat syrupus idonea consistentia.

Dosis est ad ℥. ii. vel ℥. iii.

Modus utendi prædictis syrupis hic est.

℥. Syrupi magistralis præscripti ℥. ii. plus minus pro ætate, morbo, & probatâ operatione, dissolve in jusculo refrigerante, vel sero lactis suff. quantitate, capiat manè. Si non purgetur sufficienter, incoqui debent jusculo, vel sero lactis, sennæ ℥. ii. vel ℥. iii. & deinde expressione factâ dissolvetur syrupus.

C A P U T IV.

De Dieta alterante & purgante.

Dieta vel est alterans & sudorifica, de qua suprâ cap. 12. sect. 2. vel simul & cathartica, de qua hic.

144 Pars I. *De Alterantibus.*

Estque decoctum exsicicans, sudores movens, & per alvum evacuans.

Paratur ex sudorificis ut supra eadem dosi, purgantia in pauca copia & dosi præscribenda, ex quarta parte minori, quàm in apozemate, quia vires ferre non possent evacuationem insignem per habitum & secessum eodem tempore.

Tempus sumendi est manè hora sexta per 10. aut 15. dies, si vires ferant & morbus exigat. Alioquin per 5. vel 8. dies primos hæc diæta purgans, postea vero detractis purgantibus sudorifica continuatur.

Vfus est in corporibus cacochymis, & robustis, in morbis frigidis & humidis cerebri, nervorum, ad apoplexiæ reliquias auferendas, ad arthritidem, asthma à causa frigida, luem veneream, &c.

℞. Rad. chinæ & falsæ parill. an. \mathfrak{z} .
j. ss. aquæ fontis lb. iij. infunde per
24. horas, deinde fiat decoct. ad
mediæ partis consumptionem, adden-
do sub finem Polipodii quercini &
fol. sennæ, ana \mathfrak{z} . i. turb. hermod.
& agar. recent. trochis. an. 3. ij.

Cap. I V. *De Diætâ alt.* 145

semin fœnic. ʒ. j. cinam. ʒ. ss. de colatur. capiat lb. i. ss. singulo manè. &c.

Nota, non esse sudores vi excitandos, sed corpus relinquendum solitis stragulis coopertum, ut pro libito transudet aut expiret.

Per totum diætæ tempus utendum sequenti bochetto.

℞. Salsæ parill. ʒ. ii. aquæ fontis ʒ. viii. infunde & decoque ut artis est, colaturâ utatur pro bochetto.

Ante usum cujuslibet diætæ præmittenda sunt alterantia & evacuantia, ne materia fusa effervescat, aut in partes debiliores feratur.

Ad reliquias apoplexiæ auferendas, aut paralytim ipsi succedentem, utimur prædictâ diætâ purgante. Cui etiam incoqui debet folior. beronica, mellissæ, arthriticæ, & primulæ veris, an. M. i. vide tamen, ne calor viscerum repugnet, & potiùs attemperantia miscenda insinuet.

CAPUT V.

De Opiata.

PRædictis formulis alterantium, roborantium, & purgantium accedit opiata, quæ est medicamentum consistentia molle, non tamen fluidum, compositum ex variis, ut conserva, electuariis, pulver. syrup. & similibus.

Usus est.

1. Ad alterandum & aperiendum, in intemperie & obstructione viscerum, suppressis menstruis, pallidis virginum coloribus, morbis melancholicis, & similibus, præmissis sufficienter universalibus.

In causa calida.

℞. Conser. flor. cichor. ℥. i. croci martis aperient. ℥. vi. confect. hyacinth. & magisterii tartari an. ℥. i. pulver. diarrhod. abbat. ℥. ii. cum syrupo capill. ven. fiat opiata, de qua capiat manè ℥. ii. superbibendo parùm aquæ cichor. postea leviter ambulet per

Cap. V. De Opiata. 147

unam aut alteram horam, & post tres horas capiat jusculum alteratum herbis refrigerantibus, per 10. aut 12. dies.

Nota, non esse præscribendos sales lixiviales, ut absinthii, tamarisci, cichor. & similes, quando chalybe aut chalybeatis opus est in opiata. Quandoquidem huiusmodi sales ita chalybem præcipitant, ut sola ferè pars adstringens remaneat.

In causa mixta ex calida & frigida.

℞. Confer. flor. borrag. & capill. ven. an. 3. vi. chalyb. præpar. 3. i. confect. hyacinth. & diarrhod. abb. an. 3. i. spir. tartari 3. iii. syrup. capill. ven. q. s. fiat opiata de qua cap. 3. ii. mane &c.

Opiata aperiens sine chalybe, quando leves sunt obstructions cum lenta febre, præmissis universalibus.

℞. Confer. flor. cich. 3. i. cynorrh. 3. β. confect. hyacinth. & tartari vitriol. an. 3. iv. salis fraxini & absynth. an. 3. β. pul. triafanth. 3. ij. cum syrup. de cichor. simpl. fiat opiata: de qua capiat 3. ij. manè.

148 Pars I. *De Alterantibus.*

In contumacibus obstructionibus addi possunt.

Spiritus gummi ammoniaci ad 3. j. β.

Spiritus volatilis salis ammoniaci ad 3. iij. &c. quæ cap. 3. sect. 1. de jusculo aper. descripta sunt.

Nota, quodd post quintam, & decimam dosim, sit præscribendum medicamentum purgans, dum aliqua ex prædictis opiatis utitur ægrotans, ad præparatæ materiæ evacuationem.

Vel

℥. Pul. diacarth. 3. j. pul. hieræ picræ ℥. i. diagridii gr. iv. misce cum 3. ij. opiata, in quinta & decima dosi.

2. Ad aperiendum & purgandum, quando materia est crassa, & corpus validum, in morbis viscerum, uteri, mesenterii, cum obstructionibus inveteratis.

In causa calida.

℥. Conser. flor. cich. 3. j. salis martis 3. ij. fennæ mund. rhab. electi, agar. recent. trochisc. an. 3. i. β. radic. mechoac. 3. i. magisterii tartari ℥. ij. pulveris triasantali 3. β. cum sy-

Cap. V. *De Opiata.* 149

rupo ros. sol. fiat opiata , de qua
capiat ʒ. ij. aut ʒ. iiij. per decem
dies.

In causa mixtâ crassa , contu-
maci.

℥. conser. capill. veneris , & cha-
lyb. præpar. cum sulphure , an. ʒ. vi.
gummi ammoniaci in aceto soluti &
per setaceum trajecti ʒ. iij. sennæ
mund. agar. recent. trochisc. rhab.
electi , an. ʒ. ij. radic. mechoac. &
jalap. an. ʒ. β. pulver. diarrhod. &
fæculæ bryoniæ , an. ʒ. β. cum syrupo
de pomis regis Sabor , fiat opiata,
de qua capiat ʒ. ij. vel si non satis
purgetur ʒ. iiij. manè par 10. aut 12.
dies , &c.

℥. Sennæ mundat. rhab. elect.
agar. recent. trochisc. ana. ʒ. iiij. radic.
jalap. & hermodact. an. ʒ. j. β. se-
min fœnic. & coriand. an. ʒ. i. salis
martis ʒ. iiij. mellis q. s. fiat opiata,
de qua capiat manè ʒ. iiij. per &c.

Nota 1. augendam esse dosim eorum
ex quibus opiata componitur; vel can-
dem minuendam esse , prout in plures
vel pauciores dies destinatur.

150 Pars I. *De Alterantibus.*

Nota 2. in usu chalybis ; levipost quamlibet dosim corpus motu esse exercendum , ut facilius ad intima penetrant aperientia , & humores moti promptè obediunt , robustis per loca difficilia eundem , debilioribus & minus robustis per plana & proclivia , idque per duas horas , per intervalla quiescendo metu lassitudinis. Post tres horas à sumpta opiatâ , sumendum est jusculum alteratum herbis aperientibus & refrigerantibus.

Nota 3. ante usum opiatæ chalybeatæ præmittenda esse sufficienter universalia ad præparationem , & majori ex parte materiæ evacuationem ; tum ut calor , si quis adsit , temperetur ; tum ne chalybis vi humores fusi & attenuati , penitus in obstructas partes deducantur : cum è contra universalibus sufficienter præmissis superstites in penitioribus partibus & venulis humores chalybis pondere , & vi salis ipsius volatilis attenuentur abstergantur , acida imbibantur , simulque à purgantibus foràs educantur.

3. Ad refrigerandum & increas-

Cap. V. *De Opiata.* 151

ſandum in tuſſi violentâ & contumaci,
ſputo ſanguineo, menſium profluvio,
ad curationem, vel præcautionem poſt
uniuerſalia.

℥. Conſer. roſar. & conſol. maj. an.
ʒ. j. conſect. hyacinth. ʒ. i. perlar.
præpar. corall. rubr & ſemin. plan-
tag. an. ʒ. ſſ. laud. opiati ʒ. j. cum
ſyrupo de roſis ſiccis fiat opiata: de
qua capiat ʒ. i. aut ʒ. ij. ſingulo veſ-
pere dum ibit cubitum, ſuperbiben-
do cyathum aquæ papaveris rhœad. &
portul.

Vel

℥. Conſer. roſar. Genu. cynorr. &
ſymph. major. an. ʒ. vi. pulv. flor. pa-
paver. rhœad. & ſem. papav. alb. an.
ʒ. j. pul. boli armeni tenuis ʒ. ʒ.
gumm. tragac. & ſem. alth. an. ʒ. iv.
cum ſyrup. de roſis ſiccis f. opiat. de
qua capiat ʒ. ij. ter. in die, manè, veſ-
pere hora 4. & in lecti ingreſſu.

4. Ad roborandum, de quo videt
partem ultimam de roborantibus.

CAPUT VI.

De Bolo.

BOlus est medicamentum solidum quidem, sed molle, dictus à sumendo Βῶλον, quod per morsellos deglutitur.

Fit ex electuariis, pulpis, conservis, pulveribus in consistentiam minùs fluidam, deglutibilemque, redactis.

Vfus.

1. Ad alterandum.

Bolus aperiens in obstructionibus viscerum, cachexiâ, suppressis menstruis, morbis melancholicis.

℞. Salis martis gr. vi. vel viij: vel x. conser. flor. cich. 3. ii. fiat bolus, utatur per xv. dies, intermixtis purgantibus per ptisanas, quinto quôque die, & adhibito corporis motu, ut in opiata chalybeata.

Bolus refrigerans & roborans in febribus, tum & post purgationem.

℞. Conservæ rosar. 3. ij. confect. hyacinth. 3. ss. salis prunellæ & triantal. an. ʒ. i. fiat bolus.

Cap. VI. De Bolo. 153

Bolus adstringens in alvi fluxu.

℞. Conser. rosar. rubr. 3. i. ss. trochisc. de corallis, & de terra sigillata, an. ʒ. i. syrupi granator. q. s. fiat bolus.

In dysenteria, & omni immodico fluxu sanguinis dolore sedando, & somno conciliando in cholera morbo, & omni profluvio alvi à bile.

℥. Conser. rosar. rubr. 3. ss. laudani opiat. gr. ij. vel iij. fiat bolus, detur horâ convenienti manè aut vespere.

Præscribi potest idem bolus in phrenitide, paraphrenitide, maniâ, omnibusque morbis, in quibus adsunt symptomata paraphorica.

Cave in pueris, senibus, & valde debilibus à laudano; si absolute necessarium videatur, ne his præscribatur ultra unum aut alterum granum.

Ad alios usus concinnatur bolus, ut ad sudorem ex sudorificis, ad urinas movendas ex appropriatis, &c.

2. Ad purgandum. De quo vide caput de bolo cathartico.

3. Ad roborandum. consule caput de bolo roborante.

CAPUT VII.

De Pilulis.

Pilulæ sunt medicamenta forma solida & rotunda, ad alterandum, purgandum, roborandum, comparata.

Vocantur catapotia, quod deglutiendo integræ sumantur. Quod fit vel ad insuavitatem ingredientium fallendam, vel ut longius in ventriculo morentur cum roborare, vel à longinquis partibus purgare intendimus; vel cum aqua & pituita fluctuant in imo ventre.

Componuntur ex speciebus aperientibus, diureticis, purgantibus, & roborantibus, prout varia est intentio, quæ excipiuntur liquore aliquo glutinoso, ut syrupo, melle, sapa, macilagine, ut in massam aptius cohæreant.

Ad multos usus destinantur.

1. Ad aperiendum in obstructionibus viscerum, pallidis coloribus, morbis melancholicis, &c.

Cap. VII De Pilulis. 155

℥. Calybis præpar. cum sulph. ʒ. i. pulver. diarrhod. abbat. ʒ. i. cum syrupo capill. ven. fiant pilulæ : dosis est ʒ. i. singulo manè , superbibendo parum aquæ buglos. vel cichor. per 9. dies, præmissis universalibus , interjectâ & subsequente purgatione.

℥. Chalyb. præpar. ʒ. ss. vel salis martis ʒ. ij. gummi ammoniac. in aceto soluti ʒ. ij. aloës lotæ in aqua cichor. ʒ. ij. tartari vitriol. ʒ. iv. cum syrupo capill. ven. fiant pilulæ : dosis est ad ʒ. ij.

Pro Hysteriis ad præcautionem.

℥. Gummi ammoniaci cum aceto præpar. ʒ. i. chalybis præpar. cum sulph. ʒ. ij. myrrhæ rubr. castor. optimi, an. gr. vi. croci ʒ. ss. spiritus volatilis salis armoniaci gutt. xv. syrapi capill. ven. q. s. fiant pilulæ 40. capiat iv. dum it cubitum , per duos aut tres dies , in singula septimana.

Ad urinas movendas , sabulosam materiam devehendam , detergenda ulcera in gonorrhæâ.

℥. Terebinth. venet. vitrioli albi, an. ʒ. i. ss. misce in mortario marmo-

156. Pars I. *De Alterantibus.*

reo, diu terendo, dum simul incorporentur. Fiant pilulæ ad pisi molem. Dosis est ʒ. i. aut ʒ. ij. per 6. aut 8. dies, manè tribus horis ante jusculum.

2. Ad aperiendam, & purgandum in diuturnis obstructionibus viscerum, febribus quartanis, cachexiâ, retentione menstruorum, &c. quandò materia simul præparanda & evacuanda.

℞. Chalyb. præpar. cum sulph. ʒ. i. aloës optim. sennæ mund. rhab. electi, & agar. recent. trochisc. an. ʒ. ij. gummi ammoniaci in aceto soluti & trajecti ʒ. iij. fœnic. bryon. & pulver. diarrhod. abbatis, an. ʒ. ʒ. croci ʒ. ʒ. cum oxymelite fiat massa pilularum: de qua capiat ʒ. i. singulo die, tribus horis ante jusculum, per viii. vel ix. dies, deambulando per unam aut alteram horam.

Vel.

℞. Aloës optim. gummi ammoniaci soluti & trajecti, ana ʒ. iij. sennæ mund. rhab. myrrhæ electæ an. ʒ. i. ʒ. croci ʒ. ʒ. cum oxymelite scillitico fiat massa pilular. de qua capiat ʒ. ij. alter-

Cap. VI. *De Pilulis.* 157

nis diebus duabus horis ante prandium.

In hysterica passione.

℞. Assæ fœtidæ, castor. & laudani opiat. an. gr. ij. fiant pilulæ iij. capiat statim.

Ad tussim sedandam, dum materia falsa & subtilis est, & tussis valde molesta.

℞. Succu liquirit. 3. i. myrrhæ 3. β. laudani opiat. gr. xv. cum syrupo de papavere fiant pilulæ. Dosis est ad gr. x. singulo vespere, horâ somni.

Ad adstringendum in quolibet sanguinis fluxu, & in fine gonorrhœæ.

℞. Pilul. de bdellio 3. β. trochisc. de karabe, de corallis, an. 3. i. mastich. 3. β. cum syrupo de rosis siccis fiant pilulæ, dosis est ad 3. β.

3. Ad purgandum simpliciter. De quibus vide in parte secunda cap. 6. de purgantibus pilulis.

CAPUT VIII.

De Pulveribus.

PUlvres facîle parantur, dum sicca medicamenta, seu ex mixtis simplicibus; seu ex vegetantibus, aut animalibus, redigi in pulverem jumentur.

Alius officinalis, qui servatur paratus in officinis.

Alius Magistralis, qui à medicis præscribitur secundum variam intentionem; & vel est externus, vel internus.

Uſus interni i. ad alterandum in diuturnis viscerum obstructionibus, cachexiâ, pallidis coloribus, ad quæ pathemata sequens pulvis utilissimus est. Dicitur Quercetani cachecticus.

℞. Limatur. chalyb. cum sulph. calcin. ʒ. i. fœcul. rad. aronis ʒ. i. ꝑ. ambræ grise. gr. xii. essent. corallor. magister. perlar. an. ʒ. iv. sacchari q.s. fiat pulvis. Dosis est ad ʒ. ꝑ. manè per aliquot dies.

Cap. VIII. *De Pulveribus.* 159

Vel

℞. Chalyb. præpar. cum sulph. sacchari ana ʒ. i. fiat pulvis : de quo capiat manē ʒ. i. β. per x. dies , tribus horis ante iusculum.

Contra febres intermittentes.

℞. Dictamni , fol. scordii sicc. an. ʒ. ii. semin. card. bened. cornu cervi præparat. an. ʒ. i. antimonii diaphoretici ʒ. β. fiat pulvis tenuissimus , dosis est ʒ i. horâ unâ ante paroxysmum , superbibendo aquæ card. bened. vel scab. ʒ. iiij. continuando per sex dies , præmissis sufficienter universalibus , in corpore obeso humido , non gracili sicco.

Hactenus inutili conatu , omni artis ingenio , quæsitum est febrifugum intermittentibus febribus sistendis , aut extirpandis idoneum. Felici huius seculi experimento inventum præbuit natura , ex vegetantium familia ; idque simplex , innocens , innoxium omni constitutioni , & ætati , quod rationali methodo adhibitum huc usque mira præstitit , febriles paroxysmos quasi fascino ligat per spatium viginti dierum , aliquando ad men-

160 Pars I. *De Alterantibus.*

sem integrum , sæpe etiam penitus extinguit. Cortex est cujusdam arboris cortici , junioris quercus non absimilis, sapore amarus & subadstringens, dicitur china chinæ : sic præscribitur.

℥. Chinæ chinæ in pulverem redactæ ʒ.ij.aq.fontis ʒ.iiij.infunde tepidè : aquam bibat & pulverem longè ante paroxysmi initium , nihil sumendo ante & post per tres horas.

Infusio fit tepidulè per tres horas, plus minus nihil refert, aliàs in vino albo, à quo tamen abstinendum, dum viscera & humores nimium incalescunt ; neque minùs febrem sistere, usus ostendit , cum in aqua simplici infunditur , quàm cum in aqua cichor. fumar. bugloss. rosar. aut cum conserva cichor. cynorrhod. vel pulpâ pomi cocti permixtus exhibetur.

Tempus præscribendi, tum & sumendi vel est liberum, vel coactum. In curatione regulari quando non urget grave aliquod symptoma, ante usum ipsius, corpus sedulò præparandum est, tum alterantibus, tum evacuantibus. Sed cum timor est , ne accessionis violentiâ & maligna humorum indole , tum &

Cap. VIII. *De Pulveribus.* 161

symptomatis cujuscumque vi corruant vires, non est exacta illa præparatio expectanda, prius enim æger deficeret. Sic vidimus in quibusdam, quibus febris vehementia, humorum copia & malignitas, cordis & cerebri viribus in paroxysmos deficientibus, mortem citò & certis indiciis intendebant, sumpto pulvere semel, bis terque, febriles paroxysmos & omnem deleteriam indolem desævuisse, & his quidem vel leviter, vel nullatenus per alvum, ob temporis defectum expurgatis; sed hoc irregulari modo, & viribus præ symptomatum vehementia pessundatis, vel proximè perituris.

Pariter dicendum de tempore, quo sumi debet, sæpius enim paroxysmum sistit, si exhibeatur octodecim, vel viginti horis ante paroxysmi initium, maximè si non unà vice, sed ter, quaterque consequenter, semel in die, longè ante accessionis, vel exacerbationis principium. Sic enim ictu quasi repetito certius febrem jugulat, & sæpe recidivam tollit; ad quam præcavendam, non inutiliter paratur opiatæ ex eodem pulvere & conserva flor.

162 Pars I. *De Alterantibus.*

cichorei, vel fructuum cynorr. de qua
ager ter aut etiam pluries in septimana,
per mensem, capiat frustulum manè
jéjuno ventriculo; quo tempore alvus
die alterno clystère laxanda. At si de-
sit sufficiens intervalli tempus, quod
in subintranribus, & duplici tertiana
continua sæpe contingit, tempore re-
missionis; & hoc si desit, omnibus in
pejus ruentibus, quolibet etiam paro-
xysmi tempore propinandum est.

Dosis pulveris est ad ʒ. ij. pueris
pro modulo ætatis ad ʒ. i. aut ʒ. ʒ.
cùm verò subinde repetita sit exhibitio,
sufficit dosis media.

Prodest omnibus febribus intermit-
tentibus, quotidianis, tertianis, quar-
tanis; omnibus pariter morbis, in
quibus insignis est humorum tenuium
fermentatio, maximè si periodicè re-
currat, ut in cholera morbo, alvi flu-
xu bilioso symptomatico, & similibus;
tunc verò datur pulvis in aqua rosar.
portul. aut si vomitus instet, cùm con-
serva rosarum permiscetur.

Qualitates hujus pulv. & modum
operandi detergit, i. sapor, qua enim
amarus, calidus siccus est & tenuium
partium,

Cap. VIII. De Pulveribus. 163

partium , quibus aperit , attenuat , resolvit , & motu idoneo exagitando , putredinis fermentum præcipitat : quâ verò stypticus est , subadstringit , sicque motum humorum frænât , & partes roborat , illam præcipuè in qua focus est , & hac partium heterogænearum energiâ , febriles excandescencias mirabiliter coercet , quod forsitan non præstaret , si spiritus , extractum , vel oleum ipsius exhiberetur. 2. patet hunc esse ipsius agendi modum ab effectu : si enim sumpto pulvere cesset febris , adhibito deinde , seu post paucos , seu post plures dies , medicamento purgante , incandescit fomes & febrilis motus renovatur , scilicet sopito empyreumate , & quasi fascino pulveris irritito , rursus exagitato. Idcoque abstinendum est ad mensem pharmaco purgante , solis clysteribus alvus laxanda , & exquisita victus ratio adhibenda.

Antiquus est apud Arabes & Turcas , jam verò Europæis valde familiaris potus coffeæ , fabæ nempe cujusdam Arabicæ Bon dictæ. Est hic fructus

164 Pars I. *De Alterantibus.*

tenuium partium , calidus in primo gradu , siccus in secundo , qui ut par est assatus , & in pulverem redactus , in aqua ferventi ad tincturam coctus , & sorbillando haustus mira (ut inquirunt) præstat : spiritus narcosi irretitos expedit , purgat , illustrat , & diu vigiles innoxie conservat , vapores & flatus discutit , humidum cerebrum venosumque genus exsiccet , roborat : ac proinde eum dolori capitis , vertigini , stupori , catarrho , cordis palpitationi , ventriculi debilitati , imò & obstructionibus hepatis , lienis , uteri conferre , non vulgaris notæ authorum experientia testis est. Sed quo Marte id præstat ? An non sale volatili , quo multum abundat ; constat ex odore , quem plurimum exhalat , etsi diu servatus , ex oleoso succo quasi balsamico , quem exprimit , quo stomachum , cerebrumque roborat. Sed crediderim temperamento frigidis & humidis , aut minus calidis , non autem macilentis , adustis , & soluto in serum sanguini convenire. Sic paratur.

℞. Pul. coffee ritè tosti cochlear

Cap. VIII. De Pulveribus. 165

i. projice in \bar{z} .x. aquæ ferventis, lente bulliat, sæpè movendo cum cochleari, donec liquor sit tinctus, qui deinde calidè jejuno ventriculo cum pauco saccharo sorbillandus, ter in septimana. Liquorem cum pulvere alii absorbent, & tunc minùs incoqui debet.

Sed quid de herba Japonensi & Chinensi Thee dicta? de cujus usu hæc eventilant. Caput levat & servat à somno immune, vapores reprimit, ventriculum roborat, renes calculo & arenis expurgat, tollit capitis dolorem, lassitudinem, gravedinem, apnceam, intestinorum tormina, calefacit modicè, & adstringendo osculum ventriculi, vaporum suprà ad somnum repentium coërcet ascensum.

Modus utendi est 1. In substantia, dum ejusdem in pulverem reductæ cum aquæ calidæ cyathis sumitur ad \bar{z} .ß. vel \bar{z} .i. 2. In decocto in aqua ad \bar{z} .i.ß. addendo saccharum ad gratum saporem, & sumitur calidè. 3. Distillatione cum aquis appropriatis in B. M. 4. Infunditur ad \bar{z} .i.ß.

166 Pars I. *De Alterantibus.*

in aquis cordialibus vel vino generoso tenui, de quo sumitur ad cochlear. iii. aut iv. addito paucō saccharo. 5. In extracto, redigendo in pilulas, quarum dosis est ad gran. x. 6. Suffumigio ad eundem modum, quo in tubulo utimur nicotianā, & in morbis frigidis capitis, pectoris, & gravedine.

Pulvis contra vermes pro infantibus.

℞. Sem. contra 3. β. fenn. mund. 3. i. β. coriand. præp. & cornu cervi usti an. 3. i. β. f. pulvis, dosis est ad 3. ii. vel 3. i. manè per tres dies.

Contra abortum.

℞. Gran. Kerm. 3. i. santal. rubr. rad. torment. an. 3. β. perlar. & corallor. præpar. an. 3. i. manus Christi perlar. 3. ii. f. omnium pulvis, dosis est ad 3. β. cum ovo forbili manè.

Contra calculum.

℞. Calculi renum, aut vesicæ q. v. contere in tenuissimum pulverem, & propina, præmissis universalibus: abstergit mucosam è renibus & vesica, pituitam, sabulosam abducit colluviem, & lapidem comminuit.

Cap. VIII. De Pulveribus. 167

Vel

℞. Salis fabar. prunell. & cremor. tartar. an. ʒ. i. misce, fiat pulvis : dosis est ab ʒ. β. vel ʒ. i. ter in septimana, manè jejuno ventriculo cum pauca conserva rosarum vel cum ovo.

Vel

℞. Oculor. cancr. præpar. succini albi, cremor, tartari, ana ʒ. ii. lapidis nephritici præpar. ʒ. i. β. milleped. præparat. ʒ. ii. nucis mosch. ʒ. β. fiat omnium pulvis : dosis est ad ʒ. β.

2. Ad purgandum, de quo in parte 2. de purgantibus.

3. Ad roborandum, de quo supra capit. de cardiac. & infra dum de roborantibus.

Uſus externi.

Ad ossa exfolianda.

℞. Rad. aristol. rotundæ, ireos Florent. an. ʒ. i. β. myrrh, & aloës an. ʒ. i. euphorbii ʒ. i. fiat omnium pulvis, ossi corrupto, vel alterato inspergendus.

Vel

℞. Aristol. rotund. euphorb. ireos Florent. an. ʒ. i. sabinæ sicca,

168 Pars I. *De Alterantibus.*

aluminis usti, mercurii præcipitati
ana ℥. i. aloës, myrrhæ, an. ʒ. ss. olei
garyop. gutt. x. fiat pulvis inspergen-
dus offi carioso, quod priùs ablue aqua
aluminosa.

Ad putridas carnes consumendas, &
detergendum in ulcere maligno.

℞. Mercurii præcipitati rubri ʒ. ss.
redigatur in pulverem inspergendum
ulceri bis in die.

Vel

℞. Ossis sepiæ, sacchari candi tu-
thiæ præpar. an. ℥. i. vitrioli ℥. ss. fiat
pulvis.

Vel

℞. Radic. aristol. rotund. gentian.
an. ʒ. ii. myrrhæ, aloës, plumbi usti,
tuthiæ præpar. an. ʒ. i. fiat omnium
pulvis ulceri inspergendus.

Ad fœda faucium ulcera in lue ve-
neræa, aut aliis affectibus in quibus ad-
est maligna qualitas.

℞. Sulphuris vivi ʒ. ss. myrrhæ ru-
bræ, aluminis saccharini an. ʒ. ij. ma-
stiches, thuris ana ʒ. i. ℥. ii. fiat om-
nium pulvis, de quo misce ʒ. i. cum
℔. i. vini albi sublimati, aut campho-
rati, & utere pro abluendo ulcere.

Cap. VIII. *De Pulveribus.* 169

Alumen saccharinum fit ex alumine rupeo, ovi albumine, & saccharo simul mixtis & exsiccatis.

Vinum sublimatum fit ex sublimati optimi gr. x. infusis in lb. i. vini sub calidis cineribus ad tertiæ partis consumptionem decoctis, sic de camphora.

Non est hoc remedio utendum quando ulcus siccum est, vel humor tenuis acris, & corpus calidum siccum gracile, sed quando ulcus scatet pituitosis glutinosis, crassisque sordibus; in primo enim casu plus valent aquæ leviter aluminosæ, vitriolatæ, ferrugineæ, maximè si minerales sint.

Ad sanguinem sistendum.

℞. Aloës, myrrhæ & vitrioli an. ʒ. j. β. boli armen. terræ sigill. & sang. drac. an. ʒ. i. fiat omnium pulvis ad movendus parti, unde fluit sanguis.

Vel

℞. Thuris, aloës, boli armen. & pilor. lepor. an. partes æquales, excipe ovi albumine, & admove parti vulneratæ, ex Gal.

Pulvis sympathiæ.

℞. Vitrioli Veneris q. s. calcina

usque ad albedinem, dum sol percurrit
signum leonis, deinde redige in pul-
verem tenuissimum.

CAPUT IX.

De Tabellis.

Tabella est medicamentum soli-
dum ex pulvere & saccharo, in
convenienti liquore soluto, & iterum
ad duritiem cocto, atque tabulato: di-
citur tabella à plana forma.

Ea debet esse proportio pulveris ad
saccharum, ut pro ℥. j. sacchari, sit 3. j.
pulveris.

Nota, non esse dissolvendum sac-
charum in liquore acido, ut succo li-
monum, &c. nam iterum non concre-
ceret; multò minùs si spiritus acidi vi-
trioli, sulphuris & similes admiscean-
tur, aut etiam oleum.

Ufus 1. ad alterandum in obstructio-
nibus chronicis, febribus intermitten-
tibus, melancholia, &c.

℥. Chalyb. præpar. cum sulph.
3. 6. confect. hyacinth. 3. j. ambrae

Cap. IX. De Tabellis. 171

griseæ ℥. β. sacchari in aqua cichor. solut. ℥. iv. fiant tabellæ, de quibus capiat ℥. ii. singulo manè superbibendo aquam cichor. per x. aut xv. dies.

Vel

℥. Salis Martis ℥. iij. cinam. ℥. β. sacchari in aqua cichor. soluti & cocti ℥. iij. fiant tabellæ, dosis est ad ℥. ij. &c.

Vel

℥. Magister. tartari ℥. iij. spiritus gummi ammoniaci ℥. β. sacchari ℥. iv. fiant tabellæ, dosis est ad ℥. i. β. singulo manè.

Ad tenuem fluxionem in cerebro incrassandam.

℥. Sacchari tabulati rosati ℥. iv. teneat saepe in ore.

Vel

℥. Pulpæ rad. liquirit. vel alth. ℥. β. pul. elect. diamarg. frig. & amyli sine calce parati, an. ℥. i. sacchari in aqua rosar. solut. & cocti ℥. iij. fiant tabellæ.

Ad Asthma.

℥. Pulpæ radic. alth. & symph. maj. ℥. ij. florum sulph. ℥. i. florum

H. 5;

172 Pars I. *De Alterantibus.*


benjoin. \mathfrak{z} . j. sacch. in aqua tussilaginis soluti, & cocti \mathfrak{z} . iv. fiant tabellæ.

Vel

\mathfrak{z} . Lactis vel florum benjoin. \mathfrak{z} . j. sacchari in aqua rosar. vel lilior. dissoluti \mathfrak{z} . iv. fiant tabellæ.

2. Ad purgandum : de quo vide caput de tabellis purgantibus.

3. Ad roborandum : de quo sectione de roborantibus.



S E C T I O IV.

*De Alterantibus & roborantibus
externis.*

C A P U T I.

De Epithemate.

E Pithema significat vi nominis omne medicamentum, quod foris adhibetur, propriè tamen sumitur pro medicamento admovendo partibus no-

Cap. I. *De Epithemate.* 173

bilibus , ad ipsas alterandas & roborandas.

Duplex est liquidum ; & solidum.

Liquidum componitur ex aquis, vel decoctis convenientibus , sive solis, sive cum confectionibus , pulveribus, electuariis. Penetrationis causâ additur succus limonum , vel acetum , vinum , aquæ spirituosæ , ros. naphæ, in hac proportionem, ut ad ℥.i. liquoris, sint confectionis ʒ. ij. pulver. ʒ. i. liquoris ad penetrandum ʒ. i. ℥. additur camphora in calidis , crocus in frigidis affectibus ad gr. iv. Admoveretur tepidè partibus principibus , aliquando etiam frigidè capiti , ut in mania.

Tempus adhibendi est hora quælibet, quando urget virium imbecillitas, aut aliqua causa promptè vires exhauriens. Tempus electionis est manè & vespere , medio tempore inter unum & alterum iusculum.

Modus utendi est hic, pannus scarlatinus , vel crassum linteum imbutum liquore epithematis , & leviter expressum , tepens adhuc parti admovetur : aufertur ubi exsiccatur , vel nimis

174 Pars I. *De Alterantibus.*

refrigeratur , & aliud super apponitur ; idque continuatur per horam, bis in die.

Ufus est.

1. Ad alterandum & roborandum cor , in febribus , in quibus adsunt æstus , imbecillitas virium.

℞. Aquar. buglossi. borrag. ros. an.
℥. iii. succi limon. & aquæ naphæ an.
℥. i. camphoræ gr. iii. fiat epith. cordii
admovend. repidulè bis in die.

In febre ardente & maligna.

℞. Aquæ scab. bugl. borrag. ros. an.
℥. iii. aquæ flor. arant. ℥. i. β. confect.
alkerm. & hyacinth. an. ℥. i. pulver.
diamarg. frig. ℥. ii. camph. & croci
an. gr. iii. fiat epithema.

Post epithema , cordis regio inungitur linimento cordiali , quod sequenti modo paratur.

℞. Confect. alkerm. & hyacinth.
an. ℥. i. ss. succi limon. vel pomor. q. s.
fiat liniment. quo post epithema illi-
niatur regio cordis.

In febre maligna.

℞. Confect. alkermes ℥. i. ss. olèi
scorpion. Mathioli q. s. fiat linimen-
tum , vel :

Cap. I. *De Epithemate.* 175

Solo oleo scorpionum Math. aut Balsamo Peruviano fit inunctio, vel ex mixtura utriusque; vel sine linimento admoveatur epithema solidum infra describendum.

Aliquando post epithema admoveatur pullus columbinus per medium sectus solus, vel sinapisatus 3. i. pulveris diamarg. frigidi.

2. ad spiritus instaurandos & reficiendos in syncope.

In casu calido vel frigido, in promptu est epithema ex solo vino, vel ex eodem cum theriaca, aut confect. alchem. calidiusculè cordi admoto, vel si adsit tempus parandi aliud.

℞. Aquar. scabiosæ, meliss. ros. an. 3. iiij. aquæ reginæ Hungariæ 3. ss. confect. alchem. & hyacinth. an. 3. i. pulver. diamb. ʒ. ij, croci gr. v. fiat epithema.

Cave in hysteriis à moscho & ambara.

3. Ad pectoris ardorem & siccitatem temperandum, in febribus synochis, ardentibus, præmissa venæsectione sufficienter, tum & in febre hectica.

¶ 76 Pars I. *De Alterantibus.*

℞. Hordei mandati p. i. 4. semin. frig. maj. an. 3. ij. flor. viol. nenuph. an. p. i. fiat decoct. colat. ad lb. i. misce olei amygd. dulc. 3. ij. fiat epithema pectori admovendum tepidiusculè bis in die, illiniendo postea pectus oleo amygdal. dulc.

4. Ad hepar calidum refrigerandum & roborandum in febre, aut extra febrem.

℥. Aquar. cich. plantag. portulacæ, an. 3. iiij. aceti ros. 3. i. ss. pulver. triasantali & diarrhod. abbatis, an. 3. i. camph. gr. iv. fiat epithema admovendum bis in die super hepar.

℥. Fol. cich. portul. viol. agrim. plantag. an. M. i. 4. semin. frig. maj. an. 3. ij. santali citrini & rubri, an. 3. i. ss. rosar. rubr. p. i. fiat decoct. colat. ad lb. ij. adde aceti rosati 3. ij. salis prunellæ 3. i. ss. f. epithema pro hepatis regione.

In fluxu hæmorrhoidum, cachexiâ à causa calida, hepate existente debili, præmissis universalibus.

℞. Aquar. cichor. agrim. rosar. ana 3. viij. incoque santali rubri & citrini.

Cap. I. *De Epithemate.* 177

minutim secti ana. ℥. j. colaturæ adde
aceti ros. ℥. iij camphoræ gr. iij.
fiat epithema admovendum jecoris
regioni.

Post epithema, in prædictis casibus
admōve sequens linimentum.

℞. Unguenti ros. Mesuës in oxycrat.
loti ℥. iij. sacchari Saturni ℥. i. cum succo
cichor. vel plantaginis fiat linimen-
tum, quo hepatis, & lumborum regio
illiniatur post epithema.

Nota, non esse præscribenda epithe-
mata nisi præcesserint universalia, ne,
corpore existente pleno, humores ma-
gis impingantur, aut repellantur in
partes principes.

Pro testibus ad partes nobiles alte-
randas.

In causâ calida, delirio, phrenitide,
maniâ, febre ardente, profluvio sangui-
nis è naribus.

℞. Oxycrati ℔. ij. utere pro epithe-
mate testibus admovendo, cum linteis
frigidè.

Vel

℞. Aquar. solani, plantag. ros. ana
℥. iij. camphor. gr. v. misce pro epi-
themate.

¶78 Pars I. De Alierantibus.

In causa frigida, syncope, febre maligna pereuntibus viribus, cæterisque casibus, in quibus vires cordis extinguuntur à frigida causa, seu externa seu interna, vel à calida admodum dissipatae sunt.

℞. Vini optimi ℥. ss. confect. alchem. ʒ. iij. misce, fiat epithema: admove calidè testibus.

De Epithemate solido.

Epithema solidum componitur ex conservis cardiacis, confectionibus, pulveribus, succis; cum hac proportionem ut ad ʒ. iij. conservæ, sint confect. ʒ. ij. pulver. ʒ. i. succi, aquæ, vel syrupi q. s.

Præscribitur post epithema liquidum, quo finito, superapponitur solidum.

Aliquando solo utimur solido, ut quando minor alterandi quàm roborandi necessitas est.

Ufus ad vires instaurandas, aut conservandas.

℞. Conser. ros. & bugl. an. ʒ. i. ss.

Cap. I. *De Epithemate.* 179

confect. alchem. & hyacinth. ana ʒ. i.
pulver. diamarg. frig. & diarrhod. abb.
an. ʒ. ss. cum syrupo de pomis fiat epi-
thema solidum admovendum cordis
regioni.

In lipothymia, syncope, &c.

℞. Conser. flor. anthos, & viol.
an. ʒ. i. ss. confect. alchem. & theria-
cæ veteris an. ʒ. i. pulveris diamb. ʒ. ss.
cum vino opt. vel aqua theriacali fiat
epithema solidum cordi admovendum.

In pleuritide, febribus malignis,
pestilentibus.

℞. Conser. rosar. & flor. borrag.
an. ʒ. i. ss. confect. alchem. ʒ. i. ss. pul-
ver. diamarg. frig. ʒ. i. cum oleo scor-
pion. Math. fiat epithema solidum pro
cordis regione.

Contra vermes cum vomitu in
pueris.

℞. Theriacæ diateffaron ʒ. iij.
pulveris mastiches, menthæ siccæ an.
ʒ. ss. cum syrupo de absynthio fiat
epithema solidum applicandum umbi-
lico.

CAPUT II.

De Fomento.

Fotus remedium liquidum variis partibus admovendum pro variâ intentione.

Fit ex decocto radic. herbar. partibus affectis convenientium, aliquando etiam ex oxycrato, lacte, hydreleo, &c.

Liquor in quo fit decoctio, vel est aqua simplex, vel aqua & vinum cum simul roborandum est, vel lac quando dolor demulcendus, vel aqua fabrorum & chalybeata, quando est adstringendum. Additur ad penetrationem acetum in morbis calidis vinum album in frigidis.

Admoveretur æstate cum linteis crassioribus, vel duplicatis: cæteris temporibus cum pannis laneis albis, aliquando cum spongiis, aut vesicis bubulis.

Semel aut bis in die fit fomentatio; prout urget affectus, & æger obtempe-

Cap. II. *De Fomento.* 181

rat, manè duabus horis post jusculum vel statim à sumpto julepo, aut dosi apozematis; vespere ante jusculum, aut coenam.

Uusus est.

1. Ad æstus viscerum, & humorum in imo ventre ebullientium temperandum, cum vel sine febre.

℞. Rad. oxylap. ℥. ii. utriusque malvæ, cichor. lact. violar. agrim. an. M. i. semin. 4. frig. maj. an. ℥. ij. fantali citrini minutim secti. ℥. β. rosar. rubr. & nymph. an. p. i. fiat decoct. colat. ℔. iij. adde aceti ros. ℥. iv. fiat fofus, admovendus toti ventri infimo, cum pannis lineis crassioribus, bis in die tepidulè, per horam.

2. Ad emolliendum, refrigerandum, aperiendum, & roborandum, quando adest durities, tensio in hypochondriis cum obstructionibus, quod in febribus continuis & intermittentibus ferè semper accidit, & in aliis affectibus sine febre.

℞. Rad. alth. lapati acuti, an. ℥. i. ss. utriusque malvæ, violar. cichor. totius, capill. ven. agrim. an. M. i.

182 Pars I. *De Alterantibus.*

femin. althææ & linin. an. \mathfrak{z} . i. santali
citri crasso modo triti \mathfrak{z} . β . rosar.
rubr. p. i. fiat decoct. colat. lb. iiij. adde
aceti ros. \mathfrak{z} . iv. fiat fotsus admovendus
toti ventri infimo &c.

Nota 1. quod in iis, & similibus
decoctis, semper addenda sunt specifica
roborantia, quæ Gal. in arte parva
docet esse spirituosa substantiâ prædita,
& vi quâpiam adstringente, ad tempe-
riem & tonum partium conservandam
quæ remediis alterantibus, & laxan-
tibus dissolvuntur. Talia sunt santa-
lum citrinum, rubrum, rosæ rubræ,
absynth. cinnam. spica nardi, & similia.
Frigida in calidis, calida in frigidis
affectibus usurpanda.

Nota 2. Fomenta non esse admove-
nda, nisi post præmissa universalia,
alioquin fundendo humores, eos mo-
vent in partes infarctu aut obstructio-
nibus laborantes, aut flatibus ventrem
distendunt, dum humores crassi præ-
copiâ fermentantur, & non transpi-
rant: aliquando etiam febrem fusis
& agitatîs humoribus excitant; unde
dicitur, impura & plena corpora non
esse balneanda, neque fovenda.

Cap. II. *De Fomento.* 183

Ad adstringendum in morbis, in quibus alvus laxior est ut in diarrhœa, cholera, dysenteria, profluvio menstruorum, fluxione hæmorrhoidum, &c.

℞. Radic. bistort. torment. pentaph. an. ʒ. i. fol. cich. cum toto, agrim. plantag. equis. bursæ past. & verbasci an. M. j. santali rubri crassè triti ʒ. i. rosar. rubr. balaustr. an. p. i. fiat decoctio ad lb. iiij. addendo sub finem, vini rubri austeri, & aceti ros. an. ʒ. iiij. fiat fodus admovendus, &c. detrahe vinum, si fluxus sanguinis adsit, aut febris & æstus viscerum insignis.

Aliquando cum alvi, aut sanguinis profluvio, ut notatum est suprâ cap. de hystericis, adsunt infarctus in hypochondriis cum viscerum obstructione, tunc sociandæ sunt indicationes, & miscenda cum emollientibus & aperientibus adstringentia. Ea debent prævalere, quorum indicatio urgentior est.

℞. Radic. oxalid. pentaph. an. ʒ. ii. malvæ, cich. totius, equiseti, agrim. an. M. j. sem. portul. paliuri, an. ʒ.

184 Pars I. *De Alterantibus.*

iiij. santal rubri ℥. j. rosar. rubr. M. ℞.
fiat decoct. colaturæ addito aceto ad
℥. iv. foveatur totus venter inferior,
&c.

4. Ad emolliendum, & discutiendum
in colicis doloribus, aliisque morbis à
flatu, aut causa frigida.

℥. Rad. alth. calami aromat. an ℥.
j. ℞. malvæ, calament. puleg. majoran.
& summit. anethi an. M. i. florum
camom. melil. an. p. i. fiat decoct. in
aqua fontis, addendo sub finem vini
albi ℥. iv. colatura foveatur, &c.

In dolore pleuritico, nephritico,
aut alterius partis; ex emollientibus,
anodynis, & solventibus.

℥. Rad. alth. & lilior. an. ℥. i. fol.
mal. utriusque, violar. pariet. an. M.
j. semin. lini, & fanug. an. ℥. i. florum
chanomil. & melil. an. p. i. fiat
decoct. colaturâ foveatur latus dolens,
vel regio lumborum, vel alia pars af-
fecta tepidè cum pannis lineis, vel
cum vesica bovis, bis in die, superil-
liniendo cum oleo amygdal. dulcium,
vel linimento appropriato, vel insu-
per admovendo cataplasma, prout ex-
pedire videbitur.

Cap. II. *De Fomento.* 185

5. Ad roborandum stomachum dissolutum à causa frigida, vel mixta.

℥. Radic. cyperi, calami aromat. an. ʒ. i. β. folior. absynth. menthæ, major. an. m. i. spicæ nardi & santali rubri crasso modo triti an. ʒ. β. rosar. rubr. schœnanth. an. p. i. fiat decoct. in æquis partibus aquæ & vini rubri: colaturâ foveatur regio umbilicalis tepidè bis in die.

Cavè, ne viscera sint calida, hepar enim incumbit ventriculo, & lien à sinistris partibus assistit.

De Embroche.

Embroche differt à fotu, quòd eius materia ex alto irrigando affundatur, aliquando etiam admoveatur ad modum fomenti.

Ufus est.

Ad temperandum capitis ardorem, somnium conciliandum in febribus ardentibus, phrenitide, maniâ, omni-que insigni delirio.

℥. Fol. viol. lactuc. solan. beton. an. M. j. sem. alth. & papav. albi an. ʒ. iii. flor. viol. nymph. an. p. i. fiat

186 Pars I. *De Alterantibus.*

decoct. colaturâ foveatur sinciput de-
ratis capillis, bis in die; vel utere
solo oxycrato.

In apoplexiâ, cæterisque soporosis
affectibus, in causa merè frigida.

℥. Rad. zedoar. ireos Florent. an.
℥. i. fol. beton. salviæ, rorismar. major.
an. ℥. j. baccar. lauri ℥. j. β. florum
stoechad. p. j. fiat decoct. in æquis par-
tibus aquæ & aceti: colatura utere
pro fomento cum spongiis vel linteis,
præmissis universalibus.

Iis accedit fœtus ille, qui dicitur
siccus, qui fit cum sacculis, in quo
includuntur herbæ, & aromata con-
venientia, maceratur in vino rubro,
aut alio liquore.

Uſus eſt.

In alvi fluxu, cholera, dysenteria,
dum partium naturalium vires, & to-
nus dissolvuntur.

℥. Rad. cyperi & calam. aromat.
an. M. i. cinam. nucismosch. & garyo-
ph. an. ℥. ij. rosar. rubr. p. iij. fiant
duo sacculi interpuncti, macera in vi-
no generoso, & vicissim tepidè appli-
ca, per horam supra umbilicum manè
& vespere.

De

Cap. II. De Fomento. 187

De Lotionibus.

Lotiones sunt quædam fomenta, quæ pro diversis partibus, & scopis variè componuntur.

1. Pro capite, ulceribus, tinea, & pediculis scatenti.

℞ Radic. ireos flor. & enulæ camp. an. \mathfrak{z} . ij. folior. absynth. salviæ, beton. & abrotani, an. M. i. semin. staphysag. urticæ, & sulphuris vivi an. \mathfrak{z} . ss. summæ. centaur. min. stœchad. an. p. i. fiat decoct. in æquis partibus aquæ & vini rubri, vel in lixivio sarmentorum: colaturâ foveatur caput manè calidè postea exsiccetur, unguento appropriato illiniatur.

2. Pro pedibus roborandis in cachecticis, arthriticis, &c.

℞. Fol. salviæ, rorismar. & absynth. an. M. i. flor. salviæ & rosar. an. p. i. salis & aluminis, an. \mathfrak{z} . ss. fiat decoct. in aqua & vino pro lotionem pedum manè & vespere.

3. Ad somnum conciliandum urgentibus vigiliis, in delirio, phrenitide, &c. tum & in sanis.

℞. Fol. malvæ violar. lact. & solani, an. M. i. capit. papaveris albi M. i. ss.

188 Pars I. *De Alterantibus.*

flor. nymph. M. β. coquantur in oxy-
crato : colaturâ foveantur pedes ir-
rigando manè & vespere hora
somni.

C A P U T III.

De Balneo, & semi-Balneo.

Balneum est totius corporis infra
caput, in quocunque liquore im-
mersio.

Duplex est simplex, & compositum.

Simplex fit ex aqua sola tepida, vel
ex oleo solo, vel ex lacte, aut aqua,
& oleo.

Utimur balneo ex aqua dulci, frigi-
dâ ad totius refrigerium & inducendam
cutis laxioris constipationem : tepidâ,
ad gracilia siccaque corpora humectan-
da, vasa laxanda, humores ad cutem
evocandos, somnum conciliandum in
hectica laborantibus, aut longo iti-
nere fatigatis.

Ex aqua marina, ad humores exi-
stentes in habitu corporis absumendos,
cutem firmandam, & roborandos,
artus.

Cap. III. *De Balneo, &c.* 189.

Ex oleo, vel oleo & aqua ad mitigandos dolores colicos & nephriticos citra inflammationem, ad cutem laxandam, & totum corpus emolliendum, præsertim in convulsionibus.

Ex lacte, ad efficaciter humectandum squallidum corpus.

Utimur aliquando pro balneo vineæ adhuc vino calentibus, ad humores in habitu corporis, & artubus existentes liquandos & resolvendos, externasque partes excrementis liberandas novâ firmitate roborandas.

Thermales aquæ competunt pro balneo in morbis frigidis, quæ pro varia metallorum aliorumque fossilium mixtura succos diversos, sales & spiritus obtinent variis affectibus utiles.

Balneum compositum fit ex decocto radic. herbar. semin. flor. vel etiam fossilium, quibus thermalium aquarum vires proximè imitari intendimus.

Radices ac semina præscribuntur libris & unciiis, herbæ fasciculis, flores manipulis, fossilia libris & unciiis.

Tempus ingrediendi balneum est manè & vespere, vel manè solum aut

190 Pars I. *De Alterantibus.*

vesperè ante cibum , non vigente frigore , aut ætu nimio . perfectâ coctione , alvi , & vesicæ excrementis prius exclusis : tepidum sit balneum , in ingressu , ne calore nimis accendat , aut frigore rigorem excitet , aut poros occludat & obstruat.

Mora in balneo est per horam plus minùs pro viribus , & tolerantia corporis : post balneum linteis blandè exsiccatum corpus quieti tradendum. Ante ingressum balnei , vel etiam in 1. ingressu , aut saltem post semi horam ab egressu , prodest gracilibus & debilibus assumere jascolum refrigerans , lac , aut serum lactis , aut hordei cremorem. Balneum enim nocet famelico. Continuari debet per triid um , si bis in die ; per sex aut octo dies , si semel sumatur : quæ omnes cautiones adhibendæ sunt , in usu tam simplicis quàm compositi balnei. Aliquando in ingressu balnei exhibetur præsana laxans aut aliud medicamentum purgans , præsertim in morbis melancholicis hypochondriacis , hystericis , calidis gracilibusque corporibus. Seu ad præcautionem , seu ad curationem

præscribatur balneum, semper præmittenda sunt universalia, quæ sufficiant ad tollendas obstructions, infarctus, durities, & tumores viscerum; ne fusi calore balnei humores, aut fluxiles redditi, aut intrò frigore repulsi, in partes debiles aut malè affectas decambant.

Ufus est.

1. Ad refrigerandum & humectandum in calidis visceribus, renum ardore, dysuria, febre hæctica.

℞. Fol. viol. lact. malv. cich. utriusque bugloss. an. fascie. 1. amygd. dulc. contus. & in sacculo inclus. ℥b. ss. fl. r. viol. nymph. an. M. i. fiat decoct. in aqua fontis, vel fluviali pro balneo, quod ingrediatur tepidè, manè horâ vii. vesperè hora iv. & continuet per triduum, plus minùs pro exigentia.

Æger egressus è balneo inungatur linimento refrigerante parti affectæ, & morbo appropriato.

2. Ad adstringendum in immodico menstruum, hæmorrh. & alvi fluxu, præmissis sufficienter universalibus.

192 Pars I. *De Alterantibus.*

℞. Rad. bistort. & consol. maj.
2n lb. j. fol. plantag. cupressi, centi-
nod. versbac. equis. an. M. i. lb. cortic.
granat. balauft. alumin. an. M. i. lb.
rosar. rubr. M. ij. fiat decoct. in aqua
fontis, adde aceti rosar. lb. $\frac{1}{2}$. pro bal-
neo, &c.

3. Ad paralyticum corpus exsiccan-
dum, si balneum desit naturale.

℞. Salis comm. lb. ij. sulphur. &
alum. an. lb. i. folior. puleg. salv. cha-
mæp. hyss. rorism. an. fascic. j. flor. stœ-
chad. anth. salv. an. M. ij. fiat decoct.
in aqua, addendo sub finem vini rubri
lb. ij. pro balneo, &c.

De Semibalneo.

Semibalneum, semicupium, infes-
sus idem sonant, estque dimidium bal-
neum, in quo usque ad eos ventriculi
media fœmora æger proluatur.

Quia minor liquoris quantitas ad in-
fessum necessaria est, quàm ad balneum
integrum, ita minor copia sumitur eo-
rum, quæ incoquantur, cùm semibal-
neum simplex non est, sed compo-
situm.

Cip. III. De Balneo, &c. 193

Vfus est.

1. Ad temperandum calorem & siccitatem viscerum.

℞. Fol. cich. bugl. utriusque cum rad. lact. fumar. an. M. iv. amygd. dulc. contus. ℥b. β. florum nymph. rosar. an. M. ii. fiat decoct. in aqua fontis, addendo aceti ros. ℥b. ꝑ. pro semicupio, quod ingrediatur &c.

2. Ad dolorem nephriticum & colicum, urinæ suppressionem &c.

℞. Rad. alth. lilior. an. ℥b. β. fol. malvæ, pariet. violar. berulæ, & raph. an. M. iij. semin. lini, petros. fœnic. an. ʒ. ij. coquantur in aqua fontis pro semibalneo: addi potest olum commune, vel vinum album ad ℥b. i. ꝑ.

3. Ad menses movendos.

℞. Fol. utriusque malvæ, pariet. artemis. valerian. an. M. iij. semin. lini, fœsel. an. ʒ. iij. sabinæ, & dictam. an. M. iij. florum chamæ. summit. hyper. an M. j. coque pro semibalneo.

CAPUT IV.

De Stupha.

Stupha, sudatorium, laconicum, & vaporarium significant modum, quo æger vapore calido & sicco, vel calido & humido incalescit, & sudat.

Multiplici modo eliciuntur sudores in stupha.

1. Vel in sudatoriis thermalibus à fervido vapore poros aperiente, & diffusos per habitum humores evocando, quod prodest frigidis affectibus capitis, nervorum, cachecticis, arthriticis, &c.

2. Vel erecto cum cupa conopeo, quod incalescit à vapore, qui excitatur à lapidibus decens, vel duodecim in cupa dispositis, iisque ferventibus, supra quos infunditur decoctum herbarum, quæ diaphoreticæ sunt; vel ab eodem decocto in cupa posito, in quod lapides illi igniti projiciuntur.

Cap I V. De Stupha. 195

; Vel instrumento ligneo cavo dicto *l'archet*, aut quod commodius est, *capsula* ex ligno & charta crassiori parata; in illo ponitur æger decumbens capite extrâ erecto, in hoc sella insidens comprehenditur totus, excepto capite, quod sæpe per fenestellam extrâ exierit ad melius respirandum; vas simul aquâ vitæ plenum includitur, & accenditur, ac hujus vapore cutis spiracula aperiuntur.

Usus est in prædictis affectibus, rheumatismo, lue venerea, in qua sudores aliquando excitamus, etiam cum cinnabaro. Celebranda prius sunt universalia, & particularia remedia, nec nisi corpore ritè purgato in usu esse debet. Ut convenit frigidis affectibus & obesitas, sic calidis & siccis naturis, atque morbis adversatur. Aliquando etiam ad peculiare membrum aptatur hujusmodi remedium, ut in ilchiade diuturna, aut chronico artûs alicujus dolore, in quo casu membrum cupulâ, vel instrumento ligneo arcuato inclusum, & stragulis præbètectum, calidis vaporibus à spiritu vini,

196 Pars I. *De Alterantibus.*

vel decocto diaphoretico, aut aceto
cui silex candens fuerit injectus, exha-
lantibus, in sudores transpirat.

C A P U T V.

De suffitu.

Suffitus est medicamentum formâ
siccum, vel humidum, quod ignis
vel caloris vi expirat odores variis affe-
ctibus convenientes.

Alius est siccus, alius humidus.

Siccus componitur ex pulveribus
aromaticis, quibus si addantur gum-
mata, concinnantur in trochiscos.

Usus est.

1. Ad roborandum, & alterandum
in frigida & humida intemperie cere-
bri, catharro, &c.

℞. Ladan. ʒ. ij. styrac. calami aro-
mat. an. ʒ. i. β. benjoin. thuris, ligni
aloës, an. ʒ. iij. ambræ & moschi, an.
gr. ij. fiat omnium pulvis, quo super
carbones injecto suffiantur tegumenta
capitis, & de quo vapores naribus &
ore hauriat in lecti ingressu. Si ex hoc

Cap. V. De suffitu. 197

pulvere trochiscos efficere velis, adde gummi tragacanthi in aqua rosar. soluti q. s. fiant trochisci, quorum usus idem est ac pulveris.

Detrahe moschum & ambaram, si pro mulierib. desideratur suffimentum.

2. Ad exsicccanda maligna ulcera venerea, oris & faucium.

℥. Styrac. myrrh. thur. mascul. an. ʒ. ij. benioin. ʒ. iij. cinnab. ʒ. i. cum mucilag. gummi tragac. fiant trochisci, quorum unus incipiatur carbonibus ignitis, fumum suscipiat æger ore hiante.

3. Ad Excitandos sudores in prædicto instrumento ligneo, ad luis venereæ curationem.

℥. Cinnab. ʒ. j. β. Styrac. myrrh. calamit. ana ʒ. j. resin. pini ʒ. ij. terebinth. q. s. fiant trochisci ad suffitum.

Fiunt suffitus ex castoreo, plumis perdicum, papyro, asâ fœtida, solis vel mixtis, naribus tantum admoventis pro hysteriis.

Suffitus humidus vapor est, ex liquore nempe, aceto, vino, aquâ ros. naphæ, &c. Ex olla vi caloris expirans.

Excipitur in uteri affectibus per

198 Pars I. *De Alterantibus.*

fellam perforatam, aut infundibulum :
in aurium morbis per tubulum ad figu-
ram infundibuli concinnatum.

Uſus eſt in menſibus ſiſtendis , aut
movendis ex chalasticis , in dyſenteria
ex adſtringentibus , in ani procidentiâ,
hæmorrhoidibus ſiſtendis , leniendis,
pro quo ultimo prodeſt ſequens for-
mula.

℞. Folior. verbaſc. & rad. porri, an.
M. i. ſemin. lini ℥. j. coque in aquæ q.
ſ. cujus tepidus vapor ano ex perforato
ſedili excipiat.

C A P U T VI.

De Oxyrrhodino.

OXyrrhodinum vi nominis ſigni-
ficat medicamentum ex aceto &
roſis factum. Communiter verò à pra-
cticis uſurpatur pro eo , quod capiti,
fronti , & collo adhibetur.

Componitur ex oleo roſ. & aceto,
cum hac proportione ut ℥. iij. olei ſit
℥. j. aceti roſ.

Uſus eſt.

Cap. VI. *De Oxyrrhodino.* 199

1. In febribus, dolore capitis insigni delirio vel præsentē vel imminente, lethargo, comate vigili, & similibus, in quibus æstuat cerebrum.

℞. Olei ros. ℥. iv. aceti ros. ℥. i. β. fiat oxyrrhod. admovend. deraſo ſincipiti, & fronti cum ſtipis cannabiniſ tepidè bis terque, diu noctuque.

Loco olei roſati ſumi poſſunt oleum violar. de nymph. de papav.

Vel

℞. Olei roſati ℥. iij. aquæ roſ. & plantag. an. ℥. i. aceti roſ. ℥. i. β. fiat oxyrrhod. &c.

Debet mutari dum incaleſcit, aut refrigeratur per ſex aut ſeptem vices.

Oportet ut præmittantur univerſalia, non ſunt enim admovenda topica repellentia corpore adhuc pleno. Quando adeſt inflammatio, non eſt perſerverandum ultra principium & augmenti initium, tunc enim miſcenda ſunt reſolventia, ut oleum chamæmel. cum prædictis repellentibus.

2. Adhibetur in diarrhœa, dyſenteria, quando adeſt phlogôſis, aut

200 Pars I. *De Alterantibus.*

inflammatio, repidè ab umbilico ad
pubem, cum stupis cannabinis.

C A P U T VII.

De Frontali.

Frontale est topicum medicamen-
tum, quod fronti admovetur citra
simplicem illinitionem.

Componitur ex herbis floribus con-
tatis, & in aceto maceratis: vel ex un-
guentis, pulveribus, aqua ros. ovi al-
bumine, aceto rosaceo & similibus:
includuntur hæc duobus linteis, &
fronti, temporibusque applicantur.

Ufus est.

1. Ad hæmorrhagiam, & fluxiones
in aures & oculos sistendas.

℞. Pul. boli armen. ros. terræ sigill.
an. 3. j. mastich 3 ss. farinæ volat. ʒ. iv.
cum album. ovi, & aqua rosar. agiten-
tur, cumque stupis cannabinis fiat
frontale admovendum fronti, & tem-
poribus.

2. Ad demulcendum capitis dolo-
rem.

Cap. VII. *De Frontali.* 201

℞. Fol. lact. violar. an. M. ss. rament. cucurb. ℥. ij. minutim feca, & applica fronti & temporibus.

3. Ad somnum conciliandum.

Communiter fit frontale ex ovi albumine agitato cum aqua & aceto ros. stupis cannab. excepto.

Vel

In febribus, deliriis, vigiliisque, quando validius desideratur.

℞. Fol. lact. nymph. hyosciam. an. M. j. gran. kermes ℥. j. contunde cum aqua & aceto rosac. fiat frontale.

℞. Conserv. rosar. ℥. i. ung. populei ℥. ss. pul. requiei Nicolai ℥. i. gran. kermes ℥. ss. cum ovi albumin. agitato cum aqua ros. fiat frontale admovendum fronti, & temporibus, singulo vespere renovandum.

C A P U T VIII.

De Placenta rosacea.

IN diarrhoea, dysenteria, vomitu, & omni dissolutione partium naturalium, post universalia.

202 Pars I. *De Alterantibus.*

Utiliter admoveetur toti ventri infimo placentia rosacea, macerata in solo vino rubro; vel in causa calida, in æquis partibus aquæ ros. & aceti, pulvere aliquo convenienti conspersa.

℞. Pulv. thur. mastich ros. corall. rubri, an. ʒ. i. inspergatur placenta ros. macerata in aqua ros. cum tertia parte aceti, vel in æquis partibus aceti rosati, aquæ & vini, admove calidè ventri infimo.

Detinetur per duas aut tres horas, postea exsiccata pars illinitur oleo, vel linimento appropriato. Applicatur semel aut bis in die, prout expedit.

C A P U T IX.

De Linimento.

Linimentum consistentiam habet mediam inter oleum & unguentum, oleo crassius, unguento liquidius est.

Componitur ex oleis, axungiis, butyro, pulveribus, medullis, unguentis. Proportio ea esse debet ut ad duas

Cap. I X. *De Linimento.* 203

olei partes , sit una axungiae aut butyri , pulverem 3 j.

Dosis totius linimenti est ad 3. iv. plus minus pro partis affectus magnitudine. Cera non est addenda, quia poros obstruit.

Ufus est.

1. Ad refrigerandum, & demulcendum dolorem in partibus aestuantibus.

R. Vng. ros. Mesues. & cerati refriger. Gal. lotorum in oxycrato, an. 3. j. salis Saturni 3. i. succi endiv. q. s. fiat linimentum.

Pars aestuans, vel inflammata illiniatur hyeme tepide, aestate frigide.

2. Ad pectus laxandum.

In causa calida, ut peripneumonia, pleuritide, tussi, solo utimur oleo amygd. dulc. pro pectoris linimento.

In frigida causa, aut mixta.

℞. Olei chamæmel. & lilior. an. 3. j. unguenti pectoralis, vel butyri sine sale 3. ss. fiat liniment. quo tota pectoris regio illiniatur.

Vel

℞. Olei chamæmel. 3. ij. unguent. de alth. 3. j. fiat linimentum, quo latus dolens illiniatur tepide.

204 Pars I. *De Alterantibus.*

3. Ad refrigerandum, laxandum
& demulcendum dolorem in nephri-
tide sine febre.

℥. Unguenti de alth. ℥. i. olei scor-
pionum Mathi. ℥. j. β. olei lilior. q.
fiat linimentum, quo lumborum regio
illiniatur.

4. Ad resolvendum, & roboran-
dum in paralyfi, convulsione.

℥. Ung. martiati ℥. j. theriac. vet.
℥. iij. styracis liquidæ, & aquæ vitæ
an. ℥. ij. olei rutæ. q. s. fiat linimen-
tum, quo spina dorsi, & partes pa-
ralyticæ illiniantur.

Ad similem scopum prodest balsa-
mum Guidonis.

5. Ad mitigandos dolores hæmor-
rhoidum, eorumque tumores discu-
tiendum.

℥. Unguenti ros. loti in aqua ros.
℥. ii. mercurii crudi ℥. ij. misce, fiat
linimentum.

C A P U T X.

De Unguento.

Unguentum est topicum medicamentum, ex oleo, pinguedine, medullis, resina, pulvere, cera & similibus compositum, ad firmiorem linimento consistententiam deductum.

Proportio ingredientium talis esse debet, ut pro ℥.i. olei, sit pulveris, & ceræ, utriusque quarta pars. Plerumque non limitamus ceræ copiam, sed ejus præscribimus q. s.

Solum unguentum nutritum fit sine cera & igne.

Dosis totius est ad ℥.iij. vi. vel lb. i. pro partis inungendæ magnitudine. Aliqui immiscent succos oleis, ut bulliant ad succorum consumptionem.

Unguentum aliud officinale, quod in officinis servatur paratum, ut ungu. ros. populæum, de alth. quibus vel folis, vel simul mixtis utimur.

Aliud magistrale, quod à medico ex tempore præscribitur; cujus usus est multiplex.

206 Pars I. De Alterantibus.

1. Ad emolliendum, & resolven-
dum in tumoribus duris, & doloribus
à causa frigida.

℞. Ung. de alth vel resumpt. an.
℥. j. ung. agrip. & anatis, an. ℥. β.
miscē, fiat unguent.

Unguentum nutritum ad herpes
cutis, ulcuscula, phlogoses.

℞. Litharg. auri tenuissimè triti,
olei rosar. & aceti, ana quantum li-
thargyrus agitatus in mortario ebibe-
re poterit, & justam crassitiem ac-
quisierit.

Loco aceti quando magis refrige-
randi, quàm exsiccandi opus est, nu-
tritum lithargyrus cum aqua ros. vel
plantag.

2. Ad scabiem & pruritum.

℞. Sulph. pul. succo limon. loti &
nutriti ℥. i. axungiae suillae, vel buryri
recentis. ℥. j. β. salis comm. ℥. j. fiat
unguent quo vespere dum it cubitum
illiniatur.

3. Ad salivationem provocandam in
lue venerea extirpanda.

℞. Mercurii optimi cum terebinth.
vel saliva perfectè extincti ℥. iv. axun-
giae porci lb. j. unguenti martiati ℥. i.

Cap. X. De Unguento. 107

olei chamæmel. q. s. fiat unguentum, quo illiniantur, ut artis est, artus, nates, & spina dorsi.

Fortius fiet unguentum, si mercurii quantitas augeatur ad lb. ss. pro lb. j. axungiae: Adhuc fortius erit si ad $\frac{3}{4}$. viij. Fortissimum verò si mercurii & axungiae an. partes æquales præscribantur.

Pro delicatis, gracilibus, & ad sputum proclivibus minor dosis; pro robustioribus aut robustissimis proportionaliter cæteræ conveniunt. Aliquando incipimus à minori dosi, & deinde augemus mercurii quantitatem, dum videmus sputum lentè apparere, & procedere.

Tempestas idonea est verna, vel autumnalis. Debet fieri inunctio manè horâ 6. In debilibus non longè ab assumpto jusculo; alioquin jejuno ventriculo, vel immediatè post assumptum cyathum bocheti ex china, incipiendo à partibus inferioribus ad superiores. Rarò fit bis in die inunctio universalis, nec unquam nisi in robustis: sed aliquando particularis vespere, secundum extremas partes, ut

juvetur prior inunctio, & ipsius operatio, utque natura citius proferat
πυαλισμὸν.

Inunctio fit per tres, quatuor, aut quinque dies, donec procedat oris fluxus; qui si, quando apparuit lentè progrediatur, promovendus est frictionibus particularibus manè, vel vespere horâ 4.

In obesità, pituitosità, iisque in quibus timetur nervorum imbecillitas, addenda est styrax liquida ad $\frac{3}{4}$. in unguentis.

Aliquando dum incipit pyralismus, abstinemus ab inunctione, in debilibus potissimum & delicatis corporibus; nec enim tamdiu celebrari debet, dum liberrimè oris fluor procedat, quia motus naturæ optimè regulari incipiunt debiliter, postea augentur: ideoque aliquando per unum, ut alterum diem fit intermissio, quo tempore si videamus naturam quasi sopitam, & penitus languentem ad oris fluxum, ulteriùs quantum satis videtur, inungimus.

Crisim in procinctu & proximè accedentem cognoscimus, quando adf

Cap. X. De Unguento. 209

lassitudo insignis , oris & gingivarum inflammatio , tumor , & ulcuscula nascuntur.

Inunctus æger linteis involvendus caldis , postea in lecto componendus , & stragulis coopertus per horam sinendus.

Nota , quòd non sit admodum opprimendus stragulis , si copiosus eliciatur sudor ; sed iis solum , quibus sufficiat ad majorem transpirationem , & unguenti ad interiora penetrationem. Per horam sic relinquitur , plus minùs , pro virium robore , deinde detergitur sudor , & post horam jusculum exhibetur.

Quamdiu celebratur hydrargyrosis , jusculis optimis & panatellis æger est nutriendus : accedente crisi solis jusculis , tum & quamdiu natura fatigatur , aut adest febris insignis.

Aliquando accidentia superveniunt , quæ impediunt salivationem , ut febris , convulsio , angina , suffocatio , sudor copiosus , alvi fluxus , ob fervorem & motum humorum , qui in varias partes feruntur , naturâ non determinante motum ad os , quia

210 Pars I. *De Alterantibus.*

opprimitur & nimis irritatur : tum
verò non est pertinaciùs insistendum
frictionibus , sed , ut prudenti medi-
co videbitur , vena secanda aut pur-
gandum , aut utrumque agendum , au-
clysteribus detergentibus , & anody-
nis laxior alvus coërcenda. Sedatâ tem-
pestate , si non moveatur oris fluxus
ad inunctiones rursus procedendum ,
non satis fuerint celebratæ , & vires
ferre possint.

Iisdem linteis diu noctuque imma-
neat æger , per sex vel octo dies
ut oris fluxus conservetur , nisi fe-
bris intensior , copiosus sudor , aut
alvi fluxus , aliudve insigne-sympto-
ma mutare cogat. Quando sudor &
alvi fluxus superveniunt insigniter ,
dum celebrantur frictiones , dandæ
sunt induciæ , & intervallum suffi-
ciens ponendum inter unam & alte-
ram inunctionem , ut desuescat , na-
tura , quò minimè confert , movere.
Quo tempore clysteribus convenien-
tibus , cæterisque indicatis frænandus
humorum motus.

Præparantia inunctionibus præmit-
tantur , in usu erant antea venæ
sectio

Cap. X. De Unguento. 211

sectio, purgatio per apozemata, diætā sudorifica per xx. aut xxx. dies; addebant aliqui hydrargyrosim: jam experientia ostendit securiùs extirpari radices luis venereæ, & salivationem obtineri, si venæ sectioni semel, bis, terve pro sanguinis copia, & viribus, purgationibus interpolatis, 1. ex senna, cassia, manna vel confect. hamech. & syrupo ros. postea ex aquila alba & præcipitato albo, diagridio & similibus, tum & jusculis aperientibus & refrigerantibus, balneis quoque ad sufficiens tempus, id est per xv. aut xx. dies celebratis; ultimò tandem soli luis venereæ ριζοτόμος hydrargyrosi confidamus.

Nota, quòd si luis venereæ, quod plerumque fit, implicentur alii affectus, ut viscerum obstructions, infarctus, febris continua, vel intermittens, tussis, macies insignis, priùs auferendi sint convenientibus remediis, non neglectis specificis. Iis verò vel penitus, vel ex majori parte sublati, procedendum ad regularem luis venereæ curationem.

212 Pars I. *De Alterantibus.*

Sinendum ut oris fluor procedat per xxx. dies, ad minùs xx. postea purgatio celebranda, cui præmittatur venæ sectio si necessaria videatur. Si calida viscerum intemperies supersit, jusculis refrigerantibus & balneis; & si macies etiam reperiatur, lacte asinino utendum.

C A P U T X I.

De Cerato.

CEratum à cera dicitur, remedium est consistentiâ medium inter emplastrum & unguentum.

Fit cùm unguentis cerâ additâ conciliamus paulò solidiorem consistentiam; vel cùm emplastrum oleis additis ad molliorem consistentiam deducimus: vel fit ex oleo, pulvere & cera.

Hæc est proportio ingredientium, ut si olei sit \bar{z} . j. sit pulveris \bar{z} . i. β . ceræ \bar{z} . β . ceratum refrigerans Gal. & santalinum sunt potiùs unguenta quàm cerata.

Ufus est.

Cap. Xl. *De Cerato.* 213

1. Cùm duritiem emplastri convenientis pars ferre non potest.

2. Ad emolliendum, resolvendum, adstringendum, nusquam ad refrigerandum, quia calefacit retinendo vapores.

Ad capitis vulnera. contusiones, & fracturas calvariæ.

℞. Massæ emplastri de betonica ℥. ij. olei. ros. q. s. fiat ceratum pro parte affecta.

Ad tumores lienis.

℞. Gummi ammoniaci in aceto soluti & trajecti ℥. i. olei de cappar. lilior. & ceræ, q. s. fiat ceratum admovendum parti bis in die.

In lienteria, dysenteria, & c.

℞. Pulver. mastich. boli armen. acaciæ, sang. drac. an. ℥. i. β. olei cydon. ℥. ij. ceræ q. s. fiat ceratum.

Vel

℞. Massæ emplastri pro stomacho ℥. ij. olei cydon. q. s. fiat ceratum, quo bis aut ter in die totus venter inferior illiniatur.

CAPUT XII.

De Emplastro.

EMplastrum ab effectu dicitur, quia obstruit & implet poros, estque remedium cerato crassius & viscidius, quod cuti admotum tenacius adhærescit.

Aliud est officinale, quod servatur in officinis paratum; aliud magistrale, quod præscribitur à medico ad varios scopos.

Componitur ex qualibet minerali, vegetabili, animali sicca substantia, quæ consistentiam assumit ab oleo, resina, pinguedine, gummi, cera & similibus. Quorum talis debet esse proportio, ut pro olei \mathfrak{z} . j. sint pulveris \mathfrak{z} . vi. ceræ \mathfrak{z} . j. β . sis axungia addantur, dimidiæ olei quantitatis vicem subeunt, ita ut \mathfrak{z} . j. axungia pro \mathfrak{z} . β . olei habeatur. Sæpè quia præcisè definiri non potest olei & ceræ quantitas, idè scribitur olei & ceræ q. s. immiscemus aliquando

Cap. XII. De Emplastro. 215

emplastra officinalia , prout varia est intentio.

Ufus est , quando validè est emolliendum , glutinandum , maturandum , digerendum , coquendum ; cutis enim spiracula constipando , validè calefaciunt , exsiccant , fundunt , & evocant ad exteriora.

Ad maligna & cancrofa ulcera purganda , & ad cicatricem deducenda.

℞. Olei , in quo limatura plumbi incoxerit , ℥. iiij. resinæ & gummi elemi , an. ℥. iiij. plumbi cum dimidio hydrargyri ad ignem fusi & in pulverem versi ℥. β. cerusæ lotæ , tuthiæ præparatæ , lapidis calaminaris , ana 3. ij. ceræ flavæ in aqua fabrorum liquatæ & lotæ , lb. j. misce , fiat emplastrum.

Ad tumidum linem deprimendum.

℞. Radic. cucum. asinini in aqua coctæ , pistæ , & per setaceum tractæ ℥. iiij. gummi ammoni. aceto soluti ℥. ij. galbani & sagap. an. ℥. β. olei de cappar. & ceræ q. s. fiat emplastrum.

CAPUT XIII.

De Cataplasmate.

Cataplasma significat medicamentum superpositum, estque malagma topicum ad pluris ferè consistentiam.

Componitur ex radicibus, foliis, seminibus, floribus ad eam dosim, quæ pro fomento. Coquuntur ferè ad putrilaginem, postea contunduntur, & traiciuntur per seraceum: adduntur pulveres, vel farinæ ad \bar{z} . iiij. vel iv. oleorum vel axungix ad \bar{z} . ii. vel iiij.

Fit etiam ex crusta panis tostâ, deinde in vino maceratâ, cui adsparguntur pulveres roborantes ad \bar{z} . i. vel ij.

Fit quoque ex micâ panis infusâ aut leviter coctâ cum lacte, addendo vitellos ovorum, crocum, & aliquando oleum rosaceum.

Fit nonnunquam ex fructibus, ut cydoniis sub cineribus coctis, deinde contusis & trajectis, additis pulve-

Cap. XIII. De Cataplasma. 217

ribus convenientibus, & vino, si opus videatur.

Uſus multiplex eſt.

1. Ad dolores ſanandos in principio fluxionis calidæ, vel inflammationis, unde dicitur *ἀνάλυτον*.

℥. Micæ panis albi lb. β. lactis caprill. q. ſ. coquantur in pultis modum, addendo vitellos ovor. n. ij. croci ℥. j. fiat cataplaſma.

Addi poſſunt etiam poma cocta duo, detractis cortice & ſeminibus.

Dolore multum urgente.

℥. Fol. hyoſciam. M. j. ſemin. papav. alb. lact. an. ℥. β. flor. camom. p. j. fiat decoct. in lacte caprill. quibus contuſis & cribratis adde vitellos ovor. ij. croci ℥. j. fiat cataplaſma.

Admoventur in dolore hæmorrhoidum, articulorum, & cæterarum partium; præterquam in laterum doloribus pleuriticis, & emunctoriis; in quo caſu materia forâs evocanda emollientibus, & reſolventibus mixtis cum anodynis.

2. Ad fluxionem reprimendam in principio inflammationum.

℞. Fol. plantag. oxalid. ſemperviv.

218 Pars I. *De Alterantibus.*

an. M. j. balauft. & rofar. rubr. an.
M. ſ. fiat decoct. in oxycrato, con-
tunde & cribra. adde farinae hord. \mathfrak{z} .
ij. olei roſati \mathfrak{z} . j. fiat cataplaſma & c.

Si urgeat dolor, miſcendum hoc ca-
taplaſma cum cataplaſm. anodyno ſu-
prà deſcripto, addito unguento popu-
leo ad \mathfrak{z} . j.

In carbunculo, & omnibus malignis
inflammatis puſtulis, ad humoris acri-
moniam retundendam.

\mathfrak{R} . Fol. arnogloſ. joxalid. an. M. ij.
panis ſyncomiſti \mathfrak{z} . iv. farinae lentium
 \mathfrak{z} . ij. coquantur in oxymelite fiat ca-
tapl.

Vel

\mathfrak{R} . Mali punici acido-dulcis; vel
alterus acidi, alterus dulcis, q. ſ. co-
que in aceto, contunde, & fiat ca-
taplaſma quarrâ quaque horâ renovan-
dum.

Si adſit puſtula nigra in centro,
cauſtico priùs tollenda, & ſcarifican-
dæ partes combuſtæ in vicinia, poſtea
admovendum cataplaſma.

3. In augmento inflammationum,
ad fluxionem deprimendam & leviter
reſolvendam.

Cap. XIII. De Cataplasma. 219

℞. Fol. plantag. M. iij. flor. chamomil. melil. summit. aneth. an. M. *ss.* fiat decoctio : contusis omnibus adde farinæ semin. lini & hordei, an. $\frac{3}{4}$. ij. olei chamom. $\frac{3}{4}$. *ss.* fiat cataplasma. Vel

℞. Farin. hordei & lentium, an. $\frac{3}{4}$. iiii. coque in oxycrato ad pultis consistentiam, addendo butyri recentis $\frac{3}{4}$. j. *ss.* olei rosati $\frac{3}{4}$. j. fiat cataplasma.

4. Ad suppurationem juvandam in pleuritide, vel in statu inflammationum.

℞. Radic. alth. & lilior. an. $\frac{3}{4}$. ij. fol. alth. mal. violar. pariet. an. M. j. semip. lini, & fœnugr. an. $\frac{3}{4}$. i. caricar. ping. par. vi. flor. chamom. melil. an. p.i. fiat decoct. Contusis omnibus, & cribratis adde unguenti de alth. & butyri sine sale, an. $\frac{3}{4}$. j. *ss.* olei chamom. $\frac{3}{4}$. ij. croci $\frac{3}{4}$. j. fiat catapl.

5. In virium defectu, languente stomacho, vomitu insigni, &c.

℞. Pulver. mastich. ros. cinnam. & garyoph. an. 3. ss. insperge super crustam panis tostam, & mero vel æquis partibus vini rubri, & aceti intinctam calidè, & admove supra umbilicum.

℞ s.

220 Pars I. *De Alterantibus.*

6. In alvi fluxu, dysenteria, cholera, vomitu.

℞. Cydon. coctor. sub cineribus, vel in aceto fortissimo, n. iv. contunde & trajice: adde pulver. mastich. corall. & santal. rubri, gran. kermes, an. 3. β. fiat cataplasma.

In cholera & vomitu.

℞. Fermenti acris 3. iv. macera cum aceto acerrimo, & succo menthæ, adde pulveribus menthæ sicc. 3. i. fiat catapl. admove umbilico.

C A P U T XIV.

De Vesicatorio.

Vesicatorium est topicum remedium, quod cuti admotum epidermida in bullas elevat, & ichorofam substantiam ad cutem educit.

Componitur ex variis, facilius tamen & utiliùs paratur, vel ex emplastro vesicante solo, aut addito pulvere cantharidum; vel ex fermento & cantharidibus præparatis, id est, quibus alæ & capita præcisa sunt.

Cap. XIV. *De Vesicatorio.* 221

Sinapismi & phœnigmi olim fie-
bant ex pulpâ caricarum & sinapi,
sed horum usus obsolevit, eorum
vices efficacius suppleant vesicantia.
Quorum

Ufus est ad humores ad cutem edu-
cendos, vacuandos, revellendos, &
derivandos, in soporosis affectibus, ca-
tarrho dilabente in pectus, oculos, au-
res, dentes, &c. In articulorum, &
ischiadiciis contumacibus doloribus,
exstosibus venereis, &c.

In morbis capitis admoventur supra
colli vertebrae; in affectibus oculorum
etiam ponè aures, &c. In aliis verò
casibus supra partem affectam. Volunt
aliqui prodesse feбри malignæ, si carpi
abmoveantur.

Quantitas vesicatorii pro ægri, &
partis cui apponitur magnitudine præ-
scribitur.

Vesicatorium ex solo emplastro ve-
sicante pro pueris, vel quando non est
opus forti.

℞. Massæ emplastr. vesicantis ʒ. ij.
vel iij. malaxa cum aceto acri, & fiat
vesicatorium.

Vel

212. Pars I. *De Alterantibus.*

Ex emplastro vesicante, & cantharidum pulvere; quando fortius desideratur.

℞. Massæ emplastr. vesic. ʒ. iij. pulver. canthar. præpar. gr. iv. cum aceto acri vel aqua vitæ fiat vesicatorium, admovendum colli vertebrae.

Vel

℞. Massæ empl. de gumm. ʒ. iij. pulv. canthar. ʒ. ss. cum aceto forti fiat vesicatorium.

Ex fermento & cantharidibus.

℞. Cantharidum præpar. ʒ. j. fermenti acris acetimo acerrimo emolliti, q. s. fiat vesicatorium admovendum colli vertebrae.

In apoplexia, & cæteris soporosis affectibus, pro partibus posticis aurium.

℞. Massæ emplastri vesicantis ʒ. ss. cantharid. præpar. ʒ. j. cum aceto acri fiant duo emplastra ad formam semilunæ, admovenda parti aurium posticæ.

Vesicatorium parti admotum tamdiu relinqui debet, quamdiu opus est, ut plures vesicæ excitentur. Quod fit aliquando intra horam, aliquando non operatur nisi intra tres, quatuor, aut sex horas.

Cap. ult. *De Dropace.* 223

Sublato vesicatorio bullæ tunc apertendæ , & folia betæ alterâ quâque horâ , præsertim æstate , admovenda. Si superveniat inflammatio , inungendæ partes inflammatae unguento rosato & albo Rhasis lotis in aqua plantag. si gangræna , scarificationibus & ablutionibus & cum aqua vitæ , tum & cataplasmate suprâ dicto utendum.

Non est adhibendum vesicatorium nisi præmissa fuerint universalia. In apoplexia statim post purgationem, aut venæ sectionem.

CAPUT ULTIMUM.

De Dropace.

Dropax est emplastrum ex pice confectum , fit quoque interdum instar malagmatis.

Modus faciendi hic est, liqua picem, adde parum olei , cui si ita expedit immisceri possunt piper , euphorbium , castoreum , sulphur , cinis sarmentorum , salpetræ , &c.

Admoveretur calefactus de rasis capillis.

224 Pars II. *De Evacuantibus.*

& avellitur priusquam refrigerat, iterumque calefit & applicatur donec pars rubescat.

Uſus eſt.

1. Ad humores ex alto educendos & diſcutiendos.

℥. Picis naval. vel burgund. ℥. i. β. pyreth. & ſemin. naſturt. an. ʒ. ij. olei comm. ʒ. iij. liquentur, extende ſupra alutam & fiat dropax cuti deraſæ admovendus, & antequam frigefcat detrahendus, idque tamdiu agendum, donec pars leviter intumeſcat.

2. Ad corrigendam intemperiem frigidam, utque calor revocetur in partem refrigeratam.

℥. Picis reſinæ, gummi ammoniac. aquâ vitæ ſoluti, an. ℥. i. pip. & ſulphur. vivi, an. ʒ. i. olei petrol. ʒ. ſs. fiat dropax.

3. Ad maciem brachij, vel cruris corrigendam.

℥. Picis naval. ℥. iv. olei ʒ. vj. liqua & fiat & dropax.

Interdum vices veſicatorii ſupplet pix burgundica, extenſa ſuper alutam, & colli vertebris vel inter ſcapulis admovetur. Allicit ſeroſos humores à capite, & à partibus intimis.




PARS II.

De Evacuantibus.

Causa morbi peccans quantitate indicat evacuandia : sanguis vena sectionem , excrementum purgationem insinuat ; quæ vel est universalis , vel particularis.

Universalis est , quæ validè unam corporis regionem , ceteras verò consecutione quadam evacuat : quæ vel fit per secessum & cathartica ; vel per vomitum , & vomitoria ; vel per sudores , & diaphoretica dicitur.

Particularis respicit determinatam partem. Cerebrum expurgatur per nares , quod præstant errhina , sternutatoria. Pulmo & thorax per bechica. Ventriculus per vomitorium. Gibba hepatis pars per diuretica : pars cava hepatis & intestina per purgantia : uterus per injectiones & pessaria.



S E C T I O I.

*De Evacuantibus universalibus
& primò de purgantibus
per secessum.*

PURGATIO, prout hîc sumitur est evacuatio quæ vi cathartici per inferiora absolvitur. Debetur humoribus excrementitiis seu copia, seu vitio substantiæ, naturæ infensis.

Remedia hanc evacuationem promoventia dicuntur cathartica, quæ dividuntur 1. ratione modi & vis operandi, 2. ratione humoris expurgandi.

Ratione modi & vis operandi, alia sunt benigna, quæ clementer expurgant primam corporis regionem; sunt quibus continentur emollientia, detergentia, abluentia, comprimentia. Alia sunt cathartica, ab antiquis vocata electiva, eradicatoria, quæ valide humores non solum à primis, sed & à cæteris regionibus eliciunt; ex quibus

Pars II. De Evacuantibus. 227

purgatio triplici modo se habet, vel enim est plena, vel minorativa, aut per epicrasim.

Ratione humoris purgandi, alia sunt cholagoga quæ bili, phlegmagoga quæ pituitæ, melanagoga quæ melancholiæ, hydragoga quæ sero, mixta quæ pluribus simul expurgandis humoribus conveniunt.

Quâ vi purgantia suam operationem absolvant, à tot seculis vix adhuc innotuit. Dum alius favet malignæ qualitati succos in vasis corrumpenti, corruptosque educenti, quod Galen. exhibilat, alius vi antipathicæ rem defert, magno quidem ignorantia vocabulo. Alius vi magneticæ simili, formæ Arabum cælesti, irritationi, tandem etiam similitudini substantiæ, quâ electiva illa Hippocr. & Gal. & tot subinde suffragantium censu celebratur attractio. Sed quid hic magnes? qui genium trahendi exuit dum poros suos igne, spiritu acido, aut allio perfrictus, ampliores, aut contorsione ad directam *ἐκκρίσιν* ineptos obinuit? quid formæ commentum?

228 Pars II. *De Evacuantibus.*

quid sola insufficiens irritatio, aut similitudo illa, quæ nec in crassi, nec in substantiæ modo purgantium & purgantiorum reperitur? Rhabarbarum, helleborus &c. parte suâ tenui volatili à plurimis facibus solutâ evocant serum bilem, cæterasque promiscuè pituitas & melancholicæ quilibet, licet crassas & viscidas.

Censemus nos operationem purgantium perfici irritatione à pharmaco, expulsionem à natura, fermentatione ab humoribus.

Pharmacum tenuitate partium penetrat, exagitat, fundit; acedine & molesto morfu, vasa & meatus aperit, nidore fædo & ingrato ita partes afficit, ut quantum possint declinent, & commotos humores unâ cum irritant pharmaco propulsent.

Natura expellit, vi quæ dicitur expultrix, quæ nihil aliud est quàm fibrarum facultas motiva ob irritamentum. Quæ quomodo sentiat irritationem non satis clarum est: sentire enim pertinet ad sensum animale. Oportet tamen constituere, perceptionem naturalem distinctam ab animali; cùm

Pars II. *De Evacuantibus.* 229.

enim fibræ non semper sint in motu, sed aliquando quiescant, oportet ut sit aliquid, quod eas ad motum determinet. Hoc autem ab ipsis percipi necesse est; quomodo enim irritari possint ad motum, si irritamentum non percipiunt. Scio à pluribus rem explicari exemplo mechanico, quo patet, fibras membranarum, & musculorum in animalibus defunctis, ipsumque embryonem, cum nullus adhuc est sensus animalis, à liquoribus acris, cæterisque pungentibus, sine ullo sensu, sese contrahere. Non idem tamen est motus naturalis, quia ille solâ contractione constat, ab acidis adstringentibus, & frigore condensante, tum & contractionum partium relaxatione: hic verò contractione & impulsu, quo à se partes extrudunt quod exstimulat. Fusiùs in rem istam inquirere istius loci non est.

Accedit ad pharmaci & naturæ motum humorum fermentatio, dum enim partes heterogeneæ pharmaci & humorum simul coeunt, fit fervor & pugna, quam sequitur separatio, præcipitatio, vasorum apertio, & partibus

230 Pars II. *De Evacuantibus.*

ob irritamentum ad expulsionem extumentibus, foras exclusio.

Materia remediorum purgationi conveniens sub variis formis præscribitur, quales sunt suppositorium, clyster, portio, bolus, pulvis, pilulæ.

C A P U T I.

De Suppositoio.

Suppositorium est r medium, quod formâ solidâ, terete, & oblongâ paratum in anum mittitur. Apud antiquos glandis majoris similitudinem referebat, unde balanus cœu glans dicitur.

Duplex est simplex & compositum.

Simplex fit ex radice vel caudice betæ, brassicæ, porri, candelâ cerea oleo inuncta, sapone albo, melle solo ad duritiem cocto. Quorum omnium usus est.

Præsertim pro infantibus & adultis, quibus sufficit vel simplex suppositorium.

Compositum fit ex melle, sale

Cap. I. *De Suppositorio.* 231

gemmeo, communi, trochisc. alhandal. diagridio, sale ammoniaco, nitrio, &c.

Ufus est, 1. ut expultrix pigra stimuletur ad officium. 2. ad revocandos clysteres diu retentos. 3. cum de viribus timemus, & quando parcimus pudori. 4. ad soporosos affectus, in quibus alvus perpetuò irritanda.

Simplex suppositorium fit ex melle despumato & cocto, ut artis est, addendo (si ita videtur) salis parum.

Compositum sic paratur.

℞. Mellis despumati ℥. ij. salis gemmei ʒ. j. β. coque, fiant suppositoria.

Fortius est sequens pro morbis soporosis.

℞. Hieræ picræ, salis gemmei an. ʒ. β. diagrid. gr. iv. mellis q. s. fiant suppositoria.

Vel

℞. Trochisc. alhand. & diagr. an. ʒ. β. salis gemmei ʒ. ss. cum melle despumato fiant suppositoria.

Abstinentum ab acribus, & vel modicè irritantibus in dolore, vel fluxu hæmorrhoidum, & in omni podicis

232 Pars II. *De Evacuantibus.*

ardore : quo tempore potius utendum lenientibus, & consopientibus dolo-rem, addito si opus videatur opio. ut

℥. Mucilag. femin. psyll. & cydon. extractæ in aquæ ros. ℥. ii. ung. popul. ℥. β. vitellum ovi : misce, & excipe bombace, immittatur in anum.

Prodest ani dolori excitato ab inflammatione, vel ab acrium affluxu, ut in dolore hæmorrhoidum. Addi potest opium ad ℥. β. crocus ad gr. iv. si doloris adsit vehementia.

Ad laxatum sphincterem constrin-gendum.

℥. Mastich. ℥. ij. sang. drac. boli arm. pul. ros. rubr. an. ℥. β. mucilag. cydon. extract. in aqua plantag. q. s. fiat forma unguenti ; quo linteam molle & rarum concinnatum in balani figuram in anum inferatur.

Ad ulcus tergendum, prodest mel rosaceum bombace exceptum.

Ad siccandum & consolidandum.

℥. Pul. thuris, mastich. ros. an. ℥. ij. succi plantag. & ovi album. q. s. fiat unguentum.

C A P U T II.

De Clysteribus.

Clyster est liquor quilibet qui per syringam seu clysterium, in intestina per anum effunditur.

Componitur ex multis secundum diversas intentiones, decoctis, aquis, succis, oleis, liquatâ pinguedine, lacte, sero lactis, jusculis, &c. dissolvuntur, quæ scopo satisfaciunt, & non impediunt fluiditatem.

Quantitas liquoris, & eorum quæ dissolvuntur, diversa est, pro ætate, mole corporis, & naturâ affectûs. Pro infantibus, ad ℥. ℥. pro pueris ad ℥. x. adultioribus ad ℥. j. vel ℥. j. ℥. nec ultrâ, quantitas liquoris præscribitur. Minor esse debet, vesica, utero, intestinis, aut renibus affectis; ne hujusmodi partes nimis comprimantur; idcôque non ultra ℥. i. liquoris adhibemus. Dissolvuntur pari ratione opiata, mel, olea, &c. nec ultra ℥. iv. aut vi. præscribi debent. Clysteres debent injici tepidi.

234 Pars II. *De Evacuantibus.*

Tempus opportunum est quælibet hora, dum urget dolor, aut suffocatio; alioquin eligenda hora comoda præsertim matutina; quo tempore natura spontè movere consuevit. Si post pastum; tribus aut quatuor horis à cibo, ne coctio interpellatur. Si post iusculum, unâ aut alterâ horâ. In debilibus præmittendum aliquid cibi. In febribus intermittentibus aut exacerbationibus, intermissionis vel remissionis tempore, aut declinante paroxysmo, nusquam verò circa paroxysmi initium; hunc enim præmaturè citat humoribus exagitatis.

Clyster est simplex, si uni-satisfacit intentioni; compositus si pluribus.

Simplex vel est purgans, vel alterans, vel roborans. Compositus, vel simul alterans & purgans, vel alterans & roborans, &c.

Ufus plurimi sunt.

I. Ad emolliendum & humectandum, dum fæces sunt duræ, in his qui habent alvum adstrictum.

℞. Malvæ utriusque, violar. pæriet. mercurial. betæ, an. M. j. ficuum pingue.

Cap. II. *De Clysteribus.* 235

pingu. paria vj. fursur. macri M. β . semin. lini & foeniculi, an. \mathfrak{z} . β . vel æstate 4. semin. frigid. maj. an. 3. ii. flor. violar. p. ij. fiat decoct. colaturæ ad \mathfrak{lb} . j. vel \mathfrak{lb} . j. β . dissolve mellis violati & olei lilior. an. \mathfrak{z} . ij. salis. \mathfrak{z} . β . fiat clyster injiciatur hora, &c.

2. Ad refrigerandum & humectandum, quo sæpe utimur in febribus continuis audentibus, colliquantibus, æstuo vel inflammatione intestinorum, viscerum, postquam sæpius clysteribus refrigerantibus & purgantibus excrementa exclusimus.

\mathcal{R} . Fol. malv. viol. lact. cich. scariol. bugloss. utriusque, an. M. j. 4. sem. frig. maj. an. 3. iij. prunorum par. iv. hordei integ. flor. viol. nymph. an. p. j. fiat decoct. in aqua fontis, vel in oxycrato: colat. ad \mathfrak{lb} . j. sola injiciatur, vel si etiam laxandi opus sit, dissolve cassiæ \mathfrak{z} . j. β . mellis violati \mathfrak{z} . j. salis prunel. \mathfrak{z} . j. fiat clyster, &c.

Oleum & oleosa non sunt addenda, quia faciliè inflammantur, quod est notandum pro aliis clysteribus, quando usurpantur in febribus, aut intemperie viscerum, & intestinorum calida.

236 Pars II. *De Evacuantibus.*

℞. Seri lactis caprill. ℥. j. mellis violat. & sacch. rubri an. ℥. j. fiat clyster.

In hystericis à causa calida, præmissis clysteribus purgantibus, injicitur ℥. j. oxycrati.

3. Ad refrigerandum, emolliendum & purgandum, in constipationibus alvi, febribus, &c.

℞. Radic. & fol. alth. malv. viol. pariet. cich. lactuc. an. M. j. furfuris macri M. ℥. semin. 4. frig. maj. an. ℥. ij. citra febrem semin. fœnic. ℥. ℥. hordei integ. & flor. viol an. p. j. fiat decoct. Colat. ad ℥. j. ℥. dissolve cathol. opt. ℥. j. mellis mercur. vel violac. ℥. i j. fiat clyster. injiciendus horâ, &c.

In his qui difficilè purgantur, dissolve catholici & diapruni simplicis, vel cassiæ cum saccharo, an. ℥. vi.

In mulieribus obnoxiiis hystericæ passioni detrahe mel, & omnia dulcia, dissolve catholici & diapruni simplicis, an. ℥. vj. vel cathol. ℥. j. ℥.

Quando validiùs irritanda est expultrix, dissolve cathol. & hieræ Gal. simpl. an. ℥. vj. vel ℥. ℥. mellis mercur. ℥. j. ℥.

Cap. II. De Clysteribus. 237

Aliquando decocto incoquimur sen-
næ ʒ. iij. vel ʒ. ss. præscribitur post
herbas, & semina. Cavendum tamen
ne æstuent hypochondria, aut insit
inflammatio, quo tempore etiam cali-
dioribus opiatibus abstinendum.

Non raro etiam extra febrem, vel in
febris pituitosis, utimur opiatibus ca-
lidioribus, dissolvendo catholici &
diaphœnic. vel diaprun. solut. an. ʒ. vj.

Non est utendum oleis, quia suo len-
tore purgantium vim obtundunt.

Pro delicatis acuto sensu tactus præ-
ditis, quibus tormina excitant clysteres
acriusculi; & iis qui ad alvi fluxum
proclives sunt, acria omnia pro his
sunt detrahenda, & parandus clyster
leniens, detergens, & modicè pur-
gans, ut

℞. Fol. alth. malv. viol. cich. lact.
an. M. j furfuris macri M. ss. hordei
integ. & flor. viol. nymph. an. p. j. fiat
decoct. Colat. ad lb. j. dissol. cathol.
pro ore ʒ. ss. vel ʒ. vj. mellis rosar.
ʒ. j. ss. fiat clyster injiciendus, & c.

4. In soporosis affectibus, ad irri-
tandam vim sopitam, & revulsionem
moliendam.

238 Pars II. *De Evacuantibus.*

℞. Fol. alth. mercur. betæ, pariet. hyss. calament. salvi. an. M. j. sem. fœnic. & ameos an. ℥. β. fol. sennæ ℥. j. flor. chamomil. melil. an. p. j. fiat decoct. Colat. ad ℥. j. dissolve cathol. & diaphœn. an. ℥. j. mellis mercurialis ℥. iij. fiat clyster.

Loco sennæ incoqui possunt agaricus & pulpa colocynth. an. ad ℥. ij.

Olea non dissolvuntur, quia ut dictum est, purgantium vim suo lentore infringunt; nec iis unquam utendum, nisi dum emollire, aut lenire intendimus.

Postquam hujusmodi clyster semel injectus est, in ℥. j. decocti præscripti enematis dissolvimus vini emetici turbidi ℥. iv. diaphœnici ℥. j.

§. Ad flatus discutiendos in colicis doloribus, cæterisque affectibus à causa frigida.

℞. Rad. alth. malv. calament. hyss. organ. salvi. an. M. j. sem. fœnic. lini anis. an. ℥. i i j. ficuum ping. paria vj. flor. chamom. melil. an. p. j. fiat decoct. Colat. ad ℥. j. dissolve diaphœn. vel benedictæ laxativæ ℥. j. β. mellis mercurialis ℥. ij. fiat clyster.

Cap. II. De Clysteribus. 239

Vel

℞. Decocti præscripti clysteris
℥.iv. hieræ picræ Gal. ℥.j. vini emetici
turbidi ℥.ij. fiat clyster.

In causa calida & colica biliosa,
utendum enemate leniente, refrigeran-
te, detergente supra præscripto; vel
decocto omasorum, oxycrato, lacte;
prius tamen præmissis, & rejectis cly-
steribus emollientibus, refrigeranti-
bus, & purgantibus; à quibus inci-
piendum, ut fæces primùm evacuentur,
& partes laxentur.

℞. Alth. totius malv. violar. pa-
riet. lact. an. M. j. furfur. macri M.℥.
liquirit. contus. ℥. ℥. passul. purg. par.
vj. hordei integ. & florum chamom.
an. p.j. fiat decoct. Colat. ad ℥.j. dis-
solve cath. & cassiæ an. ℥. vj. mellis
rosat. ℥.j. ℥. vitell. ovi, fiat clyster.

In dolore nephritico.

℞. Rad. alth. & lilior. an. ℥.i. fol.
alth. malvæ, pariet. viol. branchæ ur-
sin. agrimon. an. M. i. sem. lini & fœ-
nug. an. ℥. i. ficuum ping. paria vj.
flor. chamom. melil. an. p. i. fiat decoct.
Colat. ad ℥. i. dissolve cath. & diaph.
an. ℥. i. mellis viol. & olei lilior. an.

L 3

240 Pars II. *De Evacuantibus.*

℥. i. β. fiat clyster. Si febris adsit, aut constitutio gracilis biliosa, & in quavis constitutione à causa calida, loco diaphœnic. dissolve cassiam cum saccharo, lenitivum, vel diaprunum simplex.

In sequentibus clysteribus dissolve catholici ℥. j. terebinth. vitello ovi dissolutæ, & olei scorpion. simpl. an. ℥. j. aliquando etiam vinum emeticum turbid. ad ℥. iv. cum cathol. ℥. j.

In passionibus hystericis.

In causa frigida.

℥. Radic. & fol. alth. malv. pariet. mercur. artem. matric. an. M. j. sem. anis. rutæ, ana ℥. β. flor. chamom. melil. an. p. j. fiat decoct. Colat. ad ℔. i. dissol. cathol. & benedict. laxat. vel diaphœn. an. ℥. i. olei rutacei ℥. i. β. castor. gr. iiii. fiat clyster.

In causa calida.

℥. Radic. & fol. alth. viol. pariet. semperv. lact. an. M. i. artem. M. β. furfuris macri & flor. chamom. an. M. i. fiat decoctio in oxycrato: Colatur. ad ℔. i. dissolve cathol. & diapruni simplicis an. ℥. i. fiat clyster.

Cavendum à melle, lacte, & om-

Cap. II. *De Clysteribus.* 241

nibus dulcibus , ad quæ uterus magis commovetur.

7. Contra vermes , cum vel sine febre in pueris , clysteres parandi lenientes , purgantes , & lumbricos elicientes.

℞. Fol. malv. viol. an. M. ℞. liquir. contus. ℥. ℞. ficuum ping. par. iv. passul. purg. ℥. i. hord. integ. p. i. fiat decoct. Colat. ad ℔. ℞. vel ℥. x. pro ætate, dissolve cathol. ℥. ii. vel iii. mellis rosati ℥. ℞. vitellum ovi , fiat clyster.

Expurgatis excrementis , quantum satis videbitur , utendum clysteribus ex lacte , quo abstinendum cum febris est à putrida illuvie verminosa ; aut instant motus epileptici , quia lac corrumpitur , & vapores acres caput feriunt.

℞. Lactis caprill. ℔. ℞. dissolve mellis ros. ℥. vi. vitellum ovi , fiat clyster.

Pro adultioribus dissolve cath. ℥. ij. vel ℥. iij. mellis ros. ℥. j.

Si adsit alvi fluxus , & febris :

℞. Hordei integ. p. i. liquirit. ℥. ii. passul. purg. ℥. i. rosar. rub. p. i. fiat decoct. Colat. ad ℔. ℞. dissolv. sacch. & mellis rosat. an. ℥. vi. vitell. ovi, fiat clyster.

242 Pars II. *De Evacuantibus*
Vel

℞. Lactis caprill. ℥.β. rosar. rub.
M. β. fiat decoct. Colat. ad ℥.
dissolv. mellis & sacch. ros. an. ℥.
vitell. ovi, fiat clyster.

8. Ad detergendum ; & leniendā
humorum acrimoniam , in diarrhoea
biliosa , dysenteria , cholera.

℞. Hord. integ. p. i. furfur. ma.
M. β. liquirit. & passul. an. ℥. β.
sem. frig. maj. an. ℥. ij. rosar. rub.
p. j. fiat decoct. in aqua fontis, vel se
lactis. Colat. ad ℥. x. dissolv. mel
ros. ℥. i. β. vel mellis ros. & saccha
rubr. an. ℥. j. vitell. ovi, fiat clyster.

Vel

℞. Lactis caprill. ℥. x. mellis ro
& sacchar. rubr. an. ℥. i. vitell. ovi, fi
clyster.

Quando ob febrem timetur corrup
tio lactis , & major refrigerandi ,
detergendi adest intentio.

℞. Seri lactis caprill. ℥. x. vel ℥.
dissolv. sacchar. rubr. & succi plantag.
an. ℥. j. vitell. ovi , fiat clyster.

Vel

℞. Emuls. amygd. dulc. & 4. sem
frig. maj. extract. in aqua hord. ℥. i.

Cap. II. *De Clysteribus.* 243

vel ℥.x. dissolv. mellis ros. ℥. j. vitell.
ovi, fiat clyster.

Ad magis retundendam bilis acrimoniam, dissolyi possunt ℥. ii. mucilag. semin. cydon. & psyllii, extractæ in aqua rosar.

Cum fluxus perseverat, & intestinorum tonus laxatur, vel in hæmorrhoidum & menstruorum profluvio, simul refrigerandum, detergendum, leniendum, & leviter adstringendum, quos scopos implet sequens clyster.

℥. Fol. lact. plantag. portul. bursæ past. an. M. j. hordei integ. & furfur. macri, an. p. i. liquirit. & passul. an. ℥. β. rosar. rubr. p. i. fiat decoct. in aqua fontis, vel in decocto capitis & intestinorum vervecis, vel in lacte chalybeato. Colaturæ ad ℥. x. dissolve mellis ros. & syrup. de rosis siccis, an. ℥. i. vitellum ovi, fiat clyster.

Quando vis retentrix ita debilis est, ut tota quantitas liquoris retineri non possit, idem clyster debet dari per vires, quartâ quâque horâ, quod etiam præstandum quando humor est insigniter acris; aut ulcus multum sordidum.

Aliquando multæ indicationes simul.

L. S.

244 Pars I I. *De Evacuantibus.*

persolvendæ sunt, scilicet refrigerandi, evacuandi, detergendi, & adstringendi, ut in diarrhœâ, dysenteria, fluxu hæmorrhoidum & menstruorum, quando simul excrementa in intestinis copiâ & qualitate peccant.

℞. Folior. cichor. malv. viol. plantag. bursæpast. centinod. an. M. i. liquir. rasæ ʒ. β. passul. paria v i. hordei integ. & ros. rubr. an. p. i. fiat decoct. Colat. ad ℥. i. dissolve cathol. pro ore ʒ. β. mellis ros. ʒ. i. vitell. ovi, fiat clyster.

9. Ad adstringendum in alvi fluxu, dysenteria, menstruorum profluvio, quando humores sufficienter evacuati, & deterfi sunt.

℞. Radic. consol. maj. ʒ. i. fol. plantag. verbasc. equiseti, herniar. centinod. an. M. i. sem. plantag. portul. an. ʒ. iii. balauft. & ros. rubr. an. p. i. fiat decoct. in aqua chalybeat. vel in aqua & lacte chalybeatis. Colaturæ ad ʒ. x. dissolve mellis & sacchari ros. an. ʒ. vi. vitellum ovi, fiat clyster.

Dissolvi possunt secundum varias intentiones syrupus de rosis siccis, & succus plantag. an. ad ʒ. i.

Cap. II. *De Clysteribus.* 245

Mucilago semin. cydon. & psyllii
extracta in aqua rosar. ad ℥.ii.

Conserua rosar. in aqua plantag. dis-
soluta, ad ℥.℞. vel i.

Sevum hircinum dissolutum in succo
plantag. ad ℥. i. quando obducendum
est ulcus.

Interdum dissolvuntur pulveres amy-
li, gummi arabici, mastich. boli arm.
ad ℥.ii. ad eundem finem.

Non raro accidit, ut ratione doloris,
vel debilis redditæ recentericis, clysteres
prædicti non possint diu retineri; ideo
decoctum pro duplici injectione divi-
dendum est, ut quod morâ breviori
perfici non potuit, iteratis vicibus ob-
tineatur.

10. Ad nutriendum & roboran-
dum.

Ufus est 1. quando resolvitur ven-
triculi robur, 2. quando æger cibum
non potest sumere, aut retinere, 3.
quando vires exolutæ roborandæ sunt.

℥. Jusculi ex carnibus parati ℔. ℞.
vel ℥. viij. sacchari ℥. i. ℞. vitellum ovi,
fiat clyster.

Vel

℥. Lactis ℔. ℞. sacchari rosati ℥. i.
vitellum ovi, fiat clyster.

246 Pars II. De Evacuantibus.

Si febris adsit, incoquantur herbæ refrigerantes cum jusculo, ex quo, prædicto modo, fiat clyster.

Pariter parari potest ex hordeato, amygdalato, lacte & melle; ex cremore hordei, jure pulli, &c.

In eorum usu prius debet alvus expurgari à fæcibus, & ab omni illuvie excrementosa, ne eorum mixturâ inficiantur.

Observari debet tempus commodum, quo injiciantur. Aptæ est hora prandii, aut cœnæ, aut dormituriæ ægro, ut melius retineantur, & ob id datur clyster in parva copia, sed sæpius in die.

C A P U T III.

De Potione.

POtio purgans est medicamentum formâ liquidum, compositum ex variorum purgantium decocto, infusione, vel dissolutione, iisque vel solis, vel conjunctis.

Magis convenit purgatio in forma:

Cap. III. *De Potione.* 247

potionis quàm in ulla alia in morbis calidis, obstructionibus, & ubi prompta operatione opus est; quia minùs calefacit, citò penetrat, & purgat.

In hac & omni aliâ purgationis formâ, præparandum corpus apertione viarum: præmittenda quoque humorum præparatio; ad quæ inserviunt clysteres, & alterantia; si qui sint dolores, priùs tollendi: si corpus & humores æstuent, priùs venæ sectione, fomentis, jusculis temperandi, & clysteribus aliquatenùs evacuandi.

Sumpto medicamento levis somnus permittitur, iis qui debili sunt ventriculo, aut ad vomitum proni: non dormiendum cum incipit tempus operationis, nempe post duas horas: corpus quiesci tradendum, ne agitatione incalascet. Post tres horas jusculum semicoctum exhibendum, ne pharmacum benignum cedat in alimentum, aut vehemens nimium calefaciat, & purgando vires exhauriat.

Paratur potio purgans decoctione, infusione, dissolutione; iisque vel solis, ut dictum est, vel conjunctis.

Decoctum fit cum folia sennæ ad

248 Pars II. *De Evacuantibus.*

5. iii. vel 3. ʒ. tamarindi, aut polypodium quercinum ad 3. ʒ. coquuntur in decocto refrigerante, vel pectorali, vel fero lactis, cum correctivo sennæ aniso vel coriandro præparato, ad 3. ʒ.

Infusum paratur, quando senna, rhabarbarum, agaricus cum correctivis simul vel seorsim infunduntur in aliquo liquore. Infusio æstate fit frigide aut repide, hyeme calide.

Liquor in quo fit infusio, vel est aqua simplex, vel decoctum, jusculum refrigerans, vel aquæ stillatitiæ.

Nota, melius esse, si in aqua fontis vel stillatitia fiat infusio, quam in decocto, ex plurimis; quia liquor eorum, quæ incoquantur expressa tenui substantiâ imprægnatur, deinde simplicium purgantium suscipiendæ virtuti in tenui substantiâ sitæ non sufficit. Additur sæpe succus limonum recenter expressus, sal prunellæ, cremor tartari, quando vis purgantium calida est temperanda, & tinctura validius elicienda: acida enim omnia ad tincturam simplicis purgantis eliciendam apta sunt.

Quantitas liquoris est, quæ sufficiat ad 3. vi. vel viii. pro singula dosi.

Cap. III. De Potione. 249

Purgatio sæpius instituitur ex decocto & dissolutione; vel ex infusione, & dissolutione; vel ex decocto, infusione, & dissolutione: quorum exempla in subsequenribus tradentur secundum differentias suprà desumptas ratione humorum, juxta quos, alia est potio cholagoga quæ bili, phlegmagoga quæ pituitæ, melanagoga quæ melancholiæ, hydragoga quæ sero, panchymagoga quæ omnibus humoribus convenit. Quælibet ex his adimpletur iis remediis, quæ ex benignè, vel vehementiùs purgantium catalogo desumuntur.

Nota, rarum esse, unum solum humorem peccare, vel medicamentum unum solum humorem educere, ideòque quando traditur exemplum v. g. simplicis cholagogi, hoc præcipuè destinatur quando peccat bilis in majori copîâ, cæteri humores minùs aut modicè, & quos ob fluiditatem huic medicamento facilè cessuros cognoscimus. Idem dicimus de phlegmagogis & melanagogis, quæ crassiores humores expurgando, tenuiores etiam eliciunt.

Si quis improbet decocta, cæteraque

250 Pars II. *De Evacuantibus.*

pro menſtruo purgantium, hoc ſenſu, quòd hæc & alia quæ immiſcentur, poros aquæ exſaturant, ineptamque reddunt, quæ poſtmodum vim purgantium eliciat: Videat ille num talibus opus ſit ad temperandum partium, humorum, & medicamenti calorem & ſiccitatem. Numquid aliquando in cauſa frigida vel calida agendum pharmaco purgante ſimul & alterante; præterea numquid poteſt aqua uno ſale ad nauſeam ſaturata, deinde alio atque alio diverſæ naturæ imprægnari, ut conſtat experimento ſalis communis, nitri, aluminis, armoniaci. Quidam fingunt poros in aqua diverſæ figuræ, in quibus particulæ ſalium diverſæ naturæ recipiantur; quos tamen fictitios eſſe probat

1. Aqua ipſa, corpus nempe ſibi continuum fluidum, in quo nihil impedit, quin una pars alteri immediatè uniatur.
2. ſi tales pori in aqua ex ſua natura ſint, ſuntne vacui? neutiquam; at ſi pleni ſint, numquid igne, aëre, terrâ, hæc descenderet, ille aſcenderet. Si verò ob aquæ denſitatem irretiantur, non incidunt aquæ pori ex ſua natura.

Cap. III. De Potione. 251

sed per divisionem particularum ipsius ab immixtis particulis inductam.

Expressæ igitur infusione, decocto, aut dissolutione tenues substantiæ diffundunt aquam, & quandoque tantâ copiâ, ut sustineri non possint à mole ipsius, ideoque fundum ex parte petunt, quod in potione purgante, emulsione, musto, cerevisia, succo-
gur limonum, & herbarum videre est; crassiores enim partes à tenuioribus fermentatione sejunctæ præcipitantur.

De Potione Cholagoga.

Sequens potio bilem clementer expurgat, convenit in omni repletione biliosa, tertianis, intermittentibus, continuis, &c.

℞. Sennæ mund. ʒ.ii. semin. anis. ʒ.ß. pulpæ cassiæ recent. extract. ʒ.vi. vel ʒ.i. salis tartari ʒ. ß. infund. & leviter bulliant in aqua cichor. vel in decocto refrig. q.s. Express. dissol. man-
næ ʒ.i. ʒ. x. vel ʒ. i. ß. syrup. flor. persic. ʒ. i. fiat potio, sumenda manè cum regimine vitæ, & aëris, tribus horis ante jusculum.

Vel

252 Pars II. *De Evacuantibus.*

℞. Tamarind. \mathfrak{z} . β . fol. cichor. cum toto M. i. fiat decoct. Colatur. infund. sennæ mund. cum aniso \mathfrak{z} . ii. rhabarbari cum santalo \mathfrak{z} . i. Expressio-
~~n~~ dissolve mannæ \mathfrak{z} . i. β . syrupi ros. solut. compositi \mathfrak{z} . i. fiat potio.

Vel

℞. Fol. cichor. acetos. capill. ven. an. M. i. tamarind. \mathfrak{z} . β . hordei integ. & flor. violar. an. p. i. fiat decoct. Colat. infund. sennæ mund. \mathfrak{z} . iii. anis. \mathfrak{z} β . salis prunell. \mathfrak{z} . i. succi limon. recenter expressi \mathfrak{z} . i. Express. dissolve mannæ \mathfrak{z} . i. \mathfrak{z} . x. vel \mathfrak{z} . i. β . syrupi ros. solut. \mathfrak{z} . i. fiat potio.

Loco mannæ aliqui dissolvunt cassiam; diaprunum simplex, catholicum duplic. ad \mathfrak{z} . vi. sed hujusmodi opiatas delicati abhorrent, quia ab earum dissolutione fit potius sorbitio quam potus; convenientius est si infundantur.

In mulieribus obnoxiiis passionibus hystericis, cavendum à dulcibus, ut infra fusiùs dicetur. Quando aquæ stagnant, & miscentur cum bile in imo ventre, loco syrupi poni potest aqua rovei infusionum rosar. pallidat. ad \mathfrak{z} . i. vel. \mathfrak{z} i. β . imò & ad aquas vali-

Cap. III. De Potione. 253

dius eliciendas, dum abest febris, superaddi possunt pul. radic. jalap. vel resinæ ipsius gr. vi. vel ℥. β. præsertim in illo remedio, quod recipit cassiam.

Æstuantibus visceribus, & æstare, potest fieri infusio in sero lactis, modò sit optimè depuratum.

Potest vehementiùs purgans bilem in tertianis intermittentibus nothis, in ictero, in febribus continuis post declinationem, ne superveniat recidiva, in robustis, non gracilibus, quibus fervent viscera.

℥. Sennæ mund. ℥. iii. anisi ℥. β. cassiæ recenter extractæ ℥. vi. cremoris tartari ℥. i. infunde in decocto cichor. q. s. Express. dissol. diapruni solut. vel elect. de succo rosar. ℥. iii. vel ℥. β. syrup. rosati solut. compos. ℥. i. fiat potio.

. Vel

℥. Fol. cich. agrim. acetos. an. M. i. tamarind. ℥. β. flor. viol. p. i. fiat decoct. Colat. infund. sennæ mund. ℥. iii. anis. ℥. β. rhabarb. cum santal. & salis prunell. an. ℥. i. Express. dissol. cathol. duplic. & elect. de citro, an. ℥. iii. syrup. flor. persic. ℥. i. fiat potio.

De potione Phlegmagaga.

Potio benignè purgans pituitos humores in prima corporis regione stabulantes, in omni repletione pituitosa, febribus, & morbis aliis ab ipso productis.

℞. Fol. agrim. capill. ven. betonica. an. M. ss. summit. absynth. p. i. f. decoct. Colat. q. s. infund. fennæ cum aniso ʒ. iii. rhabarbari cum fantalo ʒ. i. expressioni dissolve catholici duplici ʒ. vi. syrupi rosat. solut. compos. ʒ. i. fiat potio, &c. Superaddi potest in dissolutione pulvis diacarth. ad ʒ. ss. vel dissolve catholici duplici, & electuarii de citro, an. ʒ. i.

Potio pituitam vehementius purgans.

℞. Fol. agrim. capill. ven. pimpin. beton. an. M. i. summit. scord. p. i. f. decoct. Colat. infund. fennæ cum aniso ʒ. iij. agaric. trochisc. radic. mechoac. an. ʒ. i. zinzib. ʒ. i. Express. dissol. elect. diacarth. vel diaphœn. ʒ. iij. vel ʒ. ss. syrup. rosat. solut. compos. ʒ. i. fiat potio, &c.

Cap. III. *De Potione.* 255

Loco diacarth. vel diaphœn. dissolvi possunt diaphœn. & cathol. an. 3.iii.

In Apoplexia & cæteris soporosis affectibus à causa frigida.

℞. Sennæ mund. cum aniso 3. iii. agarici trochiscati, & turbith. gummosi, an. 3.i. cinnam. 3. ss. infund. & leviter quoque in aqua beton. express. dissolve electuar. diacartham. 3. i. fiat potio.

De Potione Melanagoga.

Potio benignè purgans melancholiam in quartanis febribus, morbis hypochondriacis, & omni cacochymia melancholica.

Multiplex est melancholia; quæ producitur ab adusta bile, cæterisque humbris per viam adustionis, purgatur potione ex senna, cassia, manna, syrupò rosato, qualis est, quæ suprâ descripta est in exemplo de bile benignè purganda, vel prisana laxante, ut infrâ; vel sennæ & cassiæ infuso in sero lactis optimè depurato.

℞. Sennæ mundatæ. 3. iii. semin. coriand. præp. 3. ss. cassiæ recenter

256 Pars II. De Evacuantibus

extractæ ʒ.i. salis prunellæ ʒ.i. inf.
in sero lactis optimè depurat. v.
aqua buglossi & cichor. express. ʒ.
vel viii. capiat, &c.

A fæce seu excremento melan-
lico.

℥. Polypod. querc. contus. ʒ.
fol. buglossi. fumar. ceterac, an.
epith. p.i. fiat decoct. Colat. q. l.
fund. sennæ mund. ʒ. iii. anisi.
cremor. tartari succo limon. diss.
ʒ.i. Express. dissolv. catholic du.
ʒ. vi. syrupi de pomis sapor ʒ. i.
potio, &c.

Loco cathol. quando paulò val.
est purgandum, dum ulteriùs incu-
mus præparationi humorum, dis-
possunt cathol. duplicati & elect.
de citro, an. ʒ.iii. vel catholici ʒ.
conf. hamech. ʒ. ii. potest etiam
in infusione, unà cum senna, cass.
ʒ.vi. vel ʒ.i.

Potio vehementiùs purgans me-
choliam fit, si in ultimo decocto
infuso præscripto dissolvatur conse-
hamech, vel electuarium de citro
majori dosi, v. g. ad ʒ.v. vel vi.

De Potione hydragoga.

Potio hydragoga benignè purgans serosos humores, in omni morbo ab iis producto, tum & post potum aquarum mineralium.

℞. Fol. cichor. M. i. tamarind. ℥. ss. fiat decoct. infunde sennæ mund. ℥. i. ss. semin. contra ℥. ss. cassiæ recent. extract. ℥. v. i. Express. dissol. aquæ infus. ros. pall. ℥. i. ss. pulv. radic. jalap. ℥. ss. fiat potio.

In hydrope à causa calida, & in omni repletione serosa.

℞. Rad. brusci ℥. ss. fol. cichor. ebuli, an. M. ss. passul. purgat. par. iv. fiat decoct. Colat. infund. sennæ mund. ℥. iii. coriand. præp. & salis tartari, an. ℥. ss. Express. dissol. mannæ & aquæ infus. rosar. pallid. an. ℥. i. ss. pulv. radic. jalap. ℥. ss. fiat potio.

Vel

℞. Mannæ calabr. ℥. i. ss. dissolv. in ℥. iii. succi radic. ireos nostratis, fiat potio, &c.

Potio hydragoga vehementius serorum evacuans in hydrope, cæterisque

258 Pars II. *De Evacuanti*
morbis ab illuvie serosa , cum v
rum obstructionibus.

℞. Radic. Apii , ireos nostrat
℥. ʒ. fol. agrim. ceterach. an. M
sem. ebuli ʒ. i. passul. purg. par. iv
decoct. Colat. infund. sennæ m
ʒ. iii. anis. ʒ. ss. radic. mechoac.
cinnam. & spiritus tartari , an. ʒ. ʒ.
Express. dissolv. elect. diacarth. ʒ. ʒ.
vel ʒ. ss. aquæ 9. infus. ros. pallid
fiat potio , &c.

*De potione mixtis humoribus
convenienti.*

Quando bilis & pituita simul
cant , quod multoties contingit
febris intermittentibus , comat
gili , lethargo , cæterisque casibus
vel sine febre.

Si prævaleat bilis.

℞. Fol. cichor. agrim. pimpin
M. i. tamarind. ʒ. ss. hordei inte
flor. viol. an. p. i. fiat decoct. C
infund. sennæ mund. ʒ. iii. anis. ʒ.
rhabarb. cum santal. & cremoris
tari , an. ʒ. i. Express. dissolv. ma
ʒ. i. vel ʒ. i. ss. syrup. rosat. solut. com
ʒ. i. fiat potio , &c.

Cap. III. De Potione. 259

Loco mannae dissolvi potest, si paulò validiùs purgandum sit, elect. de citro, vel diaprunum solut. ad 3. iij. vel 3. ss. vel cathol. duplic. & diaprun. solut. an. 3. iij.

Prævalente pituità dissolvi potest elect. diacarth. vel diaphœen. ad 3. ss. vel diacarth. & cathol. dupl. an. 3. ij.

Quando peccat bilis cum melancholia, ut in febribus quartanis, post finem continuarum, humoribus biliosis adustione conversis ex parte in melancholiam; prævalente bile, in prædicto infuso rursus infunde cassiæ recentè extractæ 3. vi. Expressioni dissol. mannae & syrup de pomis labor. an. 3. i.

Loco mannae si crassiores sint humores, vel etiam si prævaleat melancholia, dissolve diaprun. solut. & confect. Hamech, an. 3. ij. vel iij.

Nota, quod si in prædictis, humoribus empyreuma caloris lateat ob adustionem, & præcalida sint viscera, abstinendum sit à calidioribus, & utendum solo infuso ex senna, in forma prius lavantis, vel ex senna & cassia cum sale prunellæ & succo limon.

Quando pituita & melancholia si-

M

260 Pars II. De Evacuantibus.

mul pccant, utrolibet prævalente miscenda sunt, quæ suprà pro quolibet ex iis, descripta sunt.

De potione Panchymagoga ad omnes simul humores excrementitios purgandos.

Si benignè à prima corporis regione sint expurgandi, utendum est aliquo, ex medicamentis purgantibus descriptis cap. de cholagog.

Si à cæteris regionibus sint evacuandi, in robustis corporibus humorum sarcina oppressis.

℞. Fol. cich. capill. ven. agrim. an. M. i. tamarind. ℥. ss. flor. cordial. an. p. i. fiat decoct. Colat. infund. fennæ mundat. cum anis. ℥. ij. rhab. cum sant. ℥. j. cinam. ℥. ss. Express. dissolv. cathol. & diaphœn. an. ℥. iij. syr. ros. solut. comp. ℥. j. fiat potio.

In locum diaphœn. substitui potest diaprun. solut. electuar. de succo ros. diacarth. de citro, ad parem dosim.

De Potionibus peculiaribus.

In alvi fluxu, dysenteria, cholera, &c.

Cap. III. De Potione. 261

Rx. Tamarind. \mathfrak{z} .ss. fol. portul. plantag. an. M. i. ros. rubr. p. i. fiat decoct. Colat. infund. rhab. \mathfrak{z} . i. santal. rubri \mathfrak{d} . ss. myrobal. citrin. oleo amygd. dulc. confric. \mathfrak{z} . i. Express. dissolv. syr. ros. solut. \mathfrak{z} . i. fiat potio.

Si ob copiam materiæ paulò validius sit purgandum, dissolve trypherae persicæ, vel catholici duplic. \mathfrak{z} .ss.

Nota, cum diarrhœa, dysenteria, cæterisque alvi perturbationibus, non raro complicari viscerum discrasias cum obstructionibus: in quo casu nocent nimium adstringentia, idcircoque tunc conjungenda remedia moderatè aperientia, & detergentia cum adstringentibus & roborantibus, & purgans prædictum per intervalla exhibendum: cui addi potest senna ad \mathfrak{z} . i. cremor. tartari ad \mathfrak{z} .ss. si humores crassiores sint, &c.

In morbis pectoralibus, in gravidis, & senibus purgandis.

℞. Fol. cich. capill. ven. pimpin. an. M. i. tamarind. \mathfrak{z} .ss. liquirit. rasæ & contus. \mathfrak{z} . i. hordei integ. & flor. viol. an. p. j. fiat decoct. Colat. infund. sennæ mund. cum anis. \mathfrak{z} . ii. Rhab. cum santal. \mathfrak{z} . i. Express. dissolv. mannæ &

262 Pars II. *De Evacuantibus.*

fyr. flor. persic. an. \mathfrak{z} . i. fiat potio.

Pro hæmoptoicis minuenda est Sennæ quantitas, satis est si præscribatur Sennæ & Rhab. an. \mathfrak{z} . i.

Pro hystericæ passioni obnoxiiis à causa calida, post paroxysmum vel cum remedia ad præcautionem peraguntur.

℥. Tamarind. \mathfrak{z} . ss. fol. cich. M. i. absint. minor. & flor. persicor. an. p. i. fiat decoct. Colat. infund. sennæ mund. \mathfrak{z} . ii. vel \mathfrak{z} . iij. semin. contra \mathfrak{z} . ss. Rhab. cum santalo, & crem. tart. an. \mathfrak{z} . i. Express. dissolv. aquæ novem infus. ros. pallid. \mathfrak{z} . i. fiat potio.

In iis quæ difficilius purgantur dissolvi potest cathol. dupl. ad \mathfrak{z} . ss. vel idem infundi ad \mathfrak{z} . i. & si non adsit caloris empyreuma in corpore robusto & pleno, poni potest diacarthamum, diaphan. vel. diaprun. sol. in dissolut. ad \mathfrak{z} . iij. vel post express. dissolv. cathol. duplic. & elect. de citro, an. \mathfrak{z} . iij. aquæ infus. ros. pall. \mathfrak{z} . i.

Quando humores sunt adusti melancholici, i. purgandi sunt præcedenti præscripto remedio. Deinde quandiu adhibentur alterantia interna & topica,

Cap. III. De Potione. 263

sola ptisana laxans sæpe repetenda.

Potiones purgantes pro infantibus.

Recens natis, ad meconium excrementum expurgandum exhibetur mel rosatum, vel syrupus rosatus solut. simpl. ad \mathfrak{z} . ss. vel \mathfrak{z} . i.

Pro sextimestri, & ultra.

\mathfrak{z} . Senn. mund. \mathfrak{z} . i. sem. contra \mathfrak{d} . i. infunde in aqua cichor. express. \mathfrak{z} . i. dissolve syr. ros. sol. vel de cichoreo compos. \mathfrak{z} . i. fiat potiuncula, sumenda duabus horis post, & ante lactis suctionem.

Pro bimulis.

\mathfrak{z} . Sennæ mund. & Rhabarb. an. \mathfrak{z} j. cinam. \mathfrak{d} . ss. infunde in aqua cichor. express. ad \mathfrak{z} . i. dissolve syr. ros. sol. compos. \mathfrak{z} i. fiat parva potio.

Pro adultioribus & verminosis.

\mathfrak{z} . Sennæ mund. & Rhabarb. an. \mathfrak{z} . i. femin. contra & Sant. citrin. an. \mathfrak{d} . ss. infunde in aqua portul. Express. ad \mathfrak{z} . ij. dissolve syr. ros. solut. compos. vel flor. persic. \mathfrak{z} . j. fiat parva potio.

Additur aliquando, modò non ægro-
tet à vermibus, ad pleniorē purgatio-

264 Pars II. *De Evacuantibus.*
nem Manna ad ʒ. iij. vel ʒ. ss. in dissolutione.

Aliquando in robustis Epilepsiâ vel suffocatione ab humorum copia laborantibus, sic præscribitur.

℞. Sennæ mund. ʒ. i. semin. contra ʒ. ss. infunde in aqua cich. vel beton. Express. ad ʒ. i. vel ʒ. ij. dissolv. vini emet. ʒ. i. syr. flor. pers. ʒ. ss. fiat parva potio.

Loco vini emetici dissolvi potest elect. diacarth. ad ʒ. i. vel ii. pro ætate & robore.

Vide, num in motibus convulsivis adsit inflammatio in cerebro, quod sæpius contingit. Tunc enim post venæsectionem, & cucurbitulas, non validè, sed benignè purgans eligendum, ne commoti humores inflammationem, & motûs epilepticos adaugeant.

De Ptisana laxante, Regia dicta.

Paratur ex Senna cum correct. ad ʒ. ii. vel iij. in uno aut duobus aquæ cyathis, prout una aut duæ doses, in eâdem die sumendæ sunt; manè horâ sextâ, & horâ decimâ intersumpto jus-

Cap. III. *De Potione.* 265

culo horâ octavâ; vel si non repugnet debilitas virium aut ventriculi, sumatur prima dosis horâ quintâ, & altera septimâ, jusculum vero horâ nonâ.

Additur cum Sennâ succus limon. recenter expressus, spiritus vitrioli, sulphuris, cremor vel sal tartari, prout varia est intentio: acidorum quantitas determinatur ad levem aciditatem.

Infusio fit frigidè æstate, calidè hyeme, præcedente seu subsequente levi ebullitione.

Ufus in delicatis, calidis, gracilibus, & quibus placet, aut opus est potius per plures vices, quam uno remedio sarcinam tollere, in morbis quoque à bile, & melancholia adustâ, cum paulatim & sine commotione humores sunt educendi, ad febrium intermittentium tertianarum, continuarum & malignarum reliquias auferendas.

Nota, quòd si absint humores crassi & multi impacti, præsertim cum obstructionibus, ptisana sit Remedium insufficiens, præsertim in principio curationis, ideòque plenius primum purgandus æger, suprâ præscriptis appropriatis.

Deinde majori ex parte sublati moribus, ptisanæ per intervalla titæ ex usu sunt.

Ptisana simplex in prædictis ca. conveniens.

℞. Sennæ mund. ʒ. ij. vel iij. ʒ. ss. infund. in duobus aquæ cyathum cum succo limon. recenter expressam gratam aciditatem (frigidè per noctem, tepidè si hyeme) de expresso cyathum capiat tempore & modo dicto.

Pro una dosi gratissima ptisana paratur.

℞. Sennæ mund. ʒ. ij. coriæ præpar. ʒ. ss. fol. pimpin. minutim. ʒ. i. M. j. Infunde in aqua fontis cum succo limon. recenter expresso ad gratam aciditatem; Expressionis fortis viij. capiat manè.

Vel

℞. Tamarind. ʒ. iij. Sennæ mund. ʒ. ii. vel iij. liquiritiæ contusæ ʒ. i. anisi & cremoris tartari, an. ʒ. ss. Infunde in aqua fontis: expressionis viij. capiat manè.

Quando adest copia bilis simul fundi potest rhab. cum santalo ad ʒ.

Cap. III. De Potione. 267

Ex iisdem fiet ptisana pro duabus dosibus, augendo copiam aquæ, in qua fit infusio.

In progressu tertianarum intermit-
tentium.

℞. Polypod. querc. contus. \mathfrak{z} . ss.
Sennæ mund. \mathfrak{z} . iij. semin. contra \mathfrak{z} . ss.
summit. absinth. minoris, p. i. infund.
in aqua fontis cum succo limon. recen-
ter expresso ad gratam aciditatem tepi-
dè (nisi æstuosior sit aër) expressionis
 \mathfrak{z} . viij. capiat manè, tribus horis ante
iussulum, & sæpe repetatur, interjectis
alterantibus internis & topicis, potest
fieri infusio in sero lactis optimè depu-
rato.

In morbis melancholicis, & calidis
visceribus, superaddi potest fumaria
minutim secta, vel cichoreum ad M. ss.

De potione cum Vino Emetico.

Etsi omne Emeticum vim habeat
purgandi per vomitum, vinum tamen
quod dicitur emeticum, per secessum
evacuat, quando (ut aiunt) cathartico
fortiori, vel amplioris molis immisce-
tur. Vulgò in tincturâ sennæ diluitur;

M s,

268 Pars II. *De Evacuantibus.*

cum qua citat per inferiora plura, quàm per vomitum. Mirum certè! vis fortior sequitur motum debilioris. An quia vis vomitiva antimonii in sulphure volatili, & acri constituta, à tali infuso aliquantò retunditur, unde ex emetico fit purgans per secessum. Notum est Antimonium imminutâ acredine ex vomitivo reddi purgans, & hâc ulterius refrænâtâ ex purgante fieri diaphoreticum; quod etiam de nitro, & plerisque aliis constat. Ignea dissipando subtilia & acria; aquea deliniendo, extrahendo, vel diffundendo: olcosa & Resinosa obtundendo, purgantium *αἶμα* vel *χάρα* vim infringunt, & quandoque immutant. Sed nihil adeò salis purgativi acrimoniam, vimque temperat, aut expugnat, quàm acidum; ex cuius congressu cū salso excitatur fervor & pugna, à qua robur antea validum mitigatur, aut quandoque immutatur. Helleborus, Esula, granum Cnidium aceto præparantur & mitescunt: Antimonium aceto non solum mitius fit, sed & adstringendi vim acquirit: Gutta gummi spiritu vitrioli ex emetico in mitius purgans præcipitatur: Euphorbium

Cap. III. *De Potione.* 269

succo portulacæ Indi demulcent, Quercetanus spiritu vitrioli vexatum in pilulas sudorificas recipit. Gal. lib. de compos. med. secundum genera, metallicorum acrimoniam acetis, vinisque acidis docet esse temperandam. Aded salibus purgantium infensa sunt acida, ut eos vel atterant vel extinguant. Nec aliâ ratione contingit quartanarios & hypochondriacos, dum fermentatur humor terrenus acidus & acris, difficilius expurgari, quàm quia ab acidis effervescentibus vis purgantium infringitur. Neque obstat quòd dum decoquitur stibium, spiritus acidi sulphuris, vitrioli, & similia acida vim illius alioqui exsiccantem & diaphoreticam in effrænem purgativam & vomitivam trahant. Tunc enim nondum satis fuit apertum antimonium, neque sulphur ejus malignum per calcinationem, & detonationem cum sale nitri, majori ex parte dissipatur, ut in croco metallorum, in quo paucum quod superest sulphur à partibus fixis ejusdem salis manet correctum.

Vinum Emeticum componitur ex vitro, vel regulo antimonii, croco

270 Pars II. *De Evacuantibus.*

metallorum, aut magnesia opalina, & vino albo. Modum præparationis docent probatissimi chymici, ad hunc modum.

℥. Antimonii optimi, & salis nitri puri, an. partes æquales: terantur seorsim, & postea exactè misceantur: pone in crucibulo vel mortario æneo, inflamma & sæpe cum spatula ferrea ignita commove, donec non ampliùs inflammetur: sublatis scoriis reliqua materia teratur, & aquâ tepidâ sæpius abluatur. Sic paratum Antimonium dicitur Crocus metallorum, vel Hepar Antimonii, ob colorem hepatis similem.

Optimùm est aliud Antimonium, quod habet laminas longas, admodum lucidas & splendentes.

Inflammatio commodiùs fit, si materiam per vices injicias, primaque vice vel carbone vivo, vel ferro ignito, materiam intendas.

℞. Croci metallorum prædicto modo parati ℥. i. vini albi optimi ℔. i. *ss.* vel ℔. ij. infunde per 24. horas vase bene clauso; postea servetur ad usum.

Uusus ipsius est in apoplexiâ, aliisque soporosis affectibus.

Cap. III. *De Potione.* 271

℞. Sennæ mund. ʒ. iij. anisi ʒ. ss.
bulliant in aqua betonica: Expressioni
ad ʒ. iv. dissolv. vini emetici ʒ. i i. fiat
potio.

Sunt qui præscribuntur ad ʒ. iij. vel
iv. etiam turbidum in robustis, obesis,
& plenis.

Aliquando etiam miscetur dia-
carth. ut

℞. Tincturæ Sennæ ʒ. iv. vini emetici
ʒ. ss. pulv. diacarth. ʒ. i. fiat potio.

Si lentè aut non satis operetur, exhi-
bendus pulvis algarot, seu mercurius
vitæ, de quo infra dum de pulvere
purgante.

In febribus continuis, malignis,
intermittentibus, quando turgens mate-
ria, capiti imminet, phrenitidem, aut
soporem invehit; vel quando fatiscit
natura oppressa ab humorum copia &
prava qualitate, sæpe morti proxima
ab orci faucibus eripitur sequenti re-
medio.

℞. Sennæ mund. cum aniso ʒ. ij.
infunde & leviter coque in aqua fontis
express. ad ʒ. viij. dissolve vini emetici
ʒ. ij. misce, fiat potio.

Vel.

272 Pars II. *De Evacuantibus.*

R. Tamarind. \mathfrak{z} . *ss.* fol. cichor. lact.
oxal. an. M. *ss.* f. decoct. Colatur. in-
funde Sennæ mund. \mathfrak{z} . ii. semin. contra.
 \mathfrak{z} . *ss.* Cassiæ recenter extractæ \mathfrak{z} . i.
Express: dissolve vini emetici \mathfrak{z} . iiij.
vel \mathfrak{z} . *ss.* \mathfrak{z} . vi. vel \mathfrak{z} . i. prout videbitur
necessarium ex copia humorum, con-
stitutione robusta, & majori vel minori
viscerum incendio, tum & ætate.

Prudens sit Medicus in istius reme-
dii usu. Certò jugulat, si inflamma-
tiones partium internæ insignes sint;
tantò magis si adhuc in augmento, &
in eas continetur fluxio: tunc enim
instat necrosis partis inflammatae. Sic si
phrenitis adsit, peripneumonia, aur
alia quævis inflammatio viscerum, ma-
teria poris impacta non cedit, sed magis
effera redditur, & gangrænam molitur:
tunc enim potius alteratibus, & evacuân-
tibus per venæ sectionem, cucurbitulas,
hyruidines, quàm per secessum opus est.
Debet igitur exhiberi materiâ adhuc
existente in motu, & turgente, post-
pluries venam sectam in brachiis, pedi-
bus, ita ut periculum non sit, ne vasa
sanguine & biliosis ichoribus adhuc
plena influant in partes æstuentes:

Cap. III. De Potione. 273

utque, si quædam portio materiæ jam sit impacta, pauca sit, ad cujus resolutionem sufficiat natura ab oppressione hujus præsidii auxilio sublevata. Sapienti igitur maturoque consilio opus est, nec sine causâ abhorrendus abusus talis remedii, cum etiam illius legitimus usus timendus sit.

In hydropæ ascite, anasarca, præsertim à causâ frigidâ, magnam humorum colluviem educit, præscribitur prædicto vel sequenti modo.

℞. Tinctur. Sennæ ℥. iv. mannæ & vini emetici, an. ℥. i. fiat potio.

In præparatione Croci metallorum, cave à vapore sulphureo dum inflammatur, est enim venenatus.

Edulcoratio fit lotionè in aqua, ad partes nitri fixas educendas, idque tæque, quaterque filtrando aquam, & sinendo ut sponte materia exsiccet, suffieienter edulcoratum esse ostenditur, si omnem acrimoniam depositam esse, linguæ admovento reperias.

In merienda dosi croci metallorum proportionaliter ad vitium, non potest error fieri in nimia copia; quia si, v. g. posueris ℥. ij, Croci metallorum in

274. Pars II. *De Evacuantibus.*

vini albi lb. i. vinum non plus ab eo
extrahet, quàm si ℥. i. posueris.

C A P U T I V.

De Bolo purgante.

BOlus. purgans est medicamentum
solidum quidem, sed molle ex sim-
plicibus, vel compositis purgantibus
confectum.

Eo utimur, 1. cùm medicamenta,
quibus ad purgandum uti intendimus,
sunt nimis ingrata, quia crassiorem po-
tum efficiunt, ut Catholicum, Cassia;
aut quia multum amara. 2. Cùm pur-
gare volumus ægros ad movendum
proclives.

Usus plurimi sunt.

1. Ad bilem clementer expurgandam
in affectibus hepatis, renique cali-
dis, tum & in nephritidi & calculo ob-
noxiiis.

℞. Cassiæ recent. extract. ℥. i. rhab-
pulyer. & salis prunel. an. ℥. i. cum sac-
charo fiat bolus, sumendo duabus horis
ante iusculum.

Cap. I V. De Bolo purgante. 275

In Gonorrhœâ addi potest mercurius dulcis ad \mathfrak{z} . i. vel gr. xxv.

2. Ad bilem immixtam crassioribus humoribus expurgandam, in febribus longis, intermittentibus, nephritide &c.

\mathfrak{R} . Cathol. duplic. & diaphœn. an. \mathfrak{z} . v. cremoris tart. \mathfrak{z} . j. cum saccharo fiat bolus.

3. Ad eliciendos serosos humores in affectibus arthriticis, Rheumaticis, venereis.

\mathfrak{L} . Mercurii dulcis, gr. xx. diagridii gran. iiii. pul. rad. Ialap. \mathfrak{z} . β . cassiæ recenter extractæ \mathfrak{z} . β . cum syr. violat. & pauco sacch. fiat bolus.

In hydropo, aliisque affectibus, in quibus exturbanda est aquarum colluvies.

\mathfrak{R} . Gutt. gummi gr. iv. mercurii dulcis gran. x. pulv. jalap. \mathfrak{z} . β . cum conserva ros. fiat bolus, quarto quôque die, per quindecim aut viginti dies sumendus, intersumptis jusculis alteratis radicibus brusci, ireos nostratis, agri-moniæ, ceterach, cichor. &c.

Si non satis purget bolus præscriptus, addenda sunt diagridii gr. iv.

274 Pars II. De Fe

vini albi lb. i.

extrahet

Pars II. De Frigidantibus.

hermodactyl. lb. i. sem. ebuli, rad. jalap.

& mechoac. an. ʒ. ss. cremor. tart. ʒ i.

Gutta gummi gr. xv. pulver. diambrae,

diat. hocl. abb. & semin. fcenicul. an.

ʒ. ss. candi ʒ. i. ss. fiat omnium

pulvis, cujus ʒ. ii. infundantur per

noctem in vini albi ʒ. iv. capiat manè

vinum & pulverem, quinto quòque

die, post præmissa universalia.

Pulvis Cornachini.

℞. Antimonii diaphoretici, gr.

viii. diagridii cum sulphure præpara-

ti, ʒ. ss. cremoris tartari, ʒ. j. fiat

pulvis sumendus cum cochleari pana-

tella.

Augeri potest dosis antimonii, ex

sententiâ authoris, usque ad gr. xv.

diagridii usque ad xx. cremoris tartari

ʒ. ij.

Author hujus pulveris tantum illi

tribuit, ut velit omnibus morbis ab

excrementis productis mirè prodesse,

de quo librum integrum conscripsit.

Ex hoc pulvere & mercurio vitæ

pulvis parari potest ultissimus in hy-

drope, in apoplexia, quando cate-

ra remedia lentè, vel insufficienter ope-

rantur.

Cap. VI. *De Pilulis purg.* 279

R. Mercurii vitæ, gr. iv. diagridii cum sulphuris vapore præparati, ʒ. β. Antimonii diaphoretici, gr viij. cremoris tartari, ʒ. j. fiat pulvis.

Cave, ne viscera sint calida & sicca & humores adusti, potiùs quam pituitosi; tunc enim remedia calida & sicca febrem vel phlogoses, vel inflammationes systrophicas inducerent.

C A P U T VI.

De Pilulis purgantibus.

Componuntur ex variis speciebus simplicium purgantium amaris, acribus, & foetidis; addendo ea, quæ sunt eorum vehicula; ea quoque, quæ promovent actionem, vitium corrigunt, & formam conservant.

Aliæ sunt officinales, quæ in officinis servantur paratæ, ut pilulæ coctiæ, de agarico, arthriticæ, &c.

Aliæ magistrales, quæ à medicis secundùm varias indicationes præscribi solent, quæ usuales nuncupantur, quia eorum usus frequens est. In earum com-

274. Pars II. De F

vini albi lb. i

extrahet

antibus.

Antimonii diaphoretici, gr. viii. diagridii cum sulphure præparati, ʒ. ss. cremoris tartari, ʒ. j. fiat pulvis sumendus cum cochleari panatellæ.
Augeri potest dosis antimonii, ex sententiâ authoris, usque ad gr. xv. diagridii usque ad xx. cremoris tartari ʒ. ij.
Author hujus pulveris tantum illi tribuit, ut velit omnibus morbis ab excrementis productis mirè prodesse, de quo librum integrum conscripsit.
Ex hoc pulvere & mercurio vitæ pulvis parari potest ultissimus in hydrope, in apoplexia, quando cætera remedia lentè, vel insufficienter operantur.

Antimonii diaphoretici, gr. viii. diagridii cum sulphure præparati, ʒ. ss. cremoris tartari, ʒ. j. fiat pulvis sumendus cum cochleari panatellæ.

Augeri potest dosis antimonii, ex sententiâ authoris, usque ad gr. xv. diagridii usque ad xx. cremoris tartari ʒ. ij.

Author hujus pulveris tantum illi tribuit, ut velit omnibus morbis ab excrementis productis mirè prodesse, de quo librum integrum conscripsit.

Ex hoc pulvere & mercurio vitæ pulvis parari potest ultissimus in hydrope, in apoplexia, quando cætera remedia lentè, vel insufficienter operantur.

Cap. VI. *De Pilulis purg.* 279

℞. Mercurii vitæ, gr. iv. diagridii
in sulphuris vapore præparati, ʒ. ʒ.
Antimonii diaphoretici, gr viij. cre-
moris tartari, ʒ. j. fiat pulvis.

Cave, ne viscera sint calida & sicca
& humores adusti, potiùs quam pitui-
tosi; tunc enim remedia calida & sicca
febrem vel phlogoses, vel inflamma-
tiones systrophicas inducerent.

C A P U T VI.

De Pilulis purgantibus.

Componuntur ex variis speciebus
simplicium purgantium amaris,
acribus, & foetidis; addendo ea, quæ
sunt eorum vehicula; ea quoque, quæ
promoveant actionem, vitium corrigunt,
& formam conservant.

Aliæ sunt officinales, quæ in officinis
servantur paratæ, ut pilulæ coctiæ, de
agarico, arthriticæ, &c.

Aliæ magistrales, quæ à medicis
secundùm varias indicationes præscribi
solent, quæ usuales nuncupantur, quia
eorum usus frequens est. In earum com-

274. Pars II. De E^{ss}entibus.

vini albi lb. i.

extrahere

Pars II. De E^{ss}entibus.
gummos.
rad. jalap.
cremor. tart. 3 i.
pulver. diambrae,
& semin. foenicul. an.
candi 3. i. lb. fiat omnium
cujus 3. ii. infundantur per
vinum & pulverem, quinto quôque
die, post præmissa universalia.
Pulvis Cornachini.

℞. Antimonii diaphoretici, gr.
viii. diagridii cum sulphure præpara-
ti, ʒ. lb. cremoris tartari, ʒ. j. fiat
pulvis sumendus cum cochleari pana-
tellæ.

Augeri potest dosis antimonii, ex
sententiâ authoris, usque ad gr. xv.
diagridii usque ad xx. cremoris tartari
ʒ. ij.

Author hujus pulveris tantum illi
tribuit, ut velit omnibus morbis ab
excrementis productis mirè prodesse,
de quo librum integrum conscripsit.

Ex hoc pulvere & mercurio vitæ
pulvis parari potest ultissimus in hy-
drope, in apoplexia, quando cate-
ra remedia lentè, vel insufficienter ope-
rantur.

Cap. VI. *De Pilulis purg.* 279

℞. Mercurii vitæ, gr. iv. diagridii
in sulphuris vapore præparati, ʒ. ʒ.
Antimonii diaphoretici, gr viij. cre-
moris tartari, ʒ. j. fiat pulvis.

Cave, ne viscera sint calida & sicca
& humores adusti, potiùs quam pitui-
tosi; tunc enim remedia calida & sicca
febrem vel phlogoses, vel inflamma-
tiones systrophicas inducerent.

C A P U T VI.

De Pilulis purgantibus.

Componuntur ex variis speciebus
simplicium purgantium amaris,
acribus, & foetidis; addendo ea, quæ
sunt eorum vehicula; ea quoque, quæ
promoveant actionem, vitium corrigunt,
& formam conservant.

Aliæ sunt officinales, quæ in officinis
servantur paratæ, ut pilulæ coctiæ, de
agarico, arthriticæ, &c.

Aliæ magistrales, quæ à medicis
secundùm varias indicationes præscribi
solent, quæ usuales nuncupantur, quia
eorum usus frequens est. In earum com-

274. Pars II. De Elixiribus.

vini albi lb. i.

extrahere

Pars II. De Elixiribus.
Antimonii diaphoretici, gr. viii. diagridii cum sulphure præparati, ʒ. ss. cremoris tartari, ʒ. j. fiat pulvis sumendus cum cochleari panatella.
Augeri potest dosi antimonii, ex sententiâ authoris, usque ad gr. xv. diagridii usque ad xx. cremoris tartari ʒ. ij.
Author hujus pulveris tantum illi tribuit, ut velit omnibus morbis ab excrementis productis mirè prodesse, de quo librum integrum conscripsit.
Ex hoc pulvere & mercurio vitæ pulvis parari potest ultissimus in hydrope, in apoplexia, quando cetera remedia lentè, vel insufficienter operantur.

Antimonii diaphoretici, gr. viii. diagridii cum sulphure præparati, ʒ. ss. cremoris tartari, ʒ. j. fiat pulvis sumendus cum cochleari panatella.

Augeri potest dosi antimonii, ex sententiâ authoris, usque ad gr. xv. diagridii usque ad xx. cremoris tartari ʒ. ij.

Author hujus pulveris tantum illi tribuit, ut velit omnibus morbis ab excrementis productis mirè prodesse, de quo librum integrum conscripsit.

Ex hoc pulvere & mercurio vitæ pulvis parari potest ultissimus in hydrope, in apoplexia, quando cetera remedia lentè, vel insufficienter operantur.

Cap. VI. *De Pilulis purg.* 279

℞. Mercurii vitæ, gr. iv. diagridii
in sulphuris vapore præparati, ʒ. β.
Antimonii diaphoretici, gr viij. cre-
moris tartari, ʒ. j. fiat pulvis.

Cave, ne viscera sint calida & sicca
& humores adusti, potius quam pitui-
tosi; tunc enim remedia calida & sicca
febrem vel phlogoses, vel inflamma-
tiones systrophicas inducerent.

C A P U T V I.

De Pilulis purgantibus.

Componuntur ex variis speciebus
simplicium purgantium amaris,
acribus, & foetidis; addendo ea, quæ
sunt eorum vehicula; ea quoque, quæ
promoveant actionem, vitium corrigunt,
& formam conservant.

Aliæ sunt officinales, quæ in officinis
servantur paratæ, ut pilulæ coccinæ, de
agarico, arthriticæ, &c.

Aliæ magistrales, quæ à medicis
secundum varias indicationes præscribi
solent, quæ usuales nuncupantur, quia
eorum usus frequens est. In earum com-

274 Pars II. De Evacuantibus.

vini albi lb. i. vinum non plus ab eo
 extrahet, quàm si ℥. i. posueris.

C A P U T I V.

De Bolo purgante.

BOlus purgans est medicamentum
 solidum quidem, sed molle ex sim-
 plicibus, vel compositis purgantibus
 confectum.

Eo utimur, 1. cùm medicamenta,
 quibus ad purgandum uti intendimus,
 sunt nimis ingrata, quia crassiorem po-
 tum efficiunt, ut Catholicum, Cassia;
 aut quia multum amara. 2. Cùm pur-
 gare volumus ægros ad movendum
 proclives.

Ufus plurimi sunt.

1. Ad bilem clementer expurgandam
 in affectibus hepatis, renunque cali-
 dis, tum & in nephritidi & calculo ob-
 noxiis.

℞. Cassiæ recent. extract. ℥. i. rhab-
 pulver. & salis prunel. an. ℥. i. cum sac-
 charo fiat bolus, sumendo duabus horis
 ante iusculum.

Cap. I V. De Bolo purgante. 275

In Gonorrhœâ addi potest mercurius dulcis ad ℥. i. vel gr. xxv.

2. Ad bilē immixtam crassioribus humoribus expurgandam, in febribus longis, intermittentibus, nephritide &c.

℞. Cathol. duplic. & diaphœn. an. ʒ. v. cremoris tart. ʒ. j. cum saccharo fiat bolus.

3. Ad eliciendos serosos humores in affectibus arthriticis, Rheumaticis, venereis.

℥. Mercurii dulcis, gr. xx. diagridii gran. iij. pul. rad. Ialap. ℥. β. cassiæ recenter extractæ ʒ. β. cum syr. violat. & pauco sacch. fiat bolus.

In hydropē, aliisque affectibus, in quibus exturbanda est aquarum colluvies.

℞. Gutr. gummi gr. iv. mercurii dulcis gran. x. pulv. jalap. ℥. β. cum conserva ros. fiat bolus, quarto quôque die, per quindecim aut viginti dies sumendus, intersumptis jusculis alteratis radicibus brusci, ireos nostratis, agrimonix, ceterach, cichor. &c.

Si non satis purget bolus præscriptus, addenda sunt diagridii gr. iv.

276 Pars II. De Evacuantibus.

Pro non multum adultis aut senibus
iisdem affectibus laborantibus.

℞. Gutt. gummi gr. ii. mercurii
dulcis gr. xv. pulv. rad. jalap. ʒ. ʒ.
cum pauca conserva ros. fiat bolus; vel
solutus pulvis sumatur cum cochleari pa-
natellæ.

C A P U T V.

De Pulvere purgante.

PULVIS purgans fit ex simplicibus
purgandi vi præditis, gustui gratio-
ribus, additis correctivis & sac-
charo.

Sumitur cum jusculo, vel in alio
liquore appropriato; vel immiscetur
duobus aut tribus cochlearibus pana-
tellæ.

Rarè & cautè iis utendum in visce-
ribus & morbis calidis, quia pur-
gantia in substantiâ sumpta calefaciunt,
funduntque humores & multum ir-
ritant.

Ufus est in morbis chronicis à bile,
vomitu periodico, & propensione in
hydropem.

Cap. V. *De Pulvere purg.* 277

℞. Rhab. pulver. 3. j. crem. tart. 3.
℥ misce, capiat cum juseulo refrige-
rante, quinto quôque die, vel ter in
mense.

In affectibus pituitosis ad curatio-
nem, vel præcautionem post uni-
versalia.

℞. Turbith elect. 3. ℥. crem. tart.
3. j. diagridii 3. ℥. cinam. gr. x.
cum paucis saccharo fiat pulvis: dosis
est 3. j. vel 3. iv.

In affectibus Rheumaticis, arthriti-
cis, venereis.

℞. Pulver. rad. Jalap. 3. ℥. mercurii
dulcis, gr. xiv. diagridii & crem. tart.
an. gr. vi. fiat pulvis, sumendus cum
cochleari panatell.

Ad educendas aquas in hydrope as-
cite.

℞. Gutt. gummi, gr. iv. mercurii dul-
cis, 3. j. pul. rad. jalap. & diagr. an.
vi. fiat pulvis sumendus cum cochleari
panatellæ.

℞. Mercurii vitæ, & Guttæ gummi,
an. gr. iii. pulver. rad. jalap. & diagri-
dii; an. gr. iv. fiat pulvis.

Sequens pulvis hydragogus com-
mendatur pro hydrope.

278 Pars II. *De Evacuantibus.*

℞. Sennæ mund. turbith. gummos.
hermodactyl. sem. ebuli, rad. jalap.
& mechoac. an. ʒ. β. cremor. tart. ʒ i.
Guttæ gummi gr. xv. pulver. diambraë,
diarrhod. abb. & semin. fœnicul. an.
ʒ. β. sacch. candi ʒ. i. β. fiat omnium
pulvis, cujus ʒ. ii. infundantur per
noctem in vini albi ʒ. iv. capiat manè
vinum & pulverem, quinto quôque
die, post præmissa universalia.

Pulvis Cornachini.

℞. Antimonii diaphoretici, gr.
viii. diagridii cum sulphure præpara-
ti, ʒ. β. cremoris tartari, ʒ. j. fiat
pulvis sumendus cum cochleari pana-
tellæ.

Augeri potest dosis antimonii, ex
sententiâ authoris, usque ad gr. xv.
diagridii usque ad xx. cremoris tartari
ʒ. ij.

Author hujus pulveris tantum illi
tribuit, ut velit omnibus morbis ab
excrementis productis mirè prodesse,
de quo librum integrum conscripsit.

Ex hoc pulvere & mercurio vitæ
pulvis parari potest ultissimus in hy-
drope, in apoplexia, quando cate-
ra remedia lentè, vel insufficienter ope-
rantur.

Cap. VI. *De Pilulis purg.* 279

℞. Mercurii vitæ, gr. iv. diagridii cum sulphuris vapore præparati, ʒ. β. Antimonii diaphoretici, gr viij. cremoris tartari, ʒ. j. fiat pulvis.

Cave, ne viscera sint calida & sicca & humores adusti, potiùs quam pituitosi; tunc enim remedia calida & sicca febrem vel phlogoses, vel inflammationes systrophicas inducerent.

C A P U T VI.

De Pilulis purgantibus.

Componuntur ex variis speciebus simplicium purgantium amaris, acris, & fœtidis; addendo ea, quæ sunt eorum vehicula; ea quoque, quæ promovent actionem, vitium corrigunt, & formam conservant.

Aliæ sunt officinales, quæ in officinis servantur paratæ, ut pilulæ coctiæ, de agarico, arthriticæ, &c.

Aliæ magistrales, quæ à medicis secundum varias indicationes præscribi solent, quæ usuales nuncupantur, quia eorum usus frequens est. In earum com-

280. Pars II. *De Evacuantibus.*

positione ea adhibenda sunt, quæ in parva mole efficaciter operantur.

Dosis est ad ʒ. i. vel ʒ. iv.

Pilulæ quæ vehementiùs purgant, sumi debent post primum somnum, horam nempe 2. vel 3. post mediam noctem, quibus superdormire licet, ut calor intrò coactus solidam earum formam faciliùs vincat, & in actum deducat: quæ verò mediocriter operantur, sufficit si sub aurorâ sumantur. A somno abstinendum est, cum incipit evacuatio: aliquando sumuntur immediatè ante levem cœnam, ubi pauciores stomachicæ, aut ad alvum tantùm laxandam destinantur.

Utimur pilulis 1. cum ægri medicamenta formâ liquidâ, aut solida nimis molis respuunt. 2. cum ventriculus pituitosis humoribus scatet. 3. cum à partibus remotis à ventriculo humores attrahere intendimus.

Ufus est in affectibus potissimum frigidis, & hyeme, vel in chronicis: calidis penitus abstinendo æstate; quæcunque enim in parvâ mole in substantia purgant, acria sunt & calidâ.

Ad humores validè è cerebro, aliisque

Cap. VI. *De Pilulis purg.* 281

partibus evacuandos, in repletionē pituitosa, serosa, simplici vel mixta.

℥. Massæ pillul. cocciar. & de agaric. an. ʒ. β. trochisc. alhand. & diagridii, an. gr. iv. olei anisi arte chymicā extracti, gutt. iiij. formentur pilulæ v. devorandæ post primum somnum.

Similiter secundum varios affectus, ex aliis officinalibus pilulæ parantur, ut pro arthriticis ex massa pilular. arthritic. & de hermodactylis: pro morbis frigidis ventriculi, ex stomachicis, de hiera, de aloë: ad bilem purgandam, ex aureis; ad melancholiam, ex foetidis majoribus, de lapide lazuli; ad oculorum morbos ex lucis majoribus; ad diuturnas febres ex aggregativis, quæ idè polychrestæ dicuntur.

Ex plurimis dictar. pilul. fit quandoque massa usualis pro chronicis affectibus, paralyfi, tremore, torpore, convulsione à causa frigida serosa, cum intemperie frigida & humida cerebri.

℥. Massæ pilul. cocciar. & de agaric. an. ʒ. i. ꝑ. de hermodactyl, aggregativ. an. ʒ. ꝑ. gutt. gummi correct. cum spiritus vitrioli, & diagridii, an. ʒ. ꝑ. mercurii dulcis ʒ. i. pulv. diamoschi

282 Pars II. *De-Evacuantibus.*

℞. i. cum syrupo de stœchade fiat massa pilular. Dosis est ad ℞.ii. vel. 3. i. manè summo.

Ad præcautionem hystericae passionis in mulieribus obesæ & frigida.

℞. Massæ pilul. foetid, ℞. ij. trochisc. alhandal, gr. v. castorei, gr. ij. fiant pilulæ v. devorandæ post primum somnum.

Ad serosos humores evacuandos in arthriticis, rheumaticis, venereis, hydropticis affectibus.

℞. Guttæ gummi, aut magist. ipsius, gr. iv. mercurii dulcis ℞. i. diagridii gr. v. cum mucilagine gummi tragacanti, fiant tres, quatuor, aut quinque pilulæ, &c.

Pilulæ antivenereæ in contumaci gonorrhœa, bubone venereo, in luis suspicione, vel curatione.

℞. Massæ pilul. sine quibus, 3. ss. diagridii cum vapore sulphuris parati, gr. iv. mercurii dulcis, gr. xx. fiant pilulæ v.

Quæ simul polychrestæ sunt & antivenereæ.

℞. Massæ pilul. cocciar. 3. ss. mercurii dulcis, gr. xv. præcipitati albi, gr. v. cum aliquot guttis syrapi rosati, fiant iv. aut v. pilulæ..

Pilu

Cap. VI. De Pilulis purg. 283

Pilulæ usuales, angelicæ dictæ.

℥. Succu rosar. pallid. ℥. ij. succorum depurator. bugl. borrag. fumar. & summit. ebuli, an. ℥. ii. Rhab. ℥. β. santali citrini; ℥. β. infunde per iiij. dies express. forti aloës cicotr. in tenuissimum pulverem redactæ ℥. iv. misce & expone ad solem, sæpius cum spatula versando donec perveniat ad consistentiam pilularum: ex tota massa formentur pilulæ, quarum dosis est ad ℥. j. vel ℥. β. semi-horâ ante levam cœnam, semel in septimana, vel ter in mense.

In morbis à materia crassa, mucilaginosâ, tartarea, cum obstructionibus viscerum & infarctu, unde aliquando suffocatio, vertigo, epilepsia, dolor capitis, imbecillitas ventriculi: post universalia remedia, & aquas minerales, eximiè præstant pilulæ hydropicæ sequentes.

℥. Aloës cicotr. succo rosar. terant quater lotæ, ℥. iii. fennæ mund. Rhab. electi, & agaric. trochisc. an. ℥. j. ss. diagridii cum sulphure præpar. & trochisc. alhand. an. ℥. β. salis absynth. & pulv. diarrhod. abb. an. ℥. j. ss.

284 Pars II. *De Evacuantibus.*

cum syr. ros. sol. fiat massa pilul. de qua capiat 3. ss. vel 3. j. manè tribus horis ante juscum, semel in septimana, vel ter in mense.

Cave ab aloë, & à remediis quæ ipsam suscipiunt, pro iis, qui fluxui hæmorrhoidum, & menstruorum obnoxiam habent dispositionem, nam aloë vi pollet venarum orificia aperiente.

Pilulæ pro una dosi ad eundem finem.

℞. Rhab. pulv. & pulv. hieræ picræ, an. 3. ss. cinam. mastich, an. gr. vi. diagridii & salis tartari, an. gr. iv. cum syrupo ros. solut. fiant pilulæ iij. capiat manè hora, &c.

C A P U T VII.

De Purgantibus ex Chymicis.

Describuntur in hoc capite remedia chymica, quæ frequenter in usum sunt, ex quibus vel solis, vel simul cum aliis, secundum varias intentiones, parari potest remedium purgans,

Cap. VII. De Purgant. &c. 285
sub forma pulveris, boli, extracti,
pilul. &c.

Dosis hîc traditur, qualis si per se
quodlibet sumeretur, deinde secun-
dum robur, ætatem, copiam & quali-
tatem humorum determinanda; &
prout pluribus, vel paucioribus aliis
immiscetur purgantibus.

Extractum Sennæ à ʒ. ss. ad ʒ. j.

Extractum Rhabarb. à ʒ. j. ad ʒ. j.

Biliosis, serosis, & melancholicis
humoribus clementer purgandis con-
veniunt.

Tinctura sennæ, vel Rhabarb. ad
cochlear. ij. vel iiij. præscribuntur per
se pro puerulis; vel dissolvuntur in pur-
gantib. supra præscriptis.

Extractum mechoacan. ad ʒ. ss. vel
ʒ. j. serum & melancholiam expur-
gat.

Extractum myrobolan. ad ʒ. ss. vel
ʒ. i. cum medicamento adstringente &
purgante sumitur, vel per se in alui
fluxibus.

Extractum jalap. tum & resina à gr.
vi. ad ʒ. ss. magisterium jalap. ad gr.
x. vel xvij. vis purgans jalap. est in
resina, ideóque vel in substantia, vel

286 Pars I. *De Evacuantibus.*

in extracto , vel in magisterio ; eo potius utendum quàm in infuso vel decocto , quia aquea non solvunt pingua , & resinosa , serum clementer expurgat.

Extractum esulæ ad ʒ. β. vel ʒ. j. idem præstat.

Extractum hellebori nigri ad ʒ. β. vel ʒ. j. purgat serum , & crassos humores , præsertim melancholicos : ut commodius purget , iis immisce quæ per secessum purgando vim ejus vomitoriam infringunt.

Extractum agarici ad ʒ. i. vel ʒ. β. pituitam biléinque educit.

Extractum diacarthami ad ʒ. β. vel ʒ. i. idem præstat.

Trochisci alhandal , à gr. vi. ad x. cum aliis miscentur in bolis , pulveribus , & pilulis.

Euphorbium correctum , seu Extractum euphorbii , ad gr. x. vel xv. serum , pituitam validè expurgat.

Gutta gummi per spiritum vitrioli vel tartari correctum , sic enim perdit vim vomitum excitandi.

Correctio sic fit.

℞. Guttæ gummi, q. s. dissolve cum

Cap. VII. *De Purgant. &c.* 287

spiritu vitrioli, qui deinde per inclinationem abstrahatur, residuum lentè exsiccat: quod si ter fiat, optimè corrigitur. Dosis est à \mathfrak{D} . *ss.* ad \mathfrak{D} . *j.* pro hydropicis, scabiosis, paralyticis, cæterisque affectibus à pituitâ & sero solis, vel cæteris humoribus commixtis. Contingit aliquando non posse exsiccati, quando primâ aut secundâ vice imbibitur acido vitrioli aut sulphuris; tunc aqua immiscenda, hæc enim extrahuntur acida, quibus sublatis tota deinde massa facilè exsiccat.

Extractum, magisterium, resina scammon. ad \mathfrak{D} . *ss.* ad gr. xv.

Scammonium vitriolarum Hartmanni ex Schrodero, à gr. x. ad xx.

Extractum benedictum, à \mathfrak{D} . *ss.* ad \mathfrak{D} . *j.* hæc omnia purgant biliosos, crassos, & mucilaginosos humores.

Extractum catholicum Francofurt. à \mathfrak{D} . *i.* ad \mathfrak{D} . *ii.* purgat blandè omnes simul humores.

Extractum catholicum Sennerti.

Extractum panchymagogum Hartmanni, Crollii, Quercetani, Schroderi, & Glaferi, à \mathfrak{D} . *j.* ad \mathfrak{D} . *ij.*

Extractum hydragogum, à \mathfrak{Z} . *ss.* ad \mathfrak{Z} . *j.*

N 3

288 Pars II. *De Evacuantibus.*

Pulvis panchymagogus Salæ, Quercetani, purgat serofos humores biliosos phlegmaticos sine molestiâ. Dosis est ʒ. ss. ad. ʒ. j.

Pulvis panchymagogus Quercetani.

Prædicta remedia in variis officinis reperiuntur parata; describuntur ab authoribus propriis, & à Scrodero.

Vitrum antimonii correctum purgans datur à gr. iij. ad v.

Præcipitatum rubrum fixum, gr. iij. ad vi.

Turbith minerale à gr. iij. ad v. datur cum pulvere, bolo, pilulis, &c. Prodest rheumaticis, hydropicis, podagræ, lvi venereæ, scabiei, prurigine, febribus malignis.

Præcipitatus mercurius albus, à gr. iv. ad vi. Signum boni præcipitati est, si aurum eo fortiter perfrictum non dealbetur, ut solet ex contactu mercurii. Datur cum pilulis, bolo, pulvere, vel cum ʒ. ss. confect. hamech, in siphylide, & lepra; vel cum sequenti extracto.

℞. Pulpæ colocynthid. ʒ. i. agarici albi, helleb. nigri, jalap. an. ʒ. j. conscinde omnia crasso modo, & in-

Cap. VII. De Purgant. &c. 289

funde cum spiritu vini rectificati ad 3.
v. fiat digestio in cucurbitâ oblonga
per xiv. dies : tunc fiat expressio men-
strui per manicam Hippocr. Colat. im-
misce diagridii 3. β.

Præcipitatus viridis à gr. ij. ad viij.
specificum dicitur esse in gonorrhœâ
virulenta, quam nimiam tollit, non
sufficientem promover, continuando
ipsius usum, donec omnis fluxus se-
datus sit.

Mercurius sublimatus dulcis à ʒ. j.
ad 3. ss. Sânt qui sublimant mercurium
per sex vices, sed toties repetita su-
blimatio vim ipsius purgantem omnino
destruit : sufficit terna sublimatio, imò si
pulum & insipidum binâ sublimatione
reperias, acquiesce.


Mercurius vitæ à gr. iv. ad vi. Dici-
tur etiam pulvis Algarot, & à qui-
busdam aquila alba, vulgò tamen per
aquilam albam intelligitur mercurius
sublimatus.

Quia Mercurius vitæ violenter ope-
ratur per vomitum, Medici de vi vo-
mitiva infringenda solliciti, & de cor-
rigenda violentia, sic parant mercurium
vitæ correctum.

290 Pars II. *De Evacuantibus.*

℥. Mercurium vitæ in phiala igne arenæ fove, donec rubere inceperit, postmodum spiritu vini, sæpiùs ab eo extrahe, sic purgat per alvum commode à gr. iv. ad vi. vel viij.

Quorum omnium præparatio docetur à clarissimis viris Crollio, Sennerto, Schrodero, Glasero, Sylvio, Zuelfero & aliis.



SUBSECTIO II.

CAPUT I.

De Emetico.

EMETICUM seu Vomitorium est medicamentum, quod quæ ventriculo molesta sunt, per os expurgat.

Neque intelligas vim, quam vocabimus specificam, quâ pharminacum emeticum humores sursum abigit, constitutam esse in proprietate quadam, quâ succum peculiarem, vel omnes simul

ad superiora provocet ; id enim præstat sale volatili acri admodum , quo plurimum fibras ventriculi irritat , tonum ipsius conturbat , & cogit ut contractæ simul fibræ à fundo ad superius orificium per viam vicinam & brevem , quod molestat exonerent. Contractionis modum ostendit hirudo sale superjecto. 2. quia humores commovet , dum simul congregiuntur particule heterogeneæ , quarum tenues & magis volatiles sæpe crassioribus immixtæ sursum feruntur ; fitque aliquando simul per secessum evacuatio , dum in tali fermentatione crassiora præcipitantur.

Vomitu promovetur non solum particularis , sed & universalis purgatio : si enim leve est vomitorium , ventriculus ; si mediocre , etiam partes vicinæ ; si vehemens , totum corpus , expurgantur.

Ad triplicem scopum instituitur.

1. Ad evacuationem 2. Ad revulsionem 3. Ad derivationem.

Ufus est in omnibus affectibus , qui à ventriculi & præcordiorum sordibus oriuntur. Prodest inappetentiæ , nau-

N 5

292 Pars II. *De Evacuantibus.*

seæ , ictero , cachexiæ , dolori capitis , vertigini sympathicæ , febribus intermittentibus initio accessionis , ob tunc commotam materiam , ulceribus renum , vesicæ , &c.

Tempus exhibendi commodum est : cum æger nauseat , & ad vomitum impellitur , nec sufficit.

Nota , quòd si sit symptomatica : irritatio ad vomitum ob insignem humorum copiam , æstum , orgasmum , humor non est ad superiora : sed ad inferiora trahendus ; ne major fiat humorum commotio , & febris ; maximè si instet criseos tempus , quo tempore motus naturæ non est perturbandus.

Prodest faciliè vomentibus , gracilibus ; nocet iis qui imbecilli sunt pectore & angusto , obnoxii tussi , phthisi : nocet quoque melancholicis , vertigini , suffusioni idiopathicæ , & hystericiis.

Quæ vomitum excitant , differunt modo operandi ; alia enim id agunt : solâ copiâ , alia molestâ qualitate , alia totius substantiæ vi specificâ : unde aliud est vomitorium leve , aliud mediocre ,

Cap. I. *De Emetico.* 293

aliud vehemens : leve est illud quod vel molliendo , vel laxando ventriculum , præsertim orificium superius , ipsius tonum & firmitatem dissolvit , ut pingua omnia , aqua tepida ; vel suâ mole & pondere vim expultricem stimulat ; vel relaxando & aggravando , ut oleum commune , ad ℥. vi. vel ℥. viij.

℥. Aquæ tepidæ ℥. vi. vel ℥. viij. vel. x. (pro ætate, & ventriculi robore) olei vel butyri ℥. ij. misce : capiat uno haustu , & post horæ quadrantem provocet vomitum , digitis , vel pennâ oleo illitâ in os immissis.

Idem præstat hydromel, aqua hordei tepida, jusculum valde pingue, & similia in magnâ copiâ sumpta.

Vel

℥. Rad. Raphani ℥. i. semin. atriplicis ℥. iij. fol. gentianæ, anethi, an. p. i. fiat decoct. in aqua hordei , vel hydromel. Colatur. ad ℥. viij. vel. x. dissolv. olei comm. ℥. ij. vel iij. fiat vomitorium , &c.

Mediocre vomitorium fit ex iis , quæ mordaci qualitate ventriculum irritant , & humores detergendo , vel incidendo ad excretionem parant , ut

294 Pars II. De Evacuantibus.

℞. Rad. asari ʒ. iij. Agarici albi ʒ. i. sem. urticæ ʒ. ij. flor. genistæ p. i. fiat decoct. in aqua hordei. colat. ad ʒ. viij. vel x. dissol. in causa frigida, oxymellitis scillitici, in calida syrupi aceros. ʒ. ij. fiat vomitorium, &c.

Vehemens componitur ex his quæ molestâ vi ventriculum insigniter conturbant, & subvertunt, ut:

℞. Rad. Helleb. albi ʒ. i. β. liquirit. contus. ʒ. ss. sem. ebuli ʒ. i. ss. cinam. ʒ. i. fiat decoct. in hydreleo; Colat. ʒ. viij. capiat, &c.

Vel.

℞. Vitrioli albi præp. ʒ. ss. dissol. in aqua communi, vel hordei ʒ. viij.

Vel ex chymicis.

℞. Salis vitrioli ʒ. ss. dissolve in aqua, vel jusculo ad ʒ. iij. capiat, &c.

Datur etiam pueris innoxie. Potest augeri dosis in adultis, ad gr. xv. vel ʒ. i.

Vitriolum album vomitivum idem præstat, à ʒ. i. ad ʒ. i. exhibetur cum vino, jusculo, aut alio liquore: leniter operatur & feliciter in febribus, ut & in omni ventriculi sorde, lumbricis, &c.

℞. Vini Emerici ʒ. ij. capiat, &c.

Cap. I. *De Emetico.* 295

per se, vel miscendo cum aqua hordei,
vel jusculo.

Vel

℞. Mercurii vitæ, gr. iv. conserv.
rosar. ʒ. ij. misce, capiat.

Idem præstat Antimonium rubrum
fixum, ad gr. iv.

Flores reguli Antimonii, à gran. iv.
ad vi. oleum seu butyrum Antimonii ad
℥. ss. vel ʒ. j. per se, vel in jusculo,
aut aquâ hordei ad ʒ. ij.

Prodest tertianis chronicis, & quar-
tanis, parato ritè corpore, & initio
accessionis.

Infusum vitri Antimonii cum vino
à ʒ. j. ad ʒ. iv.

Cave; ne imprudenter utaris Anti-
moniacis: nec nisi in contumacibus af-
fectibus, quibus convenit, & naturis
admodum robustis.

Priusquàm præscribatur, præcedere
debent vacuantia & alterantia, quantum
sufficit, ad imminuendam humorum
copiam, & reddendos humores fluidos;
tum etiam ne crassiores, qui per seces-
sum expurgari exigunt, ad superiora cum
dysphoriâ impellantur.

CAPUT II.

De Diureticis.

Diuretica sunt, quæ aquosos humores per urinas, vi peculiari expurgant.

Partes, quibus expurgandis conveniunt, sunt gibbæ hepatis, renes, uterus, vesica, vasorumque genus omne.

Diuretica alia propriè, alia impropriè dicuntur. Propriè vocantur, quæ calida & sicca in tertio gradu, cum sint tenuis substantiæ, in vasa facillè penetrant, humores liquant, & sanguinem fundunt; sicque serum separant; quo fit ut facillè deinde renes præterfluat, & cum urinis excernatur.

Impropriè dicuntur diuretica quæ levi quâ pollent vi aperiendi, attenuandi & detergendi, urinas simpliciter movent, ex Galen. cap. 4. & 5. simpl. suntque moderatè frigida, vel leviter calida.

Uusus moderatè refrigerantium est, in febribus continuis, intermittentibus,

obstructionibus viscerum, & vasorum, cum intemperie calida, morbis hypochondriacis, cæterisque melancholicis affectibus, renum quoque, vesicæ, uteri &c.

Si chymiam consideramus, inest iis quæ vere diuretica sunt, sal volatilis, aut acidum volatile, quo serum sanguini aliisque humoribus immixtum, & à partibus crassis irretitum, dissolvunt: eo penitus modo, quo lac fervidum in serum solvi deprehendimus liquore acido superaffuso. Neque solum serum sejungitur, sed & partes sanguinis excrementitiæ salinæ, crassæ, terrestres & fæculentiæ, quæ simul cum sero convehuntur. Constat ea urinas citare, quæ sale atque etiam acido volatili abundant, ex acidulis mineralibus, spiritibus, tincturis, & salibus tartari, theribintinæ, nitri armoniaci, &c. seu proximè agant in sanguinem dissolvendo, seu etiam restituant, augeant & exaltent fermentum acidum & lixiviale renibus inhospitans, quo serum à sanguine solvitur, & præcipitatur per tubulos in pelvim.

Quæcunque laxant renum substan-

298 Pars II. *De Evacuantibus.*

tantiam, meatus Lymphaticos, & Bellini ductus patentiores reddunt, urinas sollicitant: ac proinde diuretica, quamvis minùs propriè, dici debent; miscendâque sunt propriè diureticis, ut simul sanguis lique scat in serum, & ductus, quibus excipiat, patuli existant. Quod in diabete, diathesi nempe contrariâ, contrario modo fit, cui refrigerantia, incrassantia, & modicè adstringentia conveniunt, ut laxiorem sanguinis, & partium urinæ dicatorum compagem, in debitum tonum reducamus.

Prædictis affectibus competunt diuretica magis temperata, de quibus vide caput de emulsione, decocto, jusculis aperientibus temperatis, & de nephriticis: in quibus dissolvi possunt ex chymicis, ea quæ dictis in locis descripta sunt, inter quæ sequentia sunt magis appropriata.

Spiritus salis, vel Vitrioli, vel sulphuris, ad gutt. x.

Cremor tartari chalybeatus, ad ʒ. ʒ.

Spiritus tartari, à ʒ. i. ad ʒ. ij.

Spiritus tartari vitriolatus, ad ʒ. ʒ.

Tinctura ceu acidum tartari, ad ʒ. ʒ.

Tinctur a salis nitri, ad ʒ. i.

Cap. II. *De Diureticis.* 299

CrySTALLISALIS nitri, ad ℥. i.

Spiritus urinosus salis armoniaci, ad gutt. viij. vel x.

Spiritus vitrioli dulcis, ad ℥. ij.

Spiritus Therebintinæ, ad gutt. vj. viij. Vel x.

Sal stipitum fabarum, succini, Therebintinæ, scorpionum, ad gr. vj. vel ℥. β.

Quorum pleraque licet sint calida, attamen per accidens refrigerant, quia materiam calidam educunt, & frigidorum aperientium sunt vehicula.

Accedunt aquæ minerales, nitrosæ, vitriolatae, chalybeatae, quarum usus post universalia evacuantia & alterantia sufficienter adhibita, mira præstat ad calidas viscerum dyscrasias corrigendas, referandas obstructions, & humores crassos viscidos attenuandos, detergendos, & per urinas evacuandos.

Diuretica calida conveniunt morbis à causa frigida productis.

Componuntur in forma decocti, ut suprâ capite de nephriticis aperientibus, addendo aliquod ex chymicis, quæ eodem in loco descripta sunt.

In forma julepi, quando in promptu parari debet in urinæ suppressionibus,

300 Pars II. *De Evacuantibus.*

modò non proveniat ab inflammatione.

℞. Aquar. gramæ cæref. ana ℥. iij. spirit. salis nitri ℥. ss. salis succini, gr. v. syrupi capill. vener. ℥. j. f. julep.

Prodest calculosis, nephritidi à crassis humoribus, suppressioni urinæ ab iisdem causis &c.

Vel

℞. Aquarum stipitis fabar. & flor. malvæ, ana ℥. ij. ss. spir. Therebinth. gutt. iij. vel spirit. volatilis salis armoniaci, gutt. x. f. julep. In defectu hujusmodi aquarum adhiberi potest aqua, vel decoct. malv. pariet. graminis, &c.

Abstinendum à diureticis in tabidis macie confectis, instrumentis urinæ exulceratis, aut inflammatis; pudendis, utero affectis, repletâ vesicâ, viarum obstructione, dum multa est adhuc materia, aut scatent sordibus ventriculus, & intestina; ne penitiùs in partes obstructas humores à diureticis fusi ducantur, & obstructiones augeant, ideòque priùs ritè corpus purgantibus & alterantibus præparandum.

CAPUT III.

De Diaphoreticis.

Magna certè est vis transpirationis ad vitæ tutelam, quam statico trutinio diligens Sanctorius deprehendit pleniorẽ esse omnibus aliis evacuationibus sensibilibus simul sumptis. Quod si tantum potest, ut per poros partium & arterias, insignem copiam volatilium crassarumque sordium in totius habitum transferat, susceptumque sanguinem, unà cum transumpto aëre, in circulationis opus & refrigerium per venas referat ad interiora; quantum ab *ἀσθμα* timendum est, quæ calidos halitus in vasis coërcens, & flabellum aëris impediens, tam sæpe fervorem atque putredinem in humoribus producit; neque ulla ferè sit febris, quæ desæviat aut penitus cesset sine sudore atque liberâ *ἡσυχία*.

Neque mirum, cum ea quæ per diaphoresin seu sponte naturæ, seu artis beneficio fit. evacuatio, non solum

302 Pars II. *De Evacuantibus.*

proximè ab habitu corporis , sed & à vasis & visceribus , necnon ab intima corporis regione quodcunque acidum volatile , cæterasque res solubiles humorum particulas per vasa pneumatica, ipsaque interiorum partium & cutis spiracula , in aquæ aut vaporis formâ, dissolvat.

Medicamenta quæ id promovent dicuntur diaphoretica , quorum *Surdus* & modum agendi ex eo deprehendimus , quod faciliè transpirent sudéntque , quibus sanguis tenuis , solutus, serosus , promptè circulans , porique totius habitûs aperti sunt , quales sunt sanguinei , biliosi , præsertim ætate. Sic quæ diaphoretica sunt , debent polere vi attenuandi, fundendi , & proinde majorem in sanguine fermentationem & circulationem excitandi, partésque humorum volatiles segregatas rapiendi in cutis spiracula , quæ rarefaciendo aperiunt : ideóque.

Diaphoretica sunt medicamenta, quæ cutis poros referant , humores à centro ad circumferentiam evocant , & insensibiliter vel sensibiliter expurgant.

Quæ sensibiliter movent sudores

Cap. III. *De Diaphoret.* 303

vocantur hidrotica, seu sudorifica : de quibus suprà cap. 12. §. 2. part. 1.

Quæ insensibiliter id agunt, dicuntur Diaphoretica simpliciter, quæ naturam sudores molientem, aut in eos, pronam adjuvant, vel poros aperiendo, subtiles humorum partes excludunt : quorum

Ufus est.

1. In Febris malignis, pestilentibus, variolis, morbillis, cæterisque, in quibus promovenda diaphoresis, maxime si natura huc moveat, per exanthemata, sudores, &c. quorum exempla tradita sunt in forma julepi, Emulsionis, cap. 1. & 2. §. 1æ. partis 1æ.

In forma decocti cap. 4. §. Secundæ part. Primæ de cardiacis in causa calida.

2. In omnibus febris, & aliis casibus in quibus adest cutis obstructio, vel difflandi sunt humores à centro ad circumferentiam, diebus criticis, dum videmus naturam ad sudores paratam; vel ad ipsam juvandam, dum languide eos movet.


℞. Aq. cardui bened. scabios. papav. rhœad. an. q. s. salis cardui bened. vel

306 Pars II. *De Evacuantibus.*

termittentibus, incipiente aut declinante paroxysmo; quo tempore materia mobilis est; in principio quidem invita contrario motu è foco expellitur; in fine verò, quò sponte vergit, ultrò fugatur.

5. Cavendum est, ne nimius sit diaphoreticorum usus, quando nimia est sanguinis tenuitas, putredo, & dissolutio: quod sæpe contingit in febribus malignis, purpuratis, variolis, affectibus scorbuticis & similibus. Tunc enim diaphoretica, sanguinem fundendo, ulteriùs volatilifant, & corrumpunt. Quin potiùs tunc utendum leviter detergentibus, refrigerantibus, iisque quæ alkalibus abundant. Non alià forsan ratione antiqui præscribebant pulveres, potiones, confectiones cardiacas, quæ terram sigillatam, bolum armenicum, corallia, gummata, & similia recipiunt, quibus imbibuntur acida, tenuia incrassantur, & nimia impeditur fermentatio.

SECTION



S E C T I O II.

De Evacuantibus particularibus.

POST evacuationes universales, instituenda est purgatio particularis, quæ respicit determinatam partem, à qua excludere humores copiâ vel qualitate peccantes est opus. Cerebrum expurgatur per nares, quod præstant sternutatoria, errhina; vel per palatum, quod præstant masticatorium, gargarisina: pulmo & thorax per bechica: ventriculus per vomitoria: gibba hepatis per diuretica: intestina & cava hepatis expurgantibus per secesum, de quibus omnibus supra diximus: renes autem & vesica per injectiones, uterus etiam per pessaria.

CAPUT II.

De Diureticis.

Diuretica sunt, quæ aquosos humores per urinas, vi peculiari expurgant.

Partes, quibus expurgandis conveniunt, sunt gibbæ hepatis, renes, uterus, vesica, vasorumque genus omne.

Diuretica alia propriè, alia impropriè dicuntur. Propriè vocantur, quæ calida & sicca in tertio gradu, cum sint tenuis substantiæ, in vasa faciliè penetrant, humores liquant, & sanguinem fundunt; sicque serum separant; quo fit ut faciliè deinde renes præterfluat, & cum urinis excernatur.

Impropriè dicuntur diuretica quæ levi quâ pollent vi aperiendi, attenuandi & detergendi, urinas simpliciter movent, ex Galen. cap. 4. & 5. simpl. suntque moderatè frigida, vel leviter calida.

Usus moderatè refrigerantium est, in febribus continuis, intermittentibus,

Cap. II. *De Diureticis.* 297

obstructionibus viscerum, & vasorum, cum intemperie calida, morbis hypochondriacis, cæterisque melancholicis affectibus, renum quoque, vesicæ, uteri &c.

Si chymiam consulimus, inest iis quæ vere diuretica sunt, sal volatilis, aut acidum volatile, quo serum sanguini aliisque humoribus immixtum, & à partibus crassis irretitum, dissolvunt: eo penitus modo, quo lac fervidum in serum solvi deprehendimus liquore acido superaffuso. Neque solum serum sejungitur, sed & partes sanguinis excrementitiæ salinæ, crassæ, terrestres & fæculentiæ, quæ simul cum sero convehuntur. Constat ea urinas citare, quæ sale atque etiam acido volatili abundant, ex acidulis mineralibus, spiritibus, tincturis, & salibus tartari, therebintinæ, nitri armoniaci, &c. seu proximè agant in sanguinem dissolvendo, seu etiam restituant, augeant & exaltent fermentum acidum & lixiviale renibus inhospitans, quo serum à sanguine solvitur, & præcipitatur per tubulos in pelvim.

Quæcunque laxant renum substan-

298 Pars II. De Evacuantibus.

tantiam, meatus Lymphaticos, & Bellini ductus patentiores reddunt, urinas sollicitant: ac proinde diuretica, quamvis minus propriè, dici debent; miscendaque sunt propriè diureticis, ut simul sanguis lique scat in serum, & ductus, quibus excipitur, patuli existant. Quod in diabete, diathesi nempe contraria, contrario modo fit, cui refrigerantia, incrassantia, & modicè adstringentia conveniunt, ut laxiorem sanguinis, & partium urinæ dicatorum compagem, in debitum tonum reducamus.

Predictis affectibus competunt diuretica magis temperata, de quibus vide caput de emulsione, decocto, jusculis aperientibus temperatis, & de nephriticis: in quibus dissolvi possunt ex chymicis, ea quæ dictis in locis descripta sunt, inter quæ sequentia sunt magis appropriata.

Spiritus salis, vel Vitrioli, vel sulphuris, ad gutt. x.

Cremor tartari chalybeatus, ad ʒ. ʒ.

Spiritus tartari, à ʒ. i. ad ʒ. ij.

Spiritus tartari vitriolatus, ad ʒ. ʒ.

Tinctura ceu acidum tartari, ad ʒ. ʒ.

Tinctur a salis nitri, ad ʒ. i.

CAP. II. De Diureticis. 299

Cryſtalli ſalis nitri, ad ʒ. i.

Spiritus urinoſus ſalis armoniaci, ad
gutt. viij. vel x.

Spiritus vitrioli dulcis, ad ʒ. ij.

Spiritus Therebintinæ, ad gutt. vj.
viij. Vel x.

Sal ſtipitum fabarum, ſuccini, The-
rebintinæ, ſcorpionum, ad gr. vj. vel ʒ. ʒ.

Quorum pleraque licet ſint calida,
attamen per acciðens refrigerant, quia
materiã calidã educunt, & frigido-
rum aperientium ſunt vehicula.

Accedunt aquæ minerales, nitroſæ,
vitriolatae, chalybeatae, quarum uſus
poſt uniuerſalia evacuantia & alterantia
ſufficienter adhibita, mira præſtat ad
calidas viſcerum dyſtraſias corrigendas,
referandas obſtructiones, & humores
cratſos viſcidos attenuandos, detergen-
dos, & per urinas evacuandos.

Diuretica calida conveniunt morbis
à cauſa frigida productis.

Componuntur in forma decocti, ut
ſuprà capite de nephriticis aperienti-
bus, addendo aliquod ex chymicis,
quæ eodem in loco deſcripta ſunt.

In forma julepi, quando in promptu
parari debet in urinæ ſuppreſſionibus,

300 Pars II. *De Evacuantibus.*

modò non proveniat ab inflammatione.

℥. Aquar. gramæ cæref. ana ℥. iij. spirit. salis nitri ℥. β. salis succini, gr. v. syrupi capill. vener. ℥. j. f. julep.

Prodest calculosis, nephritidi à crassis humoribus, suppressioni urinæ ab iisdem causis &c.

Vel

℥. Aquarum spiritus fabar. & flor. malvæ, ana ℥. ij. β. spir. Therebinth. gutt. iij. vel spirit. volatilis salis armoniaci, gutt. x. f. julep. In defectu hujusmodi aquarum adhiberi potest aqua, vel decoct. malv. pariet. graminis, &c.

Abstinendum à diureticis in tabidis macie confectis, instrumentis urinæ exulceratis, aut inflammatis; pudendis, utero affectis, repletâ vesicâ, viarum obstructione, dum multa est adhuc materia, aut scatent sordibus ventriculus, & intestina; ne penitus in partes obstructas humores à diureticis fusi ducantur, & obstructiones augeant, idèdque priùs ritè corpus purgantibus & alterantibus præparandum.

CAPUT III.

De Diaphoreticis.

Magna certè est vis transpirationis ad vitæ tutelam, quam statico trutinio diligens Sanctorius deprehendit pleniorẽ esse omnibus aliis evacuationibus sensibilibus simul sumptis. Quod si tantum potest, ut per poros partium & arterias, insignem copiam volatilium crassarumque sordium in totius habitum transferat, susceptumque sanguinem, unà cum transumpto aëre, in circulationis opus & refrigerium per venas referat ad interiora; quantum ab *ἀσθῆνεια* timendum est, quæ calidos halitus in vasis coërcens, & flabellum aëris impediens, tam sæpe fervorem atque putredinem in humoribus producit; neque ulla ferè sit febris, quæ desæviat aut penitus cesset sine sudore atque liberâ *ἑρπύλλῃ*.

Neque mirum, cum ea quæ per diaphoresin seu sponte naturæ, seu artis beneficio fit. evacuatio, non solum

302 Pars II. *De Evacuantibus.*

proximè ab habitu corporis , sed & à vasis & visceribus , necnon ab intima corporis regione quodcunque acidum volatile , cæterasque resolubiles humorum particulas per vasa pneumatica, ipsaque interiorum partium & cutis spiracula , in aquæ aut vaporis formâ, dissolvat.

Medicamenta quæ id promovent dicuntur diaphoretica , quorum *Surdus* & modum agendi ex eo deprehendimus , quod faciliè transpirent sudéntque , quibus sanguis tenuis , solutus, serosus , promptè circulans , porique totius habitûs aperti sunt , quales sunt sanguinei , biliosi , præsertim æstate. Sic quæ diaphoretica sunt , debent polere vi attenuandi, fundendi , & proinde majorem in sanguine fermentationem & circulationem excitandi, partesque humorum volatiles segregatas rapiendi in cutis spiracula , quæ rarefaciendo aperiunt : ideóque.

Diaphoretica sunt medicamenta, quæ cutis poros referant , humores à centro ad circumferentiam evocant , & insensibiliter vel sensibiliter expurgant.

Quæ sensibiliter movent sudores

Cap. III. *De Diaphoret.* 303

vocantur hidrotica, seu sudorifica : de quibus suprà cap. 12. §. 2. part. 1.

Quæ insensibiliter id agunt, dicuntur Diaphoretica simpliciter, quæ naturam sudores molientem, aut in eos, pronam adjuvant, vel poros aperiendo, subtiles humorum partes excludunt : quorum

Usus est.

1. In Febribus malignis, pestilentibus, variolis, morbillis, cæterisque, in quibus promovenda diaphoresis, maxime si natura huc moveat, per exanthemata, sudores, &c. quorum exempla tradita sunt in forma julepi, Emulsionis, cap. 1. & 2. §. 1æ. partis 1æ.


In forma decocti cap. 4. §. Secundæ part. Primæ de cardiacis in causa calida.

2. In omnibus febribus, & aliis casibus in quibus adest cutis obstructio, vel difflandi sunt humores à centro ad circumferentiam, diebus criticis, dum videmus naturam ad sudores paratam; vel ad ipsam juvandam, dum languidè eos movet.

℞. Aq. cardui bened. scabios. papav. rhœad. an. q. s. salis cardui bened. vel

termittentibus, incipiente aut declinante paroxysmo; quo tempore materia mobilis est; in principio quidem invita contrario motu è foco expellitur; in fine verò, quò sponte vergit, ultrò fugatur.

5. Cavendum est, ne nimius sit diaphoreticorum usus, quando nimia est sanguinis tenuitas, putredo, & dissolutio: quod sæpe contingit in febribus malignis, purpuratis, variolis, affectibus scorbuticis & similibus. Tunc enim diaphoretica, sanguinem fundendo, ulteriùs volatilifant, & corrumpunt. Quin potiùs tunc utendum leviter detergentibus, refrigerantibus, iisque quæ alkalibus abundant. Non aliâ forsan ratione antiqui præscribebant pulveres, potiones, confectiões cardiacas, quæ terram sigillatam, bolum armenicum, corallia, gummata, & similia recipiunt, quibus imbibuntur acida, tenuia incrassantur; & nimia impeditur fermentatio.



S E C T I O II.

De Evacuantibus particularibus.

POST evacuationes universales, instituenda est purgatio particularis, quæ respicit determinatam partem, à qua excludere humores copiâ vel qualitate peccantes est opus. Cerebrum expurgatur per nares, quod præstant sternutatoria, errhina; vel per palatum, quod præstant masticatorium, gargarisina: pulmo & thorax per bechica: ventriculus per vomitoria: gibba hepatis per diuretica: intestina & cava hepatis expurgantibus per secessum, de quibus omnibus supra diximus: renes autem & vesica per injectiones, uterus etiam per pessaria.

CAPUT II.

De Diureticis.

Diuretica sunt, quæ aquosos humores per urinas, vi peculiari expurgant.

Partes, quibus expurgandis conveniunt, sunt gibbæ hepatis, renes, uterus, vesica, valorumque genus omne.

Diuretica alia propriè, alia impropriè dicuntur. Propriè vocantur, quæ calida & sicca in tertio gradu, cum sint tenuis substantiæ, in vasa faciliè penetrant, humores liquant, & sanguinem fundunt; sicque serum separant; quo fit ut faciliè deinde renes præterfluat, & cum urinis excernatur.

Impropriè dicuntur diuretica quæ levi quâ pollent vi aperiendi, attenuandi & detergendi, urinas simpliciter movent, ex Galen. cap. 4. & 5. simpl. suntque moderatè frigida, vel leviter calida.

Ufus moderatè refrigerantium est, in febribus continuis, intermittentibus,

obstructionibus viscerum, & vasorum, cum intemperie calida, morbis hypochondriacis, cæterisque melancholicis affectibus, renum quoque, vesicæ, uteri &c.

Si chymiam consulimus, inest iis quæ vere diuretica sunt, sal volatilis, aut acidum volatile, quo serum sanguini aliisque humoribus immixtum, & à partibus crassis irretitum, dissolvunt: eo penitus modo, quo lac fervidum in serum solvi deprehendimus liquore acido superaffuso. Neque solum serum sejungitur, sed & partes sanguinis excrementitiæ salinæ, crassæ, terrestres & fæculentæ, quæ simul cum sero convehuntur. Constat ea urinas citare, quæ sale atque etiam acido volatili abundant, ex acidulis mineralibus, spiritibus, tincturis, & salibus tartari, therebintinæ, nitri armoniaci, &c. seu proximè agant in sanguinem dissolvendo, seu etiam restituant, augeant & exaltent fermentum acidum & lixiviale renibus inhospitans, quo serum à sanguine solvitur, & præcipitatur per tubulos in pelvim.

Quæcunque laxant renum substans-

298 Pars II. De Evacuantibus.

tantiam, meatus Lymphaticos, & Bellini ductus patentiores reddunt, urinas sollicitant: ac proinde diuretica, quamvis minùs propriè, dici debent; miscendâque sunt propriè diureticis, ut simul sanguis lique scat in serum, & ductus, quibus excipiat, patuli existant. Quod in diabete, diathesi nempe contrariâ, contrario modo fit, cui refrigerantia, incrassantia, & modicè adstringentia conveniunt, ut laxiorem sanguinis, & partium urinæ dicatorum compagem, in debitum tonum reducamus.

Prædictis affectibus competunt diuretica magis temperata, de quibus vide caput de emulsione, decocto, jusculis aperientibus temperatis, & de nephriticis: in quibus dissolvi possunt ex chymicis, ea quæ dictis in locis descripta sunt, inter quæ sequentia sunt magis appropriata.

Spiritus salis, vel Vitrioli, vel sulphuris, ad gutt. x.

Cremor tartari chalybeatus, ad ʒ. ʒ.

Spiritus tartari, à ʒ. i. ad ʒ. ij.

Spiritus tartari vitriolatus, ad ʒ. ʒ.

Tinctura ceu acidum tartari, ad ʒ. ʒ.

Tinctura a salis nitri, ad ʒ. i.

CAP. II. De Diureticis. 299

Cryſtalliſalis nitri, ad ℥. i.

Spiritus urinoſus ſalis armoniaci, ad gutt. viij. vel x.

Spiritus vitrioli dulcis, ad ℥. ij.

Spiritus Therebintinæ, ad gutt. vj. viij. Vel x.

Sal ſtipitum fabarum, ſuccini, Therebintinæ, ſcorpionum, ad gr. vj. vel ℥. β.

Quorum pleraque licet ſint calida, attamen per acciðens refrigerant, quia materiam calidam educunt, & frigido- rum aperientium ſunt vehicula.

Accedunt aquæ minerales, nitroſæ, vitriolatae, chalybeatae, quarum uſus poſt univerſalia evacuantia & alterantia ſufficienter adhibita, mira præſtat ad calidas viſcerum dyſtraſias corrigendas, referandas obſtructiones, & humores craſſos viſcidos attenuandos, detergen- dos, & per urinas evacuandos.

Diuretica calida conveniunt morbis à cauſa frigida productis.

Componuntur in forma decocti, ut ſuprà capite de nephriticis aperienti- bus, addendo aliquod ex chymicis, quæ eodem in loco deſcripta ſunt.

In forma julepi, quando in promptu parati debet in urinæ ſuppreſſionibus,

300 Pars II. *De Evacuantibus.*

modò non proveniat ab inflammatione.

℞. Aquar. gramæ cæref. ana ℥. iiij. spirit. salis nitri ʒ. β. salis succini, gr. v. syrupi capill. vener. ℥. j. f. julep.

Prodest calculosis, nephritidi à crassis humoribus, suppressioni urinæ ab iisdem causis &c.

Vel

℞. Aquarum spiritus fabar. & flor. malvæ, ana ℥. ij. β. spir. Therebinth. gutt. iiij. vel spirit. volatilis salis armoniaci, gutt. x. f. julep. In defectu hujusmodi aquarum adhiberi potest aqua, vel decoct. malv. pariet. graminis, &c.

Abstinendum à diureticis in tabidis macie confectis, instrumentis urinæ exulceratis, aut inflammatis; pudendis, utero affectis, repletâ vesicâ, viarum obstructione, dum multa est adhuc materia, aut scatent sordibus ventriculus, & intestina; ne penitiùs in partes obstructas humores à diureticis fusi ducantur, & obstructiones augeant, ideòque priùs ritè corpus purgantibus & alterantibus præparandum.

CAPUT III.

De Diaphoreticis.

Magna certè est vis transpirationis ad vitæ tutelam, quam statico trutinio diligens Sanctorius deprehendit pleniorẽ esse omnibus aliis evacuationibus sensibilibus simul sumptis. Quod si tantum potest, ut per poros partium & arterias, insignem copiam volatiliũ crassarumque sordium in totius habitum transferat, susceptumque sanguinem, unà cum transumpto aëre, in circulationis opus & refrigerium per venas referat ad interiora; quantum ab *ἀσθηνδυσία* timendum est, quæ calidos halitus in vasis coërcens, & flabellum aëris impediens, tam sæpe fervorem atque putredinem in humoribus producit; neque ulla ferè sit febris, quæ desæviat aut penitus cesset sine sudore atque liberâ *ἀσθηνδυσία*.

Neque mirum, cum ea quæ per diaphoresim seu sponte naturæ, seu artis beneficio fit. evacuatio, non solum

302 Pars II. *De Evacuantibus.*

proximè ab habitu corporis , sed & à vasis & visceribus , necnon ab intima corporis regione quodcunque acidum volatile , cæterasque res solubiles humorum particulas per vasa pneumatica, ipsaque interiorum partium & cutis spiracula , in aquæ aut vaporis formâ, dissolvat.

Medicamenta quæ id promovent dicuntur diaphoretica , quorum *Summus* & modum agendi ex eo deprehendimus , quod faciliè transpirent sudéntque , quibus sanguis tenuis , solutus, serosus , promptè circulans , porique totius habitûs aperti sunt , quales sunt sanguinei ; biliosi , præsertim ætate. Sic quæ diaphoretica sunt , debent pol- lere vi attenuandi, fundendi, & proinde majorem in sanguine fermentationem & circulationem excitandi, partésque humorum volatiles segregatas rapiendi in cutis spiracula , quæ rarefaciendo aperiunt : ideóque.

Diaphoretica sunt medicamenta, quæ cutis poros referant , humores à centro ad circumferentiam evocant , & insensibiliter vel sensibiliter expurgant.

Quæ sensibiliter mōvent sudores

Cap. III. *De Diaphoret.* 303

vocantur hidrotica, seu sudorifica : de quibus suprà cap. 12. §. 2. part. 1.

Quæ insensibiliter id agunt, dicuntur Diaphoretica simpliciter, quæ naturam sudores molientem, aut in eos pronam adjuvant, vel poros aperiendo, subriles humorum partes excludunt : quorum

Usus est.

1. In Febribus malignis, pestilentibus, variolis, morbillis, cæterisque, in quibus promovenda diaphoresis, maximè si natura huc moveat, per exanthemata, sudores, &c. quorum exempla tradita sunt in forma julepi, Emulsionis, cap. 1. & 2. §. 1æ. partis 1æ.

In forma decocti cap. 4. §. Secundæ part. Primæ de cardiacis in causa calida.

2. In omnibus febribus, & aliis casibus in quibus adest cutis obstructio, vel difflandi sunt humores à centro ad circumferentiam, diebus criticis, dum videmus naturam ad sudores paratam; vel ad ipsam juvandam, dum languide eos movet.

℞. Aq. cardui bened. scabios. papav. rhœad. an. q. s. salis cardui bened. vel

304 Pars II. *De Evacuantibus.*

scabios. & confect. hyacinth. an. \mathfrak{z} .i.
syrup. capill. vener. \mathfrak{z} . β . f. julep.

Vel

Aq. cardui bened. \mathfrak{z} .vi. spirit. nitri,
& Bezoard. mineral. an. \mathfrak{z} . β . syrup. li-
mon. \mathfrak{z} . β . f. Julep.

Substitui possunt ex chymicis.

Spiritus salis dulcis, ad \mathfrak{z} .i.

Spirit. Tartari, ad \mathfrak{z} . β .

Lapis Bezoardicus verus, ad gr. iv.
vel v.

Pulvis Bezoardicus animalis, ad
 \mathfrak{z} . β . vel gr. xv.

Mixtura spiritalis, cæteraque, de
quibus in prædictis locis de Julepo, &
de cardiacis, dictum est.

3. In Scorbuto, affectibus hypo-
chondr. &c.

\mathcal{U} . Aquar. cardui bened. & fumar.
an. \mathfrak{z} .ii. β .

Salis cochlear. \mathfrak{z} . β . fiat julep.

Substitui possunt.

Sal cærefol. scabios. melissæ, fu-
maricæ, nasturtii aquar. becabungæ, ad
 \mathfrak{z} . β .

Sal fixus eorundem, vel Tartari
ad \mathfrak{z} .i.

Nota 1. Prius esse corporis plenitu-

Cap. III. *De Diaphoret.* 305

dinem demendam evacuantibus, venæ sectione, purgatione, prout & quantum expedire videbitur. Quod insinuat Gal. ^{11. Me-} ne humores fusi & attenuati penitiùs ^{th.c.9.} deferantur, obstructions augeant, ant nimia copiâ in corporis habitum rapiantur, vel difficiliùs perflati computrescant.

2. Ut Diaphoretica eligantur proportionata; nec semel, sed quoties opus videbitur repetantur, ne potiùs agitetur materia, quàm evacuetur.

3. Ne calidiora adhibeantur, quando calor in febribus insignis est, abestque omnis malignitas.


4. Tempus adhibendi opportunius esse, quando materia mobilis est, & natura prona: in his præsertim qui facile, & copiosè naturaliter transpirant. In continuis febribus depletâ per evacuationia majori ex parte humorum sarcinâ, ut liberiùs corpus perspiret, & ad sudores disponatur; præsertim quando subest malignitas, cujus miasmata sponte in corporis ambitum feruntur, dum serosæ & ichorosæ sanguinis partes per ἐκχύμωσιν & τῆς φλεβῶν ναυσίωσας, in cutem natura protrudit. In in-

306 Pars II. *De Evacuantibus.*

termittentibus, incipiente aut declinante paroxysmo; quo tempore materia mobilis est; in principio quidem invita contrario motu è foco expellitur; in fine verò, quò sponte vergit, ultrò fugatur.

5. Cavendum est, ne nimius sit diaphoreticorum usus, quando nimia est sanguinis tenuitas, putredo, & dissolutio: quòd sæpe contingit in febribus malignis, purpuratis, variolis, affectibus scorbuticis & similibus. Tunc enim diaphoretica, sanguinem fundendo, ulteriùs volatilifant, & corrumpunt. Quin potiùs tunc utendum leviter detergentibus, refrigerantibus, iisque quæ alkalibus abundant. Non aliâ forsan ratione antiqui præscribebant pulveres, potiones, confectiones cardiacas, quæ terram sigillatam, bolum armenicum, corallia, gummata, & similia recipiunt, quibus imbibuntur acida, tenuia incrassantur; & nimia impeditur fermentatio.

SECTIO



S E C T I O II.

De Evacuantibus particularibus.

POST evacuationes universales, instituenda est purgatio particularis, quæ respicit determinatam partem, à qua excludere humores copiâ vel qualitate peccantes est opus. Cerebrum expurgatur per nares, quod præstant sternutatoria, errhina; vel per palatum, quod præstant masticatorium, gargarisina: pulmo & thorax per bechica: ventriculus per vomitoria: gibba hepatis per diuretica: intestina & cava hepatis expurgantibus per secesum, de quibus omnibus supra diximus: renes autem & vesica per injectiones, uterus etiam per pessaria.

C A P U T I.

De Sternutatoriis.

STernutatoria, quæ ptarmica Græcè dicuntur, sunt medicamenta, quæ in nares immittâ vim cerebri expultricem movent ad expulsionem rei molestæ.

Fiunt ex acribus simplicibus in pulverem redactis. Immittuntur in nares, vel subitâ & repentinâ attractione cum aëre, vel per tubulum insufflando.

Parantur, vel in forma pulveris, vel in forma liquida.

Ufus est, ad cerebri excrementa educenda, vapores discutiendos, sopitos ægros excitandos, sensûs obtusos expediendos, fœtum & secundinas excludendas.

Simplex pulvis sternutatorius fit ex pulvere nicotianæ siccæ, betonicæ, salviæ, ireos florentiæ, &c.

Compositus paratur ex acrioribus simul mixtis pro affectibus soporosis, aliisque prædictis intentionibus.

Cap. I. *De Sternutatoriis.* 309

℥. Piperis longi & pyrethri, an.
3. ℔. euphorbii ʒ. i. fiat pulvis in nares
per tubulum insufflatus.

Vel

℥. Pulv. nicotian. & hellebori, an.
3. ℔. piper. albi ʒ. i. euphorb. gr. v.
fiat pulvis.

Vel

℥. Pulv. tabaci 3. i. ℔. fol. beton.
sicca 3. ℔. helleb. albi ʒ. i. ambra gr. ij.
fiat pulvis.

Loco ambrae in affectibus uteri,
pone castorei gr. ij.

In formâ liquidâ.

℥. Pulv. hieræ picrae, garyoph.
pyrethri 3. i. aquæ vitæ q. s. fiat mix-
tura, quâ cum penna nares interiùs
illiniuntur.

Abstinendum à sternutatoriis, quan-
do crudi humores in capite, & thorace
continentur, nisi in casu urgente, ut in
apoplexia, &c.

Præterea abstinendum etiam ab iis,
in cerebri defluxionibus, oculorum af-
fectibus, ulceribus narium, in obno-
xiis vertigini, hæmorrhagiæ, &c.

Non est iis utendum priusquam cor-
pus ritè sit expurgatum, nisi ut dictum

310 Pars II. *De Evacuantibus.*
est in casu urgenti ; quia universalia
sunt præmittenda particularibus , ne
pleno aut adhuc onusto existente cor-
pore , per agitationem humorum fiat
major in caput effusio.

C A P U T II.

De Errhinis.

Errhina liquida sunt medicamenta,
quæ vel ex solis aquis , succis , de-
coctis , aut similibus ; vel ab iisdem , &
pulveribus mixtis parata , inspirando in
nares attrahuntur.

Ufus est multiplex.

1. Ad purgandum cerebrum à crassis
& viscidis humoribus , ut

℞. Fol. major. salviæ , beton. an.
M. ss. terantur affuso vino albo , &
aquâ betonicæ , an. ad ℥. iv. Expressi
liquoris tepidi prono capite , & aquâ
ore pleno naribus attrahe q. s. ter aut
quater , manè jejuno ventriculo.

Vel

℞. Succ. major. & betæ cum vino
albo expressorum ℥. iij fiat errhinum :
de quo , &c.

Cap. I I. *De Errhinis.* 311

2. Ad temperandum ardorem acrem
narium, cerebri in febribus, aut fluxio-
nibus acribus.

℞. Lactis caprilli recenter emul-
ſi ℥. iij. attrahat frequenter naribus
inspirando.

Vel.

℞. Aquæ ros. plantag. an. ℥. ij. fiat
errhinum.

In omni phrenitide, omnique delirio
à causa calida.

℞. Fol. lact. solan. papav. rhœad.
an. M. ſ. flor. nymph. p. i. fiat decoct.
Colat. ad ℥b. ſ. utatur pro errhino.

3. Ad ulcera narium tergendā.

℞. Decocti hord. ℥. iv. mellis vel
ſyrupi ros. ℥. j. ſ. fiat errhinum.

Vel

℞. Hord. integr. p. j. fol. plantag.
abſinth. an. M. ſ. florum hyper. p. j.
fiat decoct. Colat. ad ℥b. ſ. diſſolv.
mellis ros. ℥. i ſ. fiat errhinum, &c.

4. Ad ſiccandum, & adſtringendum,
deterſo ulcere.

℞. Fol. plantag. verbasc. an. M. i.
cortic. mali granat. ℥. iij. ros. rubr.
p. i. fiat decoct. Colat. utatur pro
errhino.

312 Pars II. *De Evacuantibus.*

5. Ad hæmorrogiam sistendam.

℞. Boli armen. terræ sigill. sang. drac. & pilor. lepor. an. ʒ. j. misce cum succo urticæ, vel cum ovi albimine, fiant tentæ aut fenicilli naribus immittendi.

7. Ad narium foetorem.

℞. Aq. ros. naphæ, an. ʒ. i. β. aquæ major. ʒ. i. mochi, gr. ij. vel in mulieribus garyophyll. pulver. ʒ. i. misce pro errhino.

Similiter in aliis affectibus narium, ut polypo, ulceribus foetidis &c. potest parari errhinum ex appropriatis, præmissis in omnibus sufficienter universalibus.

C A P U T III.

De Masticatoriis.

Masticatoria sunt medicamenta, quæ ore mandendo, & atterendo, pituitam è capite per ossis sphenoidis meatum in palatum evocant.

Masticatoria dicuntur, quia manducantur: à Græcis verò Apophleg-

Cap. III. *De Masticat.* 313

matissimi, quia phlegma per os expurgant.

Præscribuntur, vel in nodulo, vel in massa ex pulveribus exceptis, mucilage aliquâ &c. vel per se simpliciter, ex fol. lauri, beton. salviæ, nicotian. radic. pyrethri, iræos nostratis, & similibus, quæ vel per se ore masticantur, vel nodulis includuntur.

Ufus est, in repletionem cerebri pituitosa, in affectibus dentium, aurium, & oculorum à fluxione ferofi humoris, in soporosis quoque affectibus.

Vulgare ex foliis est nicotianæ, vel betonicæ, vel lauri, pyrethri, &c.

Vel

℞. Radic. pyrethr. 3. ℥. mastich. 3. i. pulverisa crasso modo, & include in panno lineo, fiatque nodulus per semihoram manè jejuno ventriculo prono capite masticandus.

℞. Caryophyll. & zinzib. an. ʒ. i. staphysag. 3. ℥. fiat nodulus masticandus manè.

Qui obnoxii sunt destillationi in fauces, & pulmones, ulceribus oris tabi, hæmoptysi, abstineant à masticatoriis; non est enim movenda,

fluxio in partes malè dispositas, & debiles, cum periculo majoris incommodi.

C A P U T I V.

De Gargarismo.

Gargarisma est remedium formâ liquidum, quod ore contentum diu circa fauces agitantur.

Ufus multiplex est.

1. Ad trahendam pituitam è cerebro, palato, faucibus, corpore ante remediis universalibus convenienter expurgato.

℞. Radic. pyrethri & galang. an. ʒ. iij. liquirit. ʒ. i. ss. fol. salviæ, majoran. hyss. an. M. i. semin. staphysagr. ʒ. i. passul. purgat. paria iij. flor. stœchad. p. i. fiat decoct. in aqua. Colat. ad lb. i. dissolve oxymel. scillit. ʒ. iij. fiat gargarisma, quo utatur manè jejuno ventriculo, os colluendo per semi-horam.

2. Ad sistendam inflammationem oris.

• Gargarisma adstringens, & repel-

Cap. I V. *De Gargarismate.* 315
lens in principio fluxionis, & inflammationis.

℞. Oxycrati ℥b. β. utatur pro gargarismate.

Vel

℞. Aquar plantag. ros. caprifol.
an ℥. ij. falis prunell. ℥. i. diamor. ℥. i.
misce, fiat gargarisma.

Vel

℞. Fol plantag. lactuc. bursæ pastoris, an. M. i. summit. rubi, & rosar. Rubr. an. p. i. fiat decoct. Colat. ad ℥b. i. adde aceti rosati ℥. β. fiat gargarisma.

In progressu miscenda sunt lenientia, ut liquiritiæ, passulæ, mel violatum.

In declinatione gargarisma detergens & resolvens.

℞. Fol. agrim. hyssopi, an. M. i. liquirit. contus. ℥. iij. passul. purgat. par. iij. hordei integri, p. i. fiat decoct. Col. ad ℥b. i. dissolve mellis rosati ℥. ij. fiat gargarisma.

3. Ad ulcera oris, & faucium detergenda, & dolorem leniendum.

℞. Fol. plantag. agrim. bursæ pastoris, an. M. i. hordei integri, p. i.

O 5

316 Pars II. *De Evacuantibus.*

fiat decoctio. Colaturæ ad ℥. i. dissolve mellis rosati, vel syrupi de rosis siccis, ℥. ij. fiat gargarisma.

4. Ad dolorem dentium.

℥. Radic. pentaphil. cyperi, an. ℥. β. fol. hederæ M. i. rosar. rubr. i. fiat decoctio in oxycrato, vel in aqua & vino rubro: Colaturâ utatur pro gargarismate, & lotione gingivarum.

5. Ad ardorem & acrimoniam oris temperandam, in febribus, vel in salivatione ab hydrargyrosi.

℥. Lactis, vel feri lactis ℥. β. utatur pro lotione oris.

Vel

℥. Decocti pulli ℥. β. ad eundem usum.

Vel

℥. Emulsionis amygdalar. dulcium extractæ cum aqua hordei, ℥. β. syrupi violati ℥. i. fiat gargarisma.

Vel

℥. Decocti hordei ℥. i. diamorii ℥. ij. misce, &c.

C A P U T V.

De Injectionibus.

Injectio generaliter idem significat ac enema, in specie verò est illud omne remedium liquidum, quod per syringam in quasunque partes internas immittitur.

Materia injectionis pro variis partibus & affectibus diversa est. Paratur ex liquoribus, succis, aquis, decoctis; vel ex solis oleosis; vel ex pluribus eorum simul mixtis.

Ufus multiplex est pro variis partibus & morbis.

1. In aurium affectibus, ad dolorem & inflammationem mitigandam,

℞. Lactis recenter emulsi ℥. ii. liquoris albumin. ovi agitati detractâ spumâ ℥. ℞. misce, fiat tepidè injectio in aurem.

Vel

℞. Succu lactuc. & solani, an. ℥. ℞. olei amygdal. dulc. sine igne extract. ℥. ℞. misc. fiat injectio.

318 Pars II. De Evacuantibus.

Si rumpatur abscessus, paranda injectio detergens.

℞. Decocti hordei ℥ iv. mellis ros. ℥ i. misce, fiat injectio.

Quando materia est crassa & frigida.

℞. Succu apii & porror. an. ℥ i. mellis rosati ℥ β. fiat injectio, &c.

Ad gravem auditum.

℞. Olei anisi arte chymica extracti, vel garyophyll gutt. iv. per se, aut cum oleo amygdal. dulcium vel amar. aut cum paucō lacte fiat injectio.

2. In thoracis morbis, & vulneribus, pro empyemate, & vulneribus pectoris, ad pus detergendum.

℞. Hord. integr. p. i. fol. agrim. hyss. plantag. pimpin. an. M. i. liquirit. rasæ ℥ ij. flor. hyper. p. i. fiat decoct. Colat. ad ℥ i. dissolve mell. ros. ℥ ij. fiat injectio.

3. In uteri affectibus.

Injectio fit in uterum per siphonem, qui merrenchyta dicitur, pro virginibus nusquam præscribenda; pro pueris & recenter enixis dosis pro una vice est ad ℥ vi. pro cæteris ad ℥ iij. vel iv.

Ad dolorem & inflammationem sedandam.

Cap. V. *De Injectionibus.* 319

℞. Aq. plantag. solan. an. ℥. iij.
fiat injectio.

Vel

℞. Succī plantag. solan. an. ℥. iij.
mucilag sem. cydonior. psyllii extra-
ctæ in aquā plantag. ℥. i. β. misce, fiat
injectio.

Vel

℞. Folior. lact. plantag. sempervi,
an. M. i. flor. nymph. p. i. fiat decoct.
Colat. ad ℥. β. dissolv. salis prunell.
℥. i. β. fiat injectio.

Ad tumorem uteri œdematosum,
vel schirrosū.

℞. Rad. alth. & lilior. an. ℥. i. fol.
malvæ, parietar. artem. an. M. i. sem.
lini, althææ, an. ℥. β. flor. camomill.
p. i. fiat decoct. in aqua & vino albo,
vel in jure omaforum, Colaturæ ad ℥. i.
dissolve olei lilior. & camom. an. ℥. i.
β. fiat injectio.

4. Ad ulcus detergendum.

Si adsit acrimonia, ardor, dolor.

℞. Decocti hordei & feri lactis an.
℥. iij. mellis Rosati ℥. i. β. misce, fiat in-
jectio pro una vice sæpe iteranda.

Si Ulcus sit simplex:

322 Pars II. *De Evacuantibus.*

℞. β. vel præcipitat. rubri ℥. ij. fiat injectio.

Si Ulcus sordidum sit, & scateat plurimis excrementis; utendum magis detergentibus, qualia suprà dicta sunt in ulcere uteri, sed fieri debet decoctio in aqua & vino albo; vel si magis roborandum sit, in vino rubro.

Sape etiam interjicienda, sequens injectio.

℞. Præcipitati rubri ℥. β. vel unguenti ægyptiaci ℥. β. aquæ plantag. ℥. iij. fiat injectio.

Nota, quòd aliquando cum prædictis ulceribus adsit inflammatio, vel intemperies calida insignis, vel tumor aliquis callosus: quo tempore non est agendum nimis exsiccantibus, & calidis, sed temperatis, anodynis, & refrigerantibus, dum præscribuntur universalia alterantia, & evacuantia.

Ad exsiccandum, & consolidandum, paratur ex modicè adstringentibus, & exsiccantibus, ut

℞. Rad. symphyti major. bistort. an. ℥. i. fol. plantag. equiseti; polygon. an. M. i. granor. sumach, plan-

Cap. V. *De Injectionibus.* 323

tag. an. 3. ij. summit. hyper. & rosar. rubr. an. p. i. fiat decoct. colatur. ad lb. i. dissolv. syrup. de rosis siccis 3. ij. salis Saturni 3. i. fiat injectio.

Sæpe etiam dissolvi possunt in 3. iv. prædicti decocti, trochiscor. Gordonii 3. ij.

6. In ulceribus profundis, vel etiam fistulosis cæterarum partium, & cavitatum, quando detergendum & exsiccandum.

℞. Radic. gentianæ, rhapont. & aristoloch. rotund. an. 3. iij. fol. pimpin. scabios. bugulæ, an. M. i. pulv. cancr. flaviatiliū in nodulo positi 3. ij. rosar. rubr. M. ʒ. coque in vino albo ad lb. i. quo decocto fove ulcera, ter aut quater in die, & ex eo fiat injectio in fistulas per syringam.

Si ulcus sit sordidum, dissolve in parte ejusdem decocti collyrium Lanfranci, Ægyptiacum, præcipitatum rubrum, ut supra.

322 Pars II. *De Evacuantibus.*

℞. β. vel præcipitat. rubri ℥. ij. fiat injectio.

Si Ulcus sordidum sit, & scateat plurimis excrementis; utendum magis detergentibus, qualia supra dicta sunt in ulcere uteri, sed fieri debet decoctio in aqua & vino albo; vel si magis roborandum sit, in vino rubro.

Sape etiam interjicienda, sequens injectio.

℞. Præcipitati rubri ℥. β. vel unguenti ægyptiaci ℥. β. aquæ plantag. ℥. iij. fiat injectio.

Nota, quòd aliquando cum prædictis ulceribus adsit inflammatio, vel intemperies calida insignis, vel tumor aliquis callosus: quo tempore non est agendum nimis exsiccantibus, & calidis, sed temperatis, anodynis, & refrigerantibus, dum præscribuntur universalialia alterantia, & evacuantia.

Ad exsiccandum, & consolidandum, paratur ex modicè adstringentibus, & exsiccantibus, ut

℞. Rad. symphyti major. bistort. an. ℥. i. fol. plantag. equiseti, polygon. an. M. i. granor. sumach, plan-

Cap. V. *De Injectionibus.* 323

rag. an. ʒ. ij. summit. hyper. & rosar. rubr. an. p. i. fiat decoct. colatur. ad lb. i. dissolv. syrup. de rosis siccis ʒ. ij. salis Saturni ʒ. i. fiat injectio.

Sæpe etiam dissolvi possunt in ʒ. iv. prædicti decocti, trochiscor. Gordonii ʒ. ij.

6. In ulceribus profundis, vel etiam fistulosis cæterarum partium, & cavitatum, quando detergendum & exsiccandum.

℞. Radic. gentianæ, rhapont. & aristoloch. rotund. an. ʒ. iij. fol. pimpin. scabios. bugulæ, an. M. i. pulv. cancr. fluviatiliū in nodulo positi ʒ. ij. rosar. rubr. M. ʒ. coque in vino albo ad lb. i. quo decocto fove ulcera, ter aut quater in die, & ex eo fiat injectio in fistulas per syringam.

Si ulcus sit sordidum, dissolve in parte ejusdem decocti collyrium Lanfranci, Ægyptiacum, præcipitatum rubrum, ut supra.

322 Pars II. *De Evacuantibus.*

℞. β. vel præcipitat. rubri ℥. ij. fiat injectio.

Si Ulcus sordidum sit, & scateat plurimis excrementis, utendum magis detergentibus, qualia suprà dicta sunt in ulcere uteri, sed fieri debet decoctio in aqua & vino albo; vel si magis roborandum sit, in vino rubro.

Sape etiam interjicienda, sequens injectio.

℞. Præcipitati rubri ℥. β. vel unguenti ægyptiaci ℥. β. aquæ plantag. ℥. iij. fiat injectio.

Nota, quòd aliquando cum prædictis ulceribus adsit inflammatio, vel intemperies calida insignis, vel tumor aliquis callosus: quo tempore non est agendum nimis exsiccantibus, & calidis, sed temperatis, anodynis, & refrigerantibus, dum præscribuntur universalia alterantia, & evacuantia.

Ad exsiccandum, & consolidandum, paratur ex modicè adstringentibus, & exsiccantibus, ut

℞. Rad. symphyti major. bistort. an. ℥. i. fol. plantag. equiseti, polygon. an. M. i. granor. sumach, plan-

Cap. V. *De Injectionibus.* 323

tag. an. 3. ij. summit. hyper. & ro-
sar. rubr. an. p. i. fiat decoct. colatur.
ad lb. i. dissolv. syrup. de rosis siccis 3. ij.
salis Saturni 3. i. fiat injectio.

Sæpe etiam dissolvi possunt in 3.
iv. prædicti decocti, trochiscor. Gor-
donii 3. ij.

6. In ulceribus profundis, vel etiam
fistulosis cæterarum partium, & cavi-
tatum, quando detergendum & exsic-
candum.

℞. Radic. gentianæ, rhapont. &
aristoloch. rotund. an. 3. iij. fol. pim-
pin. scabios. bugulæ, an. M. i. pulv.
cancr. fluviatilium in nodulo positi
3. ij. rosar. rubr. M. ʒ. coque in vino
albo ad lb. i. quo decocto fove ulcera,
ter aut quater in die, & ex eo fiat in-
jectio in fistulas per syringam.

Si ulcus sit sordidum, dissolve in
parte ejusdem decocti collyrium Lan-
franci, Ægyptiacum, præcipitatum ru-
brum, ut supra.

322 Pars II. *De Evacuantibus.*

℞. β. vel præcipitat. rubri ℥. ij. fiat injectio.

Si Ulcus sordidum sit, & scateat plurimis excrementis, utendum magis detergentibus, qualia suprà dicta sunt in ulcere uteri, sed fieri debet decoctio in aqua & vino albo; vel si magis roborandum sit, in vino rubro.

Sæpe etiam interficienda, sequens injectio.

℞. Præcipitati rubri ℥. β. vel unguenti ægyptiaci ℥. β. aquæ plantag. ℥. iij. fiat injectio.

Nota, quòd aliquando cum prædictis ulceribus adsit inflammatio, vel intemperies calida insignis, vel tumor aliquis callosus: quo tempore non est agendum nimis exsiccantibus, & calidis, sed temperatis, anodynis, & refrigerantibus, dum præscribuntur universalia alterantia, & evacuantia.

Ad exsiccandum, & consolidandum, paratur ex modicè adstringentibus, & exsiccantibus, ut

℞. Rad. symphyti major. bistort. an. ℥. i. fol. plantag. equiseti, polygon. an. M. i. granor. sumach, plan-

Cap. V. *De Injectionibus.* 323

tag. an. ʒ. ij. summit. hyper. & ro-
sar. rubr. an. p. i. fiat decoct. colatur.
ad lb. i. dissolv. syrup. de rosis siccis ʒ. ij.
salis Saturni ʒ. i. fiat injectio.

Sæpe etiam dissolvi possunt in ʒ.
iv. prædicti decocti, trochiscor. Gor-
donii ʒ. ij.

6. In ulceribus profundis, vel etiam
fistulosis cæterarum partium, & cavi-
tatum, quando detergendum & exsic-
candum.

℞. Radic. gentianæ, rhapont. &
aristoloch. rotund. an. ʒ. iiij. fol. pim-
pin. scabios. bugulæ, an. M. i. pulv.
cancr. fluviatilium in nodulo positi
ʒ. ij. rosar. rubr. M. ʒ. coque in vino
albo ad lb. i. quo decocto fove ulcera,
ter aut quater in die, & ex eo fiat in-
jectio in fistulas per syringam.

Si ulcus sit sordidum, dissolve in
parte ejusdem decocti collyrium Lan-
franci, Ægyptiacum, præcipitatum ru-
brum, ut supra.

318 Pars II. De Evacuantibus.

Si rumpatur abscessus, paranda injectio detergens.

℞. Decocti hordei ℥ iv. mellis ros. ℥ i. misce, fiat injectio.

Quando materia est crassa & frigida.

℞. Succu apii & porror. an. ℥ i. mellis rosati ℥ β. fiat injectio, &c.

Ad gravem auditum.

℞. Olei anisi arte chymica extracti, vel garyophyll gutt. iv. per se, aut cum oleo amygdal. dulcium vel amar. aut cum pauco lacte fiat injectio.

2. In thoracis morbis, & vulneribus, pro empyemate, & vulneribus pectoris, ad pus detergendum.

℞. Hord. integr. p. i. fol. agrim. hyss. plantag. pimpin. an. M. i. liquirit. rasæ ℥ ij. flor. hyper. p. i. fiat decoct. Colat. ad ℔ i. dissolve mell. ros. ℥ ij. fiat injectio.

3. In uteri affectibus.

Injectio fit in uterum per siphonem, qui metrenchyta dicitur, pro virginibus nusquam præscribenda; pro puerperis & recenter enixis dosis pro una vice est ad ℥ vi. pro cæteris ad ℥ iij. vel iv.

Ad dolorem & inflammationem sedandam.

Cap. V. *De Injectionibus.* 319

℥. Aq. plantag. solan. an. ℥. iij.
fiat injectio.

Vel

℥. Succi plantag. solan. an. ℥. iij.
mucilag. sem. cydonior. psyllii extra-
ctæ in aquâ plantag. ℥. i. β. misce, fiat
injectio.

Vel

℥. Folior. lact. plantag. sempervi,
an. M. i. flor. nymph. p. i. fiat decoct.
Colat. ad t̄b. β. dissolv. salis prunell.
℥. i. β. fiat injectio.

Ad tumorem uteri œdematosum,
vel schirrosam.

℥. Rad. alth. & lilior. an. ℥. i. fol.
malvæ, parietar. artem. an. M. i. sem.
lini, althææ, an. ℥. β. flor. camomill.
p. i. fiat decoct. in aqua & vino albo,
vel injure omasorum, Colaturæ ad t̄b. i.
dissolve olei lilior. & camom. an. ℥. i.
β. fiat injectio.

4. Ad ulcus detergendum.

Si adsit acrimonia, ardor, dolor.

℥. Decocti hordei & feri lactis an.
℥. iij. mellis Rosati ℥. i. β. misce, fiat in-
jectio pro una vice sæpe iteranda.

Si Ulcus sit simplex;

320 Pars II. De Evacuantibus.

℥. Hordei integri p. i. fol. agrim. plantag. sanicul. an. M. j. flor. hyperic. p. j. fiat decoct. Colat. ad ℥. i. dissolve mel. ros. ℥. ij.

Si ulcus sit sordidum, & multis scateat excrementis, injectio necessaria est efficacius detergens, modo non adsit dolor, vel hæmorrhagia, quæ à detergentibus acribus auferentur.

℥. Rad. ireos Florent. gentian. an. 3. iiij. fol. agrim. plantag. absynth. & marrub. an. M. i. flor. hyper. p. i. fiat decoct. in sero lactis vel hydromelite. Colat. ad ℥. i. dissolve succi apii, & mell. ros. an. ℥. i. β. fiat. injectio.

℥. Aquæ vel decoct. agrim. ℥. iiij. salis Jovis 3. β. fiat injectio.

Ad provocandos menses in frigidis, & obesis; tum ad deterfionem, quando pituitosis humoribus sordet uterus.

Utendum pro injectione aquis thermalibus, quales sunt Balerucanæ, præmissis sufficienter universalibus.

5. In vesicæ, & penis morbis.

Nota, non esse præscribendam injectionem, nisi prius reddita urinâ depleatur vesica.

Cap. V. De Injectionibus. 321

Ad dolorem leniendum ab acrimonia, calculo, &c.

℞. Aquæ hord. ℥. iij. olei amygdal. dulc. recenter extracti ℥. i. β. misce; fiat injectio.

Potest parari ex lacte tepido cum aqua hordei; vel ex mucil. semin. alth. psyllii extract. cum aqua solani & lilior. si adsit inflammatio.

℞. Aquæ plantag. solan. an. ℥. iij. camphoræ gr. iij. fiat injectio.

Vel

℞. Fol. semperv. lactuc. an. M. i. hordei integr. & flor. nymph. an. p. i. fiat decoct. Colat. ad ℔. β. dissolv. salis prunell. ℥. i. β. fiat injectio.

Ad ulcus detergendum.

℞. Hord. integr. p. i. fol. plantag. fanicul. millefol. & absynt. an. M. i. summit. hyperic. & rosar. rub. an. p. i. fiat decoct. colat ad ℔. i. dissolv. mellis ros. ℥. ij. fiat injectio.

Si ulcus sit depascens, & foetidum, sæpe etiam utere sequenti injectione.

℞. Aquæ plant. ℥. i v. collyri. Lanfranci ℥. β. unguenti Egyptiac.

322 Pars II. *De Evacuantibus.*

℞. β. vel præcipitat. rubri ℥. ij. fiat injectio.

Si Ulcus sordidum sit, & scateat plurimis excrementis; utendum magis detergentibus, qualia suprà dicta sunt in ulcere uteri, sed fieri debet decoctio in aqua & vino albo; vel si magis roborandum sit, in vino rubro.

Sape etiam interjicienda, sequens injectio.

℞. Præcipitati rubri ℥. β. vel unguenti ægyptiaci ℥. β. aquæ plantag. ℥. iij. fiat injectio.

Nota, quòd aliquando cum prædictis ulceribus adsit inflammatio, vel intemperies calida insignis, vel tumor aliquis callosus: quo tempore non est agendum nimis exsiccantibus, & calidis, sed temperatis, anodynis, & refrigerantibus, dum præscribuntur universalia alterantia, & evacuantia.

Ad exsiccandum, & consolidandum, paratur ex modicè adstringentibus, & exsiccantibus, ut

℞. Rad. symphyti major. bistort. an. ℥. i. fol. plantag. equiseti, polygon. an. M. i. granor. sumach, plan-

Cap. V. *De Iniectionibus.* 323

rag. an. 3. ij. summit. hyper. & rosar. rubr. an. p. i. fiat decoct. colatur. ad lb. i. dissolv. syrup. de rosis siccis 3. ij. salis Saturni 3. i. fiat injectio.

Sæpe etiam dissolvi possunt in 3. iv. prædicti decocti, trochiscor. Gordonii 3. ij.

6. In ulceribus profundis, vel etiam fistulosis cæterarum partium, & cavitatum, quando detergendum & exsiccandum.

℞. Radic. gentianæ, rhapont. & aristoloch. rotund. an. 3. iij. fol. pimpin. scabios. bugulæ, an. M. i. pulv. cancr. fluviatilium in nodulo positi 3. ij. rosar. rubr. M. β. coque in vino albo ad lb. i. quo decocto fove ulcera, ter aut quater in die, & ex eo fiat injectio in fistulas per syringam.

Si ulcus sit sordidum, dissolve in parte ejusdem decocti collyrium Lanfranci, Ægyptiacum, præcipitatum rubrum, ut supra.

CAPUT VI.

De Pessario & Nasali.

Pessarium est remedium formâ solidum oblongum, & rotundum, ad figuram & molem digiti compositum, quod in vulvam muliebrem immititur.

Componitur ex variis remediis secundum diversas intentiones, fitque tribus modis.

1. Vel ex gossypio in prædictam figuram concinnato; oleis vel unguentis convenientibus peruncto.

2. Ex panno lineo aut sericeo, in quo includitur materia remedii.

3. Ex ipsis pulveribus, cæterisque in formam solidam compactis. Debet cuilibet pessario filum appendi, ut extrahi possit.

Nunquam virginibus immittendum, ne frangatur virginitatis claustrum. Cæteris nusquam, nisi quando maxime necessarium, ob pudoris & pollutionis periculum.

Cap. VI. *De Pessario, &c.* 325

Priusquam immittatur, alvus subducenda est, & excludenda urina. Oportet etiam ut præmissa fuerint universalia.

Ufus est.

1. Ad purgandos serosos humores & pituitosos, quando his scatet uterus; & ad menses movendos.

℞. Hieræ picræ & benedict. laxat. an. ʒ. i. pulv. diacarth. & myrrhæ, an. ʒ. ʒ. Therebinth. ʒ. iiij. succi mercurial. q. s. excipe cotone moschato, & panno sericeo cum filo pendulo, fiant duo pessaria.

2. Ad secundinas expellendas.

℞. Pulv. aristoloch. dictamni, & sabinae, an. ʒ. i. pulv. hieræ picræ ʒ. ii. castor. gr. ij. cum melle cocto fiat pessarium.

In præfocatione ab utero à causa frigida.

℞. Ladani ʒ. ii. Gallia mosch. ʒ. i. macis & cinam. an. ʒ. i. moschi gr. i. therebinth. q. s. excipe bombace, & fiat pessarium.

3. Ad exsiccandum & roborandum uterum humidiores, pro faciliore conceptu.

326 Pars II. *De Evacuantibus.*

℞. Ladani & benjoin. an. ʒ. ii.
 styracis calam. & mastich. an. ʒ. i. re-
 ducantur in pulverem, & cum mucila-
 gine gummi tragacanthi extractâ cum
 aqua flor. aurantior. fiat pessarium.
 &c.

In gracilibus, & calidis, quæ flu-
 xum menstruorum largiorem patiuntur,
 utendum frigidis exsiccantibus, & ro-
 borantibus. Ut

℞. Mastich. rosar. rubr. & gran.
 Kermes, an. ʒ. i. β. santali rubri pulv.
 ʒ. i. ligni rhodii ʒ. β. cum mucilagine
 gummi tragacant. extractâ cum aqua
 rosar. fiat pessarium.

Pro utero calido & laxiori cervice,
 superadde prædicto pessario, trochisc.
 de terra sigillata, boli armen. an.
 ʒ. i.

Pro ulceribus uteri, colli & cervicis,
 ad detergendum.

℞. Unguenti apostol. ʒ. i. mellis
 ros. q. s. cum panno sericeo fiat pes-
 sarium.

Vel

℞. Mellis rosati ʒ. β. therebinth.
 ʒ. β. pulv. rad. ireos Florent ʒ. i.

Cap. V l. *De Pessario. &c.* 327

farinæ hordei ℥. i. cum succo apii , & panno lineo raro fiat pessarium.

4. Ad exsiccandum , & cicatricem inducendam.

℞. Tuthiæ lotæ ℥. β. cerusæ , sarcocoll. lithargyr. auri , an. ʒ. ij. syrup. de rosīs siccis , q. s. fiat pessarium.

Nascale est remedium , quod pro pessario ori vulvæ virginibus admoveatur.

Fit ex medicamentis simplicibus, vel compositis , appropriatis , quæ gossypio , vel linteo excipiuntur in plumaceoli modum , & ori vulvæ pro ulceribus , aliisque ipsius affectibus admoveatur.



P A R S III.

De Roborantibus.

POSTQUAM in morbis universalibus & particularibus, quidquid præter naturam est, alterando & purgando destruximus, relictam omnibus, vel plerisque partibus imbecillitatem corrigere oportet roborando. Pro quo.

Nota 1. Robur partium consistere in propria & sibi naturali temperie. 2. In substantiæ modo cuique peculiari. 3. In influxu spirituum à corde secundum copiam, & qualitatem convenienti, v. g. ut hepar sit naturaliter robustum, debet esse modicè calidum & humidum, leviter adstrictum, & necessario spirituum affluxu perfusum. Sic quæ ipsum roborant sunt 1. Modicè calefacientia; vel si nimis calidum sit, refrigerantia secundum gradum excessui debitum. 2. Leviter adstrin-

Pars III. *De Roborantibus.* 329

gentia, ut tonum ipsius conservent.

3. Spiritus vitales nutrientia.

Nota 2. quod, quamdiu morbus, & causa ipsius materialis perdurant, non sit simpliciter utendum roborantibus, quia cum sint adstringentia, retinerent excrementa in parte affecta; tunc enim solis alterantibus & evacuantibus utendum, immixtis roborantibus solum in longis, aut acutissimis affectibus, in quibus à continua vehementi causarum agentium vi, robur tonusque partium infringitur.


Nota 3. id audiendum esse de roborantibus particularibus; nam ea, quæ respiciunt generalem œconomiam, qualis est cordis ad omnes partes omni morbi tempore necessaria sunt. Talia etiam sunt, quæ reficiunt spiritus, ut jufcula, aliudque alimentum conveniens; ea quoque spiritus ab impuris vaporibus liberant, & conservant, ut cardiaca; quæ etiam cordis intemperiem corrigunt, aut debitam conservant, ut alterantia specifica.

Nota 4. quod quando simpliciter roborandæ sunt partes, id solum agendum sit in declinatione morbi, aut

330 Pars III. *De Roborantibus.*

post ipsam, ne ut dictum est, si priùs solis roborantibus utamur; excrementa, quæ in parte sunt, retineantur.

Ideò in hac parte, 1. agemus de roborantibus cordi debitissimis; quæ quia respiciunt universam corporis œconomiam, generalia vocamus. 2. De iis quæ cuilibet parti, aut pluribus simul roborandis conveniunt, quæ particularia nuncupamus.



SECTION I.

De Generalibus Roborantibus.

Generalia Roborantia licet dici possint particularia, quia cordi potissimum dicantur; generalia tamen vocantur ab effectu, quia universalis est spirituum, qui in eo generantur, influxus; à quo pendet robur, & vita omnium partium.

Diversa sunt hæc Roborantia, prout affectus cordis calidi aut frigidi sunt.

CAPVT

C A P U T I.

*De Roborantibus cor in
calidis affectibus.*

USus est in febribus, palpitatione,
animi defectu, cæterisque casibus;
quando præsens est, vel timetur futura
virium imbecillitas.

Confectio hyacinthor. ad ʒ. β. vel
ʒ. i. in jusclo, vel in liquore, seu
aqua cardiaca frigida buglos. borrag.
rosar. &c.

Pulvis confect. hyacinth. ad ʒ. β.
vel ʒ. j.

Pulvis diamargarit. frigidi ad patem
dosin.

Sumuntur, vel cum jusclo, vel cum
aquis prædictis, aut in alternis jusculis,
vel post ipsa.

Sint hæc, pro mulieribus obnoxiss
passioni hystericae, sine moscho &
ambara.

Tabellæ manus Christi cum per-
lis & Confect. Hyacinth. præscri-
buntur ad ʒ. ij. quarum una & altera

332 Pars III. *De Roborantibus.*
ponitur sæpe in ore, vel dissolvitur
in jusculis.

Perlæ præparatæ, vel magisterium
perlatum, corallorum præscribuntur
ad ʒ. i. ʒ. de quo pulvere sumitur ʒ. i.
in jusculo bis, aut ter in die; vel fit
pulvis compositus ex perlis præparatis,
& magisterio corallorum, qui exhibetur
ad dosim eandem, scilicet ad ʒ. i.
in alterno jusculo, vel bis in die.

In magna virium imbecillitate po-
test præscribi ambra grisæa ad gr. ij.
vel iij. cum paucis jusculis pro una
vice.

Gelatina cornu cervi parata cum
paucis aqua rosarum sine moscho, am-
bara, & aromatibus, de qua sumitur
cochlear unum, & alterum per se, vel
dissolvitur in alternis jusculis.

Ius Caponis per descensum extra-
ctum, quod faciliè sequenti modo
paratur.

• ʒ. Caponem optimum, depluma
& expurga ab interaneis, divide in
frusta, à quibus pinguedo, & pellis de-
trahantur: pone in olla vitreata opti-
nè clausa, & lutata cum farina aqua
subacta, appone in balneo Mariæ, &

Cap. I. De robor. cor, &c. 333

bulliant per sex vel octo horas. Ius exprimitur limpidum, de quo cochlearia duo sumuntur per se, vel cum jusculis alterantibus ter in die.

Sæpe etiam roborantia immiscentur alterantibus, julepis, emulsionibus, decoctis. De quibus vide in proprio capite.

In forma potionis.

℞. Aquar. buglossi, borrag. an. ℥. iij. confect. hyacinth. & sal. prunell. an. ʒ. β. pulveris diamargariti frigidi ℥. i. syrupi limonum ℥. i. misce: capiat uno haustu, vel in duas vices.

℞. Con. ervæ flor bugloss. & rosar. an ʒ. vi. aquar. bugloss. borrag. acetos. an. ℥. iij. ferveant & parum bulliant; Expressioni dissolve confect. hyacinth. ʒ. i. syr. limon. ℥. i. fiat potio, de qua duo cochlearia sumuntur inter duo juscula.

In alvi fluxu bilioso, cholera, vomitu &c.

℞. Confer. rosar. ℥. ij. aquar. plantag. portul. rosar. an. ℥. ij. ferveant & parum bulliant: Expressioni dissolve confect. hyacinthorum ʒ. i. pulveris triasantali ℥. i. syrupi granat. ℥. i. spi-

334 Pars III. *De roborantibus.*
ritus vitrioli, ad gratam aciditatem,
fiat potio.

In forma opiata.

℞. Confer. flor. buglos. & rosar.
an. ʒ. β. acidi citri ʒ. vi. confect. hya-
cinth. ʒ. i. pulver. diamargariti frigidi,
& magisterii perlarum, an. ʒ. β. essen-
tiæ rosar. ʒ. i. β. cum syreπο de pomis,
fiat opiata, de qua capiat sape ʒ. i.
superbibendo parum aquæ pro potu
ordinario.

lis accedunt topica in forma epithe-
matis liquidi vel solidi, admotio ani-
malium, linimenti: de quibus vide in
proprio capite de cardiacis à causa
calida.

C A P U T II.

De Roborantibus cor, in frigidis affectibus.

USus est in syncope, veneno frigido
sumpto vel intus genito, morsu à
cane rabido, febribus pituitosis syn-
copalibus, cæterisque morbis frigidis
cordis, seu idiopathicis seu sympa-
theticis.

Cap. III. De robor. cor, &c. 335

Confectio alkermes ad ʒ. ʒ. vel ʒ. i. per se, vel cum jusculo, vel cum aqua florum aurantiorum.

Pulvis diamargariti calidi, exhilarans Galeni, diambrae, de gemmis ad ʒ. ʒ. vel i. Spiritus volatilis viperar. ad gran. xv. Theriacalia, cæteraque, de quibus vide cap. 4. de cardiacis in casu frigido.

In forma opiata.

℞. Conservæ flor. anthos, & corticum citri saccharo conditi, an. ʒ. i. confect. alker. ʒ. i. magisterii anbræ griseæ ʒ. i. vel ejus defectu pulv. diambrae ʒ. ʒ. salis cardui benedicti & absynthii an. ʒ. ij cum syrupo Byssantino, vel conserv. corticum citri fiat opiata. Dosis est ʒ. i. per se, vel cum vino, aut jusculo.


Tabellæ confectæ ex confectione alkermes, ambara, essentia cinnamomi.

Vel

℞. Sacchari albi ʒ. ij. redde fluidum cum pauca aqua cinnamomi, deinde adde spiritus vitrioli guttas aliquot, essentia cinnamomi guttas i v. essentia anisi & nucis moschatae, an. gutt. ij. M. f. tabellæ, quibus utatur per se, vel in jusculis.

336 Pars III. *De Roborantibus.*

Accedunt topica epithemata liquida, solida, pulli columbini per medium secti, linimenta ex confectiōe alkermes, balsamo Peruviano pro corde: sacculi ex aromatibus in vino madefacti pro ventriculo: pro arteriis carpi, naribus, testibus confect. alkerm. in paucō vino dissoluta. De quibus vide suprà, in cap. cuique proprio.



S E C T I O II.

De Roborantibus particularibus.

HÆc cerebro, hepati, lieni, utero, cæterisque partibus officialibus, secundum varios affectus, destinantur.

C A P U T I.

De Roborantibus cerebrum in morbis calidis

Confectiōes, Tabellæ, pulvres, & reliqua in capite de

Cap. I. *De robor. cerebr.* 337

roborantibus cor in calidis affectibus descripta.

Ex usu sunt etiam in morbis calidis capitis ; inter quos , in sopore symptomatico , motibus convulsivis febribus supervenientibus , urgente virium imbecillitate , usurpatur.

Ambra grisæa optima.

Magisterium ambrae grisææ ad gr. ij. vel iij. in jusculo , vel aquis scabios. card. bened. papaver. rhæados.

Pulvis contra spasmum à \mathfrak{D} . β . ad \mathfrak{D} . i. quo etiam utimur in febribus malignis , in morbis convulsivis , vermicibus , & epilepsiâ laborantibus , bis aut ter in die.

In forma julepi , emulsionis , apozem. Vide quæ descripta sunt cap. de cephalicis à causa calida.

In forma opiatae.

\mathfrak{R} . Conservæ rosar. & nymph. an. \mathfrak{z} . i. confect. hyacinth. \mathfrak{z} . i. pulv. diammargarit. frigidi , & elect. de gemmis , an. \mathfrak{z} . β . salis prunell. \mathfrak{z} i. essentia rosarum \mathfrak{D} . i. syrup. violat. q. s. fiat opiata , de qua capiat \mathfrak{z} . i. β . vespere & manè.

In contumacibus vigiliis laudanum

338 Pars III. *De Roborantibus.*

opiatum, ad gr. i. vel ii. misceri potest cum dosi vespertina prædictæ opiatae, & iterari quando opus videbitur.

In morbis frigidis cerebri.

Theriaca vetus.

Mithridatium.

Confectio alkermes ad ʒ. β vel ʒ. i. pulvis diambrae, magisterium ambrae griseae, diamoschi dulcis, cæteraque.

Extracta & Theriacalia, quæ capite de cardiacis, & cephalicis in morbis frigidis describuntur.

In forma Iulepi.

℞. Aquar. Beton melissæ an. ʒ. ij. β. aquæ naphæ. ʒ. β. Theriacæ veteris ʒ. β. misce, fiat Iulepus. Exhiberi poterit gravidis epilepsiâ laborantibus sympathicâ, addendo etiam, si febris non insit, castorei gr. ij.

Essentia cinnamomi, anisi, garyophyll. alterutra ad gutt. iv. vel vi. vel aqua cinam. imperialis, ad cochlear. i.

Essentia, tinct. aut lac ambrae griseae, sal volatilis cranii humani, sal fixus, spiritus quoque, & oleum ejusdem ad ʒ. ss. vel ʒ. i.

In forma Apozematis, vide cap. de cephalicis.

Cap. I. *De robor. cerebr.* 339

In forma opiata.

℞ Conservæ flor. anthos & corticis citri, an. ʒ. vi. conservæ flor. pæoniæ & chicorii, an. ʒ. ss. confect. alkerm. & theriacæ veteris, an. ʒ. ij. ungulæ alces & rasuræ cranii humani præparati, an. ʒ. i. ambræ griseæ, gr. x. cum syrupo de stœchade fiat opiata : de qua capiat bis aut ter in septimana ʒ. ij. manè, superbibendo parum aquæ vino dilutæ. Prodest paralyticis, apoplecticis, epilepticis, quando post universalia, roborandum est cerebrum.

Ad caput Roborandum in calida, & frigida causa, usus jam invaluit potûs chocolates, cophée, & herbæ thé, de quorum usu vide quæ de his dicta sunt c. 9. §. 3. part. 1.

Topica Roborantia præscribuntur.

In forma suffitus, de quo vide cap. 4. de alterantibus & Roborantibus externis.

In forma pulveris.

℞. Pulveris ireos Florent. ʒ. iiij. ligni Rhodii & sem. pæoniæ, an. ʒ. ss. styracis & benjoin. an. ʒ. ij. fiat omnium pulvis tenuissimus, capillis inspergendus hora somni, & manè pectine excutiendus.

P 5.

340 Pars III. *De Roborantibus.*

Ex ejusdem pulveris ℥. iij. & pulveris cancrorum fluviatilium exsiccatorem in furno ℥. vi. potest fieri cucurbita interpuncta, excipiendo prædicti pulver. q. s. paucis cotone, & includendo in panno serico, pileo assui potest, vel in forma calantica gestari, præsertim hyeme.

C A P U T II.

De Roborantibus stomachum.

Vide cap. 5. sect. 2. Partis primæ de stomachicis.

C A P U T III.

De Roborantibus hepar.

IN causa calida, intemperie, obstructionibus, Rheumatismo, atonia, hydrope, inflammatione &c. hepate reddito insigniter debili, post universalia, vel etiam dum adhibentur.

Debent esse prædita non solum viis

Cap. III. *De robor. hepar.* 341

roborante , sed refrigerante ; & si morbus fuerit cum obstructionibus etiam aperiente ; si cum vasorum laxitate sine obstructionibus, magis adstringente.

Pleraque ex sequentibus sumuntur per se , vel in forma boli , opiata, tabellæ , decocti : de quibus vide in proprio cuiusque capite , & cap. de aperientibus hepaticis à causa calida.

Confect. hyacinth , ad ʒ. β.

Sal cichor. absynth. agrim. ad ʒ. β. vel ʒ. i. trochilci de Khabarb. de corallis , de spodio , ad ʒ. β. vel ʒ. i.

Electuarium diatriafantali , diarrhodon abbatis.

Magisterium corallorum , perlarum, ad ʒ. β.

Syrupus de corallis , ad cochlearia ii. manè per 4. aut 5. dies.

Tinctura corallor. ad ʒ. ij. manè die singulo , vel ter in hebdomada.

Tinctura. rosar. ad cyathum unum. bis aut ter in die.

Profunt hæc hepati reddito debili in prædictis affectibus , sed præsertim in diarrhœa , dysenteria.

Conservæ flor. cich. rosar. fructuum

342 Pars III. De Roborantibus:
cynorrhodonis, in forma boli. Vel

℞. Conservæ fructuum cynorr. ʒ. ij.
conf. hyacinth. ʒ. β. sal. cichor. vel
magist. corallorum ʒ. i. capiat manè
jejuno ventriculo per tres aut quatuor
dies continuos, vel ter in septimana, su-
perbibendo parum aquæ cichor. prodest
in prædictis affectibus, tum etiam in
longo hæmorrhoidum fluxu.

. In forma opiatæ.

℞. Confer. flor. cichor. & cynorrhod.
an ʒ. i. confect. hyacinth. ʒ. iv. magi-
sterii tartari & corallorum, an. ʒ. i.
sal. absinth. & pulv. triasant. an. ʒ. i.
cum syrupo de capill. ven. vel de cichor.
simplici, fiat opiata; de qua capiat. ʒ. ij.
manè duabus horis ante jusculum, su-
perbibendo cyathum aquæ cichor. vel
decocti cynorrod. vel in iis qui debili
sunt constitutione, parum aquæ vino-
dilutissimæ.

. Convenit omnibus affectibus longis
hepatis cum obstructionibus, post uni-
versalia.

. In forma tabellæ.

℥. Elect. triasant. quadruplicato.
℞. co. ʒ. iij. sacchari in aqua cichor.
soluti ʒ. iij. fiant tabellæ: cap. ʒ. i. ℥.
singulo manè.

Cap. III. *De robor hepar.* 343

Similiter componi possunt ex trochiscis de rhab. de cornu cervi, de corallis &c.

Vel

R. Elect. triasantali quadruplicati 3. iij. magisterii corallorum, 3. j. sal. absynth. 3. ss. sacchari in aqua rosar. soluti 3. iv. fiant tabellæ. Dosis est ad 3. ij. singulo manè, superbibendo parum aquæ.

Præparatio tincturæ, & syrupi corallorum apud Quercetanum, & alios chymicarum operationum scriptores videri potest.

Hepar roborantia in causa frigida sunt.

Extractum seu sal absynthii, centaurei zedoar. gentianæ.

Elixir, essentia, tinctura, aut lac ambraë grisæ.

Trochisci de rhabarb. de absynth. de eupatorio.

Electuarium diambraë, aromaticum rosatum, diarrhod. abbatis.

Confectio alkermes, hyacint. Theriaca.

Conservæ capill. ven. absynthii, corticum citri, quæ tradi possunt vel per

344 Pars III. De Roborantibus.

se, vel in forma opiata, tabellæ, boli juxta mox scripta exempla, vel in decoctis; de quibus vide caput de apoze-
mate, & de hepaticis in causa frigida.

Sequens decoctum commendatur à Galeno, pro roborando hepate in hydrope, convenit maximè in causa frigida. Sic traditur correctum.

℞. Passular. Corinth. mund. ℥b. β. coque in vino generoso ad pultis consistentiam, contunde, & per seraceum traice, permisce conservæ fol. absynth. & cortic. citri. conditi, an. ℥. β. pulveris atomat. ros. & diamargar. frig. an. ℥. β. magister. ambra griseæ. ʒ. β. fiat electuarium molle. Dosis est ad ʒ. ij. singulo manè, vacuo ab usu alterius remedii, superbibendo parum aquæ vino dilutæ.

Poterius in Pharmacopæa spargyrice commendat remedium sequens.

℞. Conserv. rosar. ℥. j. specifici stomachici, seu antimon. fixi ʒ. ij. croci martis aperientis ʒ. iiij. olei vitrioli ʒ. j. cum syrupo capillor. ven. fiat opiata. Dosis est ad ʒ. j. singulo manè.

Topica roborantia, tam in causa ca-

Cap. I V. *De robor. lienem.* 345
lida , quàm frigida , vide in cap. de
epithemate, fomento , linimento.

C A P U T I V.

De Roborantibus lienem.

QUæ roborant lienem pariter con-
veniunt visceri debili , calido, vel
frigido. Debent omnia misceri cum
aperientibus , quia ferè omnes lienis
morbi à terreno humore melancholico
proveniunt , unde obstructio, inflam-
matio , scirrhus , & alii morbi melan-
cholici oriuntur.

In causa calida.

Eadem sunt , quæ bili adustæ con-
veniunt , ut præparantia , de quibus
cap. de apozemate , & de splenicis.

Roborantia tam in causa calida quàm
modicè frigida , sunt.

Sal absynthii , fraxini , tamarisci.

Extractum aloës , myrrha , crocus,
Tartarum vitriolatum , chalybs præ-
paratus , sal martis , armoniacus.

Spiritus urinosus salis armoniaci, &
cætera , quæ ex diureticis supra des-

346 Pars III. *De Roborantibus.*
criptis , & ex cap. de spleniticis repen-
tenda.

Ex his formantur pilulæ , boli , opiatæ , tabellæ : de quibus vide capit. cuiusque , additis quæ magis specifica videbuntur.

C A P U T V.

De Roborantibus uterum & vesicam , & ad partes naturales ab infarctu liberandas.

NON est , post universalia alterantia , aperientia , & evacuantia sufficienter adhibita , remedium convenientius aquis Thermalibus falsis , sulphureis , nitrosis , bituminosis. Laudantur Balneicanæ falsæ & parum sulphuræ , aut aliæ his non multum dissimiles ; quarum usus per triduum est , in potu. primo. Die ad decem aut duodecim cyathos. 2. ad quindecim. 3. ad octodecim , plus minus , pro ætate & ægri tolerantia. Subsequi debet levis purgatio ad aquas eliciendas , quæ superesse possunt.



P A R S IV.


ET ULTIMA.

De Lenientibus & Paregoricis.

DUPLEX in morbis curatio instituitur, 1. Regularis, dum procedimus à causis ad morbum. 2. Irregularis, cum non attendendo ad causam & morbum; urgentibus symptomatibus vires infringentibus succurrere tentamus, quibus tandem vel mitigatis, vel sedatis, ad curam regularem rursus nos accingimus.

Nota quòd, dum symptomatibus mitigandis incumbimus; iis remediis quantum fieri potest utendum sit, quæ causæ & morbo sint contraria; ut simul symptoma, & aliquo modo morbum impugnemus. Sic mitigandis vigiliis frigida, non calida, adhibenda cum hypnoticis. Quòd si cogimur uti calidis, ut cum in deliquio animi, aut syn-

cope vinum exhibemus, aut cætera calida remedia, modicè & prudenter hoc faciendum; ne dum studemus symptomati, morbum multò deteriorem reddamus.



SECTIO UNICA.

De symptomatibus mitigandis.

Multa sunt symptomata, quæ animum regulariter curantis medici ad se revocant: inter quæ potissima sunt dolor, vigiliæ, hæmorrhagia, syncope.

CAPUT I.

De dolore mitigando.

Dolor tribus modis auferri potest:
 1. Dum auferitur causa doloris.
 2. dum delinitur anodynis. 3. dum sensibus stuporem inducimus narcoticis. Cum regulariter oppugnatur dolor,

procedimus auferendo causam universalibus evacuantibus, & topicis relaxantibus partem. Cum verò dolor urget, & vires atterit, utimur narcoticis ad debitum tempus.

Non agitur hic de auferentibus causam doloris per universalia evacuantia, sed de his, quibus mitigatur: quæ vel sunt anodyna, vel narcotica.

C A P U T II.

De Anodynis.

PAregorica, epiceraistica, anodyna idem significant; suntque medicamenta, quæ causâ & morbo remanentibus, dolorem mitigant.

Triplici ratione id præstant. 1. vi laxante, quâ cutis poros aperiunt relaxantque; sic enim, non fit tantus dolor, quia cutis minùs contenditur. 2. calore blando, & moderato; quo materiæ portionem, quæ partem distendit, resolvunt. 3. eodem calore temperato, quo partem affectam fovent, & ad quandam temperiei æqualitatem revocant.

350 Pars IV. *De Lenient. &c.*

Præscribuntur in forma linimenti, fomenti, & cataplasmatis.

In forma fomenti.

Vide exemplum capite de fomento pro dolore pleuritico, & nephritico.

In dolore hæmorrhoidum, & inflammatione earum partium, in quibus repellentia prohibentur.

℥. Lactis lb. ss. fove tepidè partem.

In forma linimenti.

Vide caput 8. de linimento, sect. de alterantibus externis.

In forma cataplasmatis.

Plura & diversa vide cap. 12. de cataplasmate, & cap. 11. de arthriticis.

His accedit admotio gallinæ, pulli, pulmonis hœdini, vervécini, omenti adhuc calentis; & similia.

C A P U T III.

De Narcoticis.

Narcotica sunt quæ dolorem sedant, quod duobus modis præstant: 1. vel stupefaciendo & parti

Cap. III. *De Narcoticis.* 351

sensum auferendo. 2. vel somnum conciliando, unde hypnotica dicuntur: ad dolorem requiritur ut pars sit sensibilis, & mens advertat. Alterutra conditio si deficiat, & dolor non fit.

Quæ parti sensum auferunt, stupefaciendo, id præstant plerumque frigiditate, aliquando occultâ qualitate, de qua mox, dum de hypnoticis.

Vltus est.

In vehementi dolore partium externarum, cui sedando frustra admota sunt anodyna.

In forma fomenti.

℞. Rad. hyoscyam. ʒ.i. fol. lactucæ, solani, papaveris albi, an. m.i. santal. citrin. ʒ. j. flor. nymph. p.j. fiat dec. Colat. foveatur pars dolens.

Vel

℞ Opii ʒ. ii. camphoræ ʒ. β. dissolv. in vini spiritus ʒ. iii. Colatura linteo imbuta admoveatur parti dolenti; renovetur quando opus videbitur.

In forma linimenti & unguenti.

℞. Opii in aquâ vitæ dissoluti ʒ. ss. fiat linimentum: admove parti dolenti.

Vel

352 Pars I V. De Lenient. &c.

℞. Unguenti rosati & populei, an. ʒ. ss. cum albumine ovi agitato fiat unguentum, quo panni linei parti imbuti admoveantur.

℥. Pulp. pomi sub cineribus cocti ʒ. ii. unguenti populei ʒ. j. croci ʒ. ss. vitellum ovi, misce, fiat linimentum, &c.

℥. Mucilag. semin. psyllii & cydonior. extract. in aqua solani & plantag. ʒ. iii. unguenti populei ʒ. j. misce, & admove cum linteis.

In forma cataplasmati.

℞. Unguent. popul. ʒ. j. pulv. Requiei Nicolai ʒ. j. β. pulver. gr. kermes ʒ. i. misce cum cataplasmati ex mica pannis, vel ex radicibus & herbis decoctis ad putrilaginem, & trajectis ʒ. vi. utere pro parte dolente. Exemplum cataplasmati utriusque traditum est in cap. de cataplasmate.

℞. Fol. supervivi major. m. j. coque in lacte, contunde & traice, adde vitellum ovi, & admove. Doloribus acutissimis hæmorrhoidum, cæterarumque partium succurrit.

Nota 1. in usu prædictorum observandum esse, ut præcedant evacuantia, vel simul celebrentur, dum his utimur;

Cap I V. *De Hypnoticis.* 353

ne pars remedi & humorum noxiâ qualitate afflicta contrahat necrosin.

Nota 2. abstinendum, si pars debilis sit, & imminet gangræna; quia proprius induceretur partis mortificatio. Abstinendum quoque in pueris, senibus, & in doloribus partium, quæ sunt vicinæ parti principi.

C A P U T I V.

De Hypnoticis.

HYpnotica sunt medicamenta quæ somnum conciliant.

Quænam sint *ἐνέργειαι*, quibus soporifera somnum inducunt, non satis patet. Tacitè loquitur natura, dum nec per effectus, neque per analogiam sese explicat. Alii qualitates manifestas, alii occultas incusant. Nos sic inquirimus.

Cùm sopor sit vigiliis contrarius, utrique insit affectio spiritum animalium diversa, necesse est: sunt autem huiusmodi spiritûs substantiæ subtilissimæ in corpuscula volatilia summè exaltatæ,

354 Pars I V. *De Lenient. &c.*

cumque ad vigilias requiratur eorum tenuitas, motus, copia, pororum cerebri nervorumque, quò liberè pervadant, apertio, debet in somni diathesi diversa, eorum adesse crassities, torpor, paucitas, pororum impedita libertas. Pleraque id præstant benignis, quos exhalant, vaporibus, ut alimenta, tepidum balneum, emulsio, & similia; à quibus humescunt spiritus animales, fixantur, & pori leviter obstruuntur: à pituita, quâ plerumque nimis scatet cerebrum, fitus somnolenti: à copia sanguinis humido diffluentis spiritus hebescent, premitur cerebrum, somnum obrepit. In omnibus cataphoricis affectibus prævalet semper humiditas, sæpè adest calor, rarò frigiditas, ipso docente Gal 3. de loc. aff. c. 3. quæ licèt soporis causas manifestas insinuent, inest tamen plerisque hypnoticis modus agendi planè diversus. Quæ enim tanta potest inesse vis opio, etiam exactè correcto, quæ uno & altero granulo in febre ardente, delirio phrenitico, maniaco, obstinatis vigiliis, effervescentem sanguinem, effratòsque spiritus

citò

Cap. I V. *De Hypnoticis.* 355

citò compescat ; & non solum soporem sed quandoque etiam frigiditatem, torporem, mortemque inducat ; nisi malignum quid tetrumque expiret, quod totâ substantiâ spiritibus sit infensum, quod quidem est indeterminabile. Reperitur enim cum opio & vino temperie calidis, cum frigoris prædominio in solano, lactuca, mandragora & similibus. Illud ipsum Chymici vocant concretum ex sale fixo, sulphure, & terra, sulphur nempe impurum fætidumque, quod spiritus nixando irretit, sistit, & plerumque lethaliter corrumpit. Hoc experientia insinuat, opium enim tostione desinit esse narcoticum fumus carbonum stupefacit, non semel fulminis afflatus narcosi spiritus corripuit, plerumque in febre maligna & tertianæ intermittentis paroxysmo, dum sulphur suum bilis exaltat in cerebrum, carus inducitur. Quidni idem à medicamentis narcoticis contingat ?

Eorum usus est.

In vigiliis contumacibus, deliriisque cum vel sine febre, in doloribus acutissimis partium, quæ vires infringunt.

Q

356 Pars I V. De Lenient. &c.

Præscribi possunt in forma julepi, emulsionis, boli, pilulæ, & topici.

In forma julepi.

℞. Aquæ papav. rhœad. ℥. iv. syrup. de papav. ℥. iiij. vel ℥. β. misce fiat julep. Capiat vespere tribus horis post & ante jusculum.

Potest exhiberi omni horâ, si res urgeat.

Idem syrupus de papavere potest dissolvi in julepo, aut decocto ordinario ad ℥. ij. iiij. vel ℥. β. quando sæpius iterari debet: in debilibus adde confect. hyacinth. ℥. j.

Mitius hypnoticum præstat syrupus de nymph. ad ℥. β. vel ℥. vi. in aqua papav. rhœad. vel in decocto appropriato, vel in emulsione.

In forma emulsionis, vide cap. 4. de emulsione, sect. 1. partis 1.

In forma boli.

℞. Laudani opiari, gr. i. vel ii. iii. iv. confect. hyacinth. ℥. j. conservæ ros. ℥. i. β. misce, fiat bolus, Cap. horâ somni, superbibendo parum aquæ pro potu ordinat. vel ℥. vi. aq. papaver. rhœad.

Convenit in vigiliis pertinacibus,

Cap. I V. *De Hypnoticis.* 357

deliriis phreniticis, maniacis diarrhœa biliosa, cholera, vomitu, doloribus colicis, nephriticis, &c.

In forma pilulæ,

℞. Laudani, gr. i. ii. vel iij. confect. hyacinth. ꝑ. i. cum gutt. aliquot syrupi de papavere vel de nymphaea. f. pilulæ.

Vel

In forma mixturæ.

℞. Aquar. lact. bugl. an. ꝑ. ii. confect. hyacinth. & pulver. diamargar. frigidi, an. ꝑ. β. laudani, gr. ii. syrupi de nymphaea ꝑ. β. fiat mixtura, de qua bis terque in die capiat duo cochl. duabus horis post & ante jesculum.

Idem laudanum dissolvi potest in julepo, emulsione, decoctio, &c.

Topica sunt frontale, oxymrhodium, lotio pedum, de quibus vide in proprio capite.

Nota 1. in usu narcoticorum procedendum esse à debilibus ad validiora, nisi casus urgens subito cogat ad fortiora.

Nota 2. Narcotica non esse sæpius repetenda, ne in lethalem soporem cerebrum adducant.

360 Pars I V. De Lenient. &c.

Quando vulnera interiùs penetrant, & ventrem, aut thoracem perfodiunt, sunt adhibenda etiam interna remedia, dum venæsectio quantum sufficit celebratur. Talia debent esse, quæ sanguinem incrassant, adstringunt partes, & vasa roborant.

In forma julepi.

℞. Aquar. plantag. rosar. an. ℥. ii. β. confect. hyacinth. 3. β. boli armen. veri ʒ. i. syrupi de rosis siccis ℥. j. fiat julepus, exhibendus vespere & manè. quando opus videbitur.

In forma Emulsionis.

Vide suprà, cap. de emulsione ad incrassandum.

In forma decocti vulnerarii, ad incrassandum, & quando vulnus deterfione indiget.

℞. Rad. symp. majoris, pentaphyll. an. ℥. j. fol. plantag. agrim. equis. pimpin. vincæ pervincæ, an. M. j. semin. plantag. portul. papav. albi, an. 3. ii. florum hyperici & rosar. rubr. an. p. j. fiat decoctio pro tribus dosibus: adde cuique syrupi granator. vel de rosis siccis ℥. j. capiat vespere & manè.

• 2. Pro narium hæmorrhagiâ non

Cap. V. *De Sang. fluxu.* 361

critica , præmissâ venæsectione sufficienter.

Vide cap. 6. de frontalibus.

Vide cap. 2. de Eirhinis.

3. Pro hæmoptysi , & phthisi , de quo vide caput de Thorachicis , & de looch.

4. Pro arteriotomia, imponitur vulneri faba per medium secta , postea super imponitur cataplasma ex thure, bolo armena , pilis leporinis , albumine ovi exceptis : de quo vide caput 8. de pulvere , deinde fasciæ continentes, & comprimentes convenienter aptandæ.

5. pro aneurysmate.

Quando adhuc parvum est impone fabam per medium sectam, vel laminam plumbam cum compressis , & fasciis.

℥. Boli armeni , terræ sigillatæ, thuris , mastich. pilor. leporis , an. ʒ. ii. casei recentis ʒ. ii. ovi albumen cum aceto rosato agitatum , subige omnia ad modum Cataplasmatidis , quod admoveatur parti affectæ , superinductâ fasciâ arctissimâ , tertio quoque die immitutandum.

360 Pars I V. De Lenient. &c.

Quando vulnera interiùs penetrant, & ventrem, aut thoracem perfodiunt, sunt adhibenda etiam interna remedia, dum venæsectio quantum sufficit celebratur. Talia debent esse, quæ sanguinem incrassant, adstringunt partes, & vasa roborant.

In forma julepi.

℞. Aquar. plantag. rosar. an. ℥. ii. ℞. confect. hyacinth. ℥. ℞. boli armen. veri ʒ. i. syrupi de rosis siccis ℥. j. fiat julepus, exhibendus vespere & manè. quando opus videbitur.

In forma Emulsionis.

Vide suprà, cap. de emulsione ad incrassandum.

In forma decocti vulnerarii, ad incrassandum, & quando vulnus detersione indiget.

℞. Rad. symp. majoris, pentaphyll. an. ℥. j. fol. plantag. agrim. equis. pimpin. vincæ pervincæ, an. M. j. femin. plantag. portul. papay. albi, an. ℥. ii. florum hyperici & rosar. rubr. an. p. j. fiat decoctio pro tribus dosibus: adde cuique syrupi granator. vel de rosis siccis ℥. j. capiat vespere & manè.

• 2. Pro narium hæmorrhagiâ non

Cap. V. *De Sang. fluxu.* 361

critica , præmissâ venæsectione suffici-
cienter.

Vide cap. 6. de frontalibus.

Vide cap. 2. de Eirhinis.

3. Pro hæmoptysi , & phthisi , de
quo vide caput de Thorachicis , & de
looch.

4. Pro arteriotomia, imponitur vul-
neri faba per medium secta , postea su-
per imponitur cataplasma ex thure, bo-
lo armena , pilis leporinis , albumine
ovi exceptis : de quo vide caput 8. de
pulvere , deinde fasciæ continentes,
& comprimentes convenienter ap-
tandæ.

5. pro aneurysmate.

Quando adhuc parvum est impone
fabam per medium sectam, vel laminam
plumbam cum compressis , & fasciis.

℥. Boli armeni , terræ sigillatæ,
thuris , mastich. pilor. leporis , an.
3. ii. casei recentis 3. ii. ovi albumen
cum aceto rosato agitatum , subige om-
nia ad modum Cataplasmatiss , quod
admoveatur parti affectæ , superindu-
ctâ fasciâ arctissimâ , tertio quoque die
immutandum.

360 Pars I V. De Lenient. &c.

Quando vulnera interiùs penetrant, & ventrem, aut thoracem perfodiunt, sunt adhibenda etiam interna remedia, dum venæsectio quantum sufficit celebratur. Talia debent esse, quæ sanguinem incrassant, adstringunt partes, & vasa roborant.

In forma julepi.

℞. Aquar. plantag. rosar. an. ℥. ii. ℞. confect. hyacinth. ℥. ℞. boli armen. veri ʒ. i. syrupi de rosis siccis ℥. j. fiat julepus, exhibendus vespere & manè. quando opus videbitur.

In forma Emulsionis.

Vide suprà, cap. de emulsione ad incrassandum.

In forma decocti vulnerarii, ad incrassandum, & quando vulnus detersione indiget.

℞. Rad. symp. majoris, pentaphyll. an. ℥. j. fol. plantag. agrim. equis. pimpin. vinæ pervinæ, an. M. j. semin. plantag. portul. papay. albi, an. ℥. ii. florum hyperici & rosar. rubr. an. p. j. fiat decoctio pro tribus dosibus: adde cuique syrupi granator. vel de rosis siccis ℥. j. capiat vespere & manè.

• 2. Pro narium hæmorrhagiâ non

Cap. V. *De Sang. fluxu.* 361

critica, præmissâ venæsectione sufficienter.

Vide cap. 6. de frontalibus.

Vide cap. 2. de Eirhinis.

3. Pro hæmoptysi, & phthisi, de quo vide caput de Thorachicis, & de looch.

4. Pro arteriotomia, imponitur vulneri faba per medium secta, postea super imponitur cataplasma ex thure, bolo armena, pilis leporinis, albumine ovi exceptis: de quo vide caput 8. de pulvere, deinde fasciæ continentes, & comprimentes convenienter aptandæ.

5. pro aneurysmate.

Quando adhuc parvum est impone fabam per medium sectam, vel laminam plumbam cum compressis, & fasciis.

℥. Boli armeni, terræ sigillatæ, thuris, mastich. pilor. leporis, an. 3. ii. casei recentis 3. ii. ovi albumen cum aceto rosato agitatum, subige omnia ad modum Cataplasmatidis, quod admoveatur parti affectæ, superinductâ fasciâ arctissimâ, tertio quoque die immutandum.

360 Pars I V. De Lenient. &c.

Quando vulnera interiùs penetrant, & ventrem, aut thoracem perfodiunt, sunt adhibenda etiam interna remedia, dum venæsectio quantum sufficit celebratur. Talia debent esse, quæ sanguinem incrassant, adstringunt partes, & vasa roborant.

In forma julepi.

℞. Aquar. plantag. rosar. an. ℥. ii. β. confect. hyacinth. ℥. β. boli armen. veri ℥. i. syrupi de rosis siccis ℥. j. fiat julepus, exhibendus vespere & manè. quando opus videbitur.

In forma Emulsionis.

Vide suprà, cap. de emulsione ad incrassandum.

In forma decocti vulnerarii, ad incrassandum, & quando vulnus detersione indiget.

℞. Rad. symp. majoris, pentaphyll. an. ℥. j. fol. plantag. agrim. equis. pimpin. vincæ pervincæ, an. M. j. semin. plantag. portul. papav. albi, an. ℥. ii. florum hyperici & rosar. rubr. an. p. j. fiat decoctio pro tribus dosibus: adde cuique syrupi granator. vel de rosis siccis ℥. j. capiat vespere & manè.

2. Pro narium hæmorrhagiâ non.

Cap. V. *De Sang. fluxu.* 361

critica , præmissâ venæsectione suffici-
cienter.

Vide cap. 6. de frontalibus.

Vide cap. 2. de Eirhinis.

3. Pro hæmoptysi , & phthisi , de
quo vide caput de Thorachicis , & de
looch.

4. Pro arteriotomia, imponitur vul-
neri faba per medium secta , postea su-
per imponitur cataplasma ex thure, bo-
lo armena , pilis leporinis , albumine
ovi exceptis : de quo vide caput 8. de
pulvere , deinde fasciæ continentes,
& comprimentes convenienter ap-
tandæ.

5. pro aneurysmate.

Quando adhuc parvum est impone
fabam per medium sectam, vel laminam
plumbam cum compressis , & fasciis.

℥. Boli armeni , terræ sigillatæ,
thutis , mastich. pilor. leporis , an.
3. ii. casei recentis 3. ii. ovi albumen
cum aceto rosato agitatum , subige om-
nia ad modum Cataplasmatidis , quod
admoveatur parti affectæ , superindu-
ctâ fasciâ arctissimâ , tertio quoque die
imitandum.

356 Pars I V. *De Lenient. &c.*

Præscribi possunt in forma julepi, emulsionis, boli, pilulæ, & topici.

In forma julepi.

℞. Aquæ papav. rhœad. ℥. iv. syrup. de papav. ℥. iiij. vel ℥. β. misce fiat julep. Capiat vespere tribus horis post & ante juscum.

Potest exhiberi omni horâ, si res urgeat.

Idem syrupus de papavere potest dissolvi in julepo, aut decocto ordinario ad ℥. ij. iiij. vel ℥. β. quando sæpius iterari debet: in debilibus adde confect. hyacinth. ℥. j.

Mitius hypnoticum præstat syrupus de nymph. ad ℥. β. vel ℥. vi. in aqua papav. rhœad. vel in decocto appropriato, vel in emulsione.

In forma emulsionis, vide cap. 4. de emulsione, sect. 1. partis 1.

In forma boli.

℞. Laudani opiat, gr. i. vel ii. iii. iv. confect. hyacinth. ℥. j. conservæ ros. ℥. i. β. misce, fiat bolus, Cap. horâ somni, superbibendo parum aquæ pro potu ordinar. vel ℥. vi. aq. papaver. rhœad.

Convenit in vigiliis pertinacibus,

Cap. I V. *De Hypnoticis.* 357

deliriis phreniticis , maniacis diarrhœa biliosa , cholera , vomitu , doloribus colicis , nephriticis , &c.

In forma pilulæ,

℞. Laudani , gr. i. ii. vel iij. confection. hyacinth. ℥. i. cum gutt. aliquot syrupi de papavere vel de nymphæa. f. pilulæ.

Vel

In forma mixturæ.

℞. Aquar. lact. bugl. an. ℥. ii. confection. hyacinth. & pulver. diamargar. frigid. an. ℥. ss. laudani , gr. ii. syrupi de nymphæa ℥. ss. fiat mixtura , de qua bis terque in die capiat duo cochl. duabus horis post & ante jesculum.

Idem laudanum dissolvi potest in julepo , emulsione , decoctio , &c.

Topica sunt frontale , oxyrhodinum , lotio pedum , de quibus vide in proprio capite.

Nota 1. in usu narcoticorum procedendum esse à debilibus ad validiora , nisi casusürgens subito cogat ad fortiora.

Nota 2. Narcotica non esse sæpius repetenda , ne in lethalem soporem cerebrum adducant.

358 Pars I V. *De Lenient. &c.*

3. Miscendum esse semper aliquid cardiacum, ad infrigendam narcoticorum vim cordi & cerebro inimicam.

4. Abstinendum esse à narcoticis in debilibus, senibus, pueris, gravidis, aut saltem modicè & prudentissimè ipsis utendum.

5. Non sunt præscribenda pleno & nondum evacuato corpore, ne humores magis incrassentur, & opprimatur natura.

C A P U T V.

De Sanguinis fluxu.

V Ita pendet à viribus, vires à sanguine & spiritibus, unde dicitur, nos tantum habere virium, quantum sanguinis & spirituum, idèò dum sanguis præternaturaliter fluit è suis vasculis, citò sistendus remediis internis & topicis, quæ *ἰχθυα* dicuntur: suntque medicamenta sistencia sanguinem uberius prorumpentem è vena aperta, excelsa, rupta, aut præcisa.

Id præstant triplici modo: 1. Vi

Cap. V. *De Sang. fluxu.* 359

emplasticâ , ob crassam & lentam substantiam , quâ venarum exitus infarciunt , & implent. 2. Vi refrigerandi , adstringendi , & exsiccandi. 3. Vi causticâ , quâ venas urendo , crustulam obducunt.

Uſus est.

1. In vulneribus , contusionibus , ruptionibus , & apertionibus vasorum.

Topicum vulgare , quod primum partibus vulneratis aut contusis admoveatur , fit pulveribus adstringentibus , bolo armenâ , terrâ sigillatâ , sanguine draconis , thure , mastiche , mixtis cum ovi albumine agitato cum aqua rosacea , & exceptis cum stupis cannabinis , superponendo fascias imbutas oxycrato.

Relinquitur hic apparatus hyeme per 24. horas , æstate per medium diem , & aliud simile de novo imponitur ; nisi dolor , aut sanguinis fluxus citius immutare cogat. Præscribitur sic.

℞. Boli armen. thur. mastich. corallor. rubr. an. 3. j fiat pulvis , excipiendus ovi albumine agitato cum aqua ros. parti vulneratæ imponendus.

Plura vide in cap. de pulveribus section. 3. partis 1.

360 Pars I V. De Lenient. &c.

Quando vulnera interiùs penetrant, & ventrem, aut thoracem perfodiunt, sunt adhibenda etiam interna remedia, dum venæsectio quantum sufficit celebratur. Talia debent esse, quæ sanguinem incrassant, adstringunt partes, & vasa roborant.

In forma julepi.

℥. Aquar. plantag. rosar. an. ℥. ii. ℞. confect. hyacinth. ℥. ℞. boli armen. veri ʒ. i. syrupi de rosis siccis ℥. j. fiat julepus, exhibendus vespere & manè. quando opus videbitur.

In forma Emulsionis.

Vide suprà, cap. de emulsione ad incrassandum.

In forma decocti vulnerarii, ad incrassandum, & quando vulnus deterfione indiget.

℥. Rad. symp. majoris, pentaphyll. an. ℥. j. fol. plantag. agrim. equis. pimpin. vincæ pervincæ, an. M. j. semin. plantag. portul. papav. albi, an. ℥. ii. florum hyperici & rosar. rubr. an. p. j. fiat decoctio pro tribus dosibus: adde cuique syrupi granator. vel de rosis siccis ℥. j. capiat vespere & manè.

• 2. Pro narium hæmorrhagiâ non

Cap. V. *De Sang. fluxu.* 361

critica , præmissâ venæsectione suffici-
cienter.

Vide cap. 6. de frontalibus.

Vide cap. 2. de Earhinis.

3. Pro hæmoptysi , & phthisi , de
quo vide caput de Thorachicis , & de
looch.

4. Pro arteriotomia, imponitur vul-
neri faba per medium secta , postea su-
per imponitur cataplasma ex thure, bo-
lo armena , pilis leporinis , albumine
ovi exceptis : de quo vide caput 8. de
pulvere , deinde fasciæ continentes,
& comprimentes convenienter ap-
tandæ.

5. pro aneurysmate.

Quando adhuc parvum est impone
fabam per medium sectam, vel laminam
plumbam cum compressis , & fasciis.

℥. Boli armeni , terræ sigillatæ,
thuris , mastich. pilor. leporis , an.
3. ii. casei recentis 3. ii. ovi albumen
cum aceto rosato agitaturn , subige om-
nia ad modum Cataplasmatiss , quod
admoveatur parti affectæ , superindu-
ctâ fasciâ arctissimâ , tertio quoque die
immutandum.

CAPUT ULTIMUM.

De animi Deliquio.

Non hîc agitur de sublatione causarum, quibus pendet animi deliquium, aut syncope, sed de iis quæ promptè reficiant spiritus in virium deliquio, ne ad eorum nimium defectum mors repentina subsequatur.

Cavendum, ne dum vires reficere intendimus, causas morbi augeamus: ideoque in morbo calido magis temperata, aut minùs calida; in frigido calida potiùs usurpanda.

In omni casu, vel instante vel præfente deliquio, aut syncope, remedium in promptu est vinum generosum solum, vel cum pauca confectioe hyacinth. quæ temperata, vel moderatè calida est.

Eadem confectio hyacinthor. ad 3. j. dissolvi potest in pauca aqua rosar. flor. arantiorum, vel cum pauco jusculo.

Confectio alkermes & theriaca sunt calidæ, & in frigido casu exhibentur cum vino optimo, vel aquâ cinamomi, arantior. & exhibentur etiam in casu calido contumaci, & ferè desperato.

Cap. ult. *De Deliq. animi.* 363

Aqua vitæ, cinamomi, imperialis, clareta, Reginæ Hungariæ, ad cochlear. unum vel duo.

Elixir proprietatis, & quæ cap. 4. de Cardiacis, & cap. 1. de Roborantibus cor, tam in causa calida, quàm frigida, suprà descripta sunt.

Topica sunt hæc: proiiciatur frigida in faciem.

Foveatur cor confectiōe alkermes dissoluta in vino, aut aquâ florum arantiorum, cum pauca aqua Reginæ Hungariæ.

Crusta panis tosta mero intincta calidè admoveretur naribus, umbilico, carpis manuum, plantis pedum.

Pipiones per medium secti admo-
vendi cordi, plantis pedum; gallina
per spinam aperta epigastricæ regioni.

Nares illiniantur balsamo Peruviano
vel confectiōe alkermes. Offerantur
naribus aqua cinnamomi, Reginæ
Hungariæ.

Testes & pudenda foveantur confectiōe alkermes in vino dissoluta calidè
Plura vidè quæ citato cap. 4. de Cardiacis, & cap. 2. de Roborantibus cor, adducta sunt.

F. I. N. I. S.



I N D E X

DE INSTRUMENTIS PHARMACEUTICIS GALENICIS ET CHYMICIS.

Proœmium.

pag. 1.

P A R S I.

De alterantibus.

p. 15.

PRæmittenda alteratio purgationi.
Quid sit alteratio. Non obstat
quod remedium alterans compona-
tur ex pluribus diversæ virtutis.
Alterantium divisio, variæ formæ.
Non est nimia ipsis fides habenda.

S E C T I O I.

De simpliciter alterantibus.

p. 21.

CAPUT I. De Julepo.

ibid.

Quid. compositio, tempus, usus ad re-
frigerandum ; ad sitim extinguen-
dam, diaphoresim promovendam.

Cap. II. De Apozemate.

p. 25.

Quid. Compositio. Usus ad præpa-

INDEX.

randos humores, obstructions referandas.

CAP. III. De Jusculis alterantibus. p. 33

Quid. Ex quibus: usus ad temperandum. Obstructions referandas. Ad fluxionis acrimoniam demulcendam. Ad sanguinem incrassandum. Ad vires reparandas.

CAP. IV. De Emulsione. p. 40

Quid. Ex quibus. Usus ad sitim. Ad calidos pectoris affectus. Ad demulcendam urinæ acrimoniam. In malignis febribus. Ad somnum.

CAP. V. De Lacte & sero. p. 44

Differentiæ. Usus, ad nutriendum. Ad alterandum. Ad utrumque. Modus utendi. Pro omni alimento. Modus præscribendi. Cautiones. Serum lactis est remedium. Modus parandi, præscribendi, usus ad alterandum. Tempus. Cautiones.

CAP. VI. De Hordeato. p. 52

Usus ad temperandum. Ad tabidos &c. ad tussim.

CAP. VII. De Hydromelite. p. 55

CAP. VIII. De Ptisana. p. 57

Quid. Usus ad refrigerandum. Ad aperiendum. An nive refrigeranda.

INDEX.

ad exsicccandum. Ad adstringendum. Ad refriger. aper. nutriendum.

SECTIO II.

De alterantibus specificis. p. 63.

Propria cuilibet parti eligenda. Nullam unum morbus simplex.

CAP. I. De Cephalicis. p. 64.

In causa frigida. In causa calida. Cautio.

CAP. II. De Ophthalmicis & Collyrio. p. 66.

Quid. Quotuplex. Usus ad repellendum. Leniendum dolorem. Repellendum & demulcendum. Repellendum & resolvendum. Ad digerendum. Ad albugines. Ad scabiem & pruritus. Cautio.

CAP. III. De Bechicis. p. 71.

Quid. Usus ad pituitam præparandam. Notanda. Ad bilem incrassandam. Ad expectoratum. Contra hæmoptysin.

CAP. IV. De Loochi. p. 76.

Quid. Compositio. Tempus. Usus ad sputum juvandum. In frigida causa. In calida. In hæmoptysi. Ad exsicccandum & glutinandum. Ad tenuem fluxionem.

CAP. V. De Cardiacis. p. 81.

INDEX.

Quid à quibus cor fiat debile. Usus in causa frigida. In casu præcipiti. Cautio. In causa calida. In mulieribus. Vermibus. Motibus convulsivis. Cautio.

CAP. VI. De Stomachicis. p. 86

Quid. Qualia. Usus in causa frigida. In calida. Cautiones.

CAP. VII. De Hepaticis. p. 92

Quid. Usus in causa frigida. Cautio. In Causa calida.

CAP. VIII. D. Splenicis. p. 94

CAP. IX. De Vermes enecantibus. p. 97.

Appropriatis ad intestina. In febre verminosa. In febre maligna. In convulsivis motibus. De flatus discutientibus. Cautio.

CAP. X. De nephriticis. p. 101

Quid. Usus ad ardorem renum, urinæ. Cautio. Ad calculum. Quomodo fiat lapis. An lithontripticum. Quâvi operetur. Ad urinas movendas. Ad detergendum. Ad sanguinem sistendum.

CAP. XI. De Hystericis. p. 111

Quid. Usus ad uteri commotionem. Miscenda opiatica. Ad menses me-

INDEX.

vendos, sistendos. Ad expurgandum uterum. Ad juvandum conceptum. Cautio. In casu frigido, calido. Ad partem. Cautio.

CAP. XII. De Anthriticis. p. 119

Quid. Quotuplex. Usus ad repellendum. Dolorem sedandum. Digerendum. Roborandum.

CAP. XIII. De Hydroticis. p. 123

Quid. Ex quibus. Quamdiu, & quid agendum. Usus. Nocent calidis visceribus, in lue venerea. Male præparatur corpus hidroticis ad hydrargyrosim.

CAP. XIV. De Bochetto. p. 154

S E C T I O III.

De Alterantibus & purgantibus. p. 129

CAP. I. De Apozemate purgante. p. 157

Quid. Ex quibus. Modus. Dosis purgantium. Præcedere debent alia evacuantia & quandoque alterantia.

De Apozemate cholagogo. Usus. 131

De phlegmagogo. p. 133

De Melanagogo. ibid.

De Hydragogo. p. 134

De Mixto Apozemate. p. 135

INDEX.

CAP. II. De Iusculo alterante & purgante. p. 136

CAP. III. De Syrupo magistrali. p. 138

CAP. IV. De Diæta alterante & purgante. p. 143

CAP. V. De Opiata. p. 146

Quid. Ex quibus. Usus ad aperiendum in causa calida. In causa mixta. Sales lixiviales non sunt miscendi cum chalybeatis. Ad aperiendum & purgandum in causa calida. In causa mixta. Cautio. Ad refrigerandum & incrassandum. Ad roborandum.

CAP. VI. De Bolo. p. 152

Quid. Ex quibus. Usus aperiens. Refrigerans. Roborans. Adstringens. Sanguinem cohibens. Somnum concilians. Cautio. Ad purgandum. Ad roborandum.

CAP. VII. De Pilulis. p. 154

Quid. Ex quibus. Usus aperiens. Aperiens & purgans. Adstringens. purgans.

CAP. VIII. De Pulveribus. p. 158

Usus. Ad aperiendum. Ad febres intermittentes, de Kina Kina. Quid. Quomodo paranda, danda. Quibus profit. Quâ vi operationem absolvat. de

INDEX.

Coffee. Quâ vi agat. De herba Thé.
Contra vermes, abortum, calculum.
Usus externi. Ad ossa cariota, ulcera.
Ad sanguinem sistendum.

CAP. IX. De Tabellis. p. 170
Usus ad aperiendum. Purgandum.
Roborandum.

SECTIO IV.

De Alterantibus & roborantibus externis. p. 172

CAP. I. De Epithemate. ibid.

Quid. Quotuplex. Tempus. Modus.
Usus ad alterandum. Ad spiritus
instaurandos. Instaurandos & refi-
ciendos. Ad pectoris ardorem &
siccitatem. Ad hepar refrigeran-
dum, roborandum. Pro testibus.
Usus solidi ad vires restaurandas.
Contra vermes cum vomitu.

CAP. II. De Fomento. p. 180

Quid. Usus. Ad æstum viscerum. hu-
morum. Ad emolliendum, refri-
gerandum, aperiendum, roboran-
dum. Roborantia immiscenda. Ad
adstringendum. Ad emolliendum
& discutendum. Ad roborandum
ventriculum.

De embroche. Usus in calidis morbis.

In frigidis. p. 185

INDEX.

CAP. III. De Balneo. p. 188

Quid. Quotuplex. Modus utendi.

Ufus ad refrigerandum & humectandum. Ad adstringendum & exsicccandum.

De semibalneo.

Ufus ad temperanda viscera. Ad dolorem nephriticum. Ad menses movendos.

CAP. IV. De Stupha. p. 194

CAP. V. De Suffitu. p. 196

Quid. Quotuplex. Ufus ad alterandum & roborandum. Ad exsicccanda maligna ulcera. Ad excitandos sudores. Ad uteri affectus.

CAP. VI. de Oxyrrhodino. p. 198

Ufus in calidis cerebri affectibus, &c.

CAP. VII. De frontali. p. 200

Ufus ad hæmorrhagiam &c. Ad capitis dolorem. Ad somnum conciliandum.

CAP. VIII. De placenta rosacea. p. 201

CAP. IX. De Linimento. p. 202

Ufus ad refrigerandum. Pectus lavandum. Demulcendum dolorem nephriticum. Resolvendum, roborandum. Ad dolorem hæmorrhoidum.

CAP. X. De Unguento. p. 203

INDEX.

Vfus ad emolliendum, resolvendum.
Ad scabiem. Ad salivationem in lue
venerea. Observanda. Cautiones.

CAP. XI. De Cerato. p. 212
Ad emolliendum. Ad capitis vulnera.
Tumores &c.

CAP. XII. De Emplastro. p. 214
Vfus ad emolliendum, glutinandum,
maturandum. Ad tumidum lienem.
Ad ulcera maligna.

CAP. XIII. De Cataplasmate. p. 216
Quid. Ex quibus. Vfus ad dolorem.
Ad fluxionem. Inflammationem. In
virium defectu. Ad roborandum.

CAP. XIV. De Vesicatorio. p. 220
Quid. Quibus partibus, quo tempore,
Morbis, Quamdiu conveniat.

CAP. ult. De Dropace. p. 223
Ad educendum ad cutim. Ad calo-
rem evocandum. Ad maciem extre-
morum corrigendam.

P A R S II.

De Evacuantibus. p. 225
De causa morbi. Cui debeatur purga-
tio, Quotuplex.

S E C T I O I.

De Evacuantibus universalibus, &

INDEX.

primò de purgantibus per secessum.
p. 226

Quid purgatio. Quotuplex. Quâ vi
purgantia suos effectus præstent.
quot formulis conveniat.

CAP. I. De Suppositorio. p. 230

Quid. Quotuplex. Vfus quadruplex.

CAP. II. De Clysteribus. p. 233

Quid. Ex quibus. Quotuplex. Tem-
pus. Vfus ad emolliendum. Ad re-
frigerandum, humectandum, refrig.
emoll. purgand. In soporosis morbis.
Ad flatus nephreticos, hystericos af-
fectus. Contra vermes. Ad detergen-
dum, roborandum. Ad adstringen-
dum. Ad nutriendum & roborandũ.

CAP. III. De potione. p. 246

Quid. Quotuplex. Quid ante & post.
Rarò unus humor peccat. Non sunt
improbanda decocta pro menstruo
purgantium. Non sunt pori in aqua.

De Potione Cholagoga. p. 251

De Phlegmagoga. p. 254

De Melanagoga. p. 255

De Hydragoga. p. 257

De Mixta, p. 258

De potionibus peculiaribus. p. 260

Pro morbis pectoris. Gravidis, feni-

INDEX.

bus, infantibus, hæmoptoicis, hysteri-
cicis, verminosis.

De Pituita laxante, Regia dicta. 264

De Potione cum vino emetico. p. 267

Quare per secessum purget. Acidorum
vi mitescunt purgantia validiora.
Cautiones.

CAP. IV. De Bolo purgante. p. 274

CAP. V. De Pulvere purgante. 276

CAP. VI. De pilulis purgantibus.
p. 279

CAP. VII. De purgantibus ex Chy-
micis. p. 284

SUBSECTIO.

CAP. I. De Emeticis. p. 290

Quid. quâ vi operantur. quotuplex
purgatio per vomitum. Usus. Tem-
pus. Quando noceat, quibus pro-
fit. quomodo differant quæ vomitum
movent. Cautio. Quæ præcedere
debeant.

CAP. II. De diureticis. p. 296

Quid. quotuplex. Usus in casu calido,
frigido. Quibus profint. Quibus
noceant. Præmittenda.

CAP. III. De diaphoreticis. p. 301

Necessitas liberæ transpirationis. Quid
diaphoretica. Vis & modus agendi.

INDEX.

Ufus. Quæ præmittenda. Cautiones quibus noceant. quibus profint

S E C T I O II.

De Evacuantibus Particularibus.

p. 307

Quid. Quot modis. Quæ partes expurgentur.

CAP. I. De Sternutatoriis. p. 308

Quid. Ex quibus. Ufus, quibus noceant. Quæ præmittenda.

CAP. II. De Errhinis. p. 310

Ufus ad expurgandum cerebrum. Ad ardorem narium, cerebri. Ad ulcera narium. Ad hæmorrhagiam Ad fœtorem.

CAP. III. De Masticatoriis. p. 312

Quid. Ufus. Quibus noceant.

CAP. IV. De Gargarismate. p. 314

Quid. quodplex. Ufus ad educendam pituitam. Ad oris inflammationem. Ad oris & faucium ulcera. Ad dolorem dentium. Ad oris ardorem ab hydrargyrosi.

CAP. V. De Injectionibus. p. 317

Quid. Ex quibus. Ufus in aurium dolore. In Thoracis morbis. In uteri affectibus, ulcere. In vesicæ & penis morbis. Pro ulceribus profundis fistulosis.

INDEX.

CAP. VI. De Pessario, p. 324
Quid. Ex quibus. Præmittenda. Usus
ad menses movendos. Expurgan-
dum uterum. Ad secundinas pel-
lendas. ad exsiccandum, roboran-
dum. Ad cicatricem.

PARS III.

De Roborantibus. p. 328
In quo consistat partium robur. quo
tempore utendum roborantibus.
Quot modis dicantur.

SECTIO I.

De Generalibus Roborantibus. p. 330

CAP. I. De Roborantibus cor in ca-
lidis morbis. p. 331

CAP. 2. De Roborantibus cor in fri-
gidis affectibus.

SECTIO II.

De Roborantibus particularibus. 336

CAP. I. De Roborantibus cerebrum.
ibid.

In morbis calidis. In frigidis.

CAP. II. De Roborantibus Stoma-
chum. p. 340

CAP. III. De Roborantibus hepatis.
ibid.

In causa frigida. In calida.

INDEX.

CAP. IV. De Roborantibus lienem.

p. 345

CAP. V. De Roborantibus uterum
vesicam : ad infarctus partium na-
turalium.

p. 346

PARS IV. ET ULTIMA.

De Lenientibus & Purgantibus. p. 347

SECTIO UNICA.

De Mitigandis Symptomatibus. 348

CAP. I. De dolore Mitigando. ibid.

CAP. II. De Anodynis, p. 349

CAP. III. De Narcoticis. p. 350

Quot modis dolor sedetur. Quâ vi
agent narcotica.

CAP. IV. De hypnoticis. p. 353


Quâ vi suos effectus præstent, & quot
modis. Usus.

CAP. V. De Sanguinis fluxu. p. 358

A quibus pendeat vita. Quâ vi agent
sanguinem sistant. Usus.

CAP. ultimum. De Animi deliquio.
p. 362

Finis Indicis.



PERMISSIONS.

JE Consens pour le Roy qu'il
soit permis à C E S A R
C H A P P U I S de reimprimer
le Livre intitulé , *Instrumenta*
Curationis morborum deprompta,
&c. Authore H. T. P. R. M.
cy devant imprimé à Mont-
pellier chez Daniel Pech. Fait
à Lyon le 21 Janvier 1681.

VAGINAY.

SOit fait suivant les Con-
clusions du Procureur du
Roy , les an & jour susdits.

DESEVE.







